

በኢትዮጵያ የሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎርሎጂ ትንበያ፣ ቅድሚያ
ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ



ወርሃዊ የአየር ጠባይ ግምገማ እና ትንበያ መጽሔት

ክሌፕሪል 1-30/2024 የነበረው የአየር ጠባይ

ግምገማ እንዲሁም

ከሚያ 1-31/2024

የሚኖረው የአየር ጠባይ ትንበያ እና ምክረ ሃሳብ

ሚያ 2024

አዲስ አበባ



እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

ርዕስ	ገፅ
እ.ኤ.አ ከኤፕሪል 1 እስከ 30/2024 የነበረው የአየር ጠባይ ግምገማ.....	1 -
ምስል 1 የቀኑ ከፍተኛ የሙቀት መጠን በዲ.ሴ.....	3 -
ካርታ 1 እ.ኤ.አ ከኤፕሪል 1 እስከ 30/2024 ድረስ የዝናብ መጠን በሚ.ሜ.....	4 -
ካርታ 2 እ.ኤ.አ ከኤፕሪል 1 እስከ 30/2024 ድረስ የነበረው ዝናብ የዘነበባቸው ቀናት ብዛት.....	4 -
ካርታ 3 እ.ኤ.አ ከኤፕሪል 1 እስከ 30/2024 ድረስ የነበረው የዝናብ መጠን ከመደበኛው ጋር በመቶኛ ሲነፃፀር.....	4 -
ካርታ 4 እ.ኤ.አ ከኤፕሪል 1 እስከ 30/2024 ድረስ የነበረው የእርጥበት ሁኔታ.....	4 -
እ.ኤ.አ ከኤፕሪል 1 እስከ 30/2024 የነበረው የአየር ጠባይ በግብርና ሥራ ላይ ያሳደረው ተፅዕኖ.....	5 -
ካርታ 5 እ.ኤ.አ ከኤፕሪል 1 እስከ 30/2024 ድረስ የነበረው የእርጥበት ሁኔታ.....	5 -
እ.ኤ.አ ከኤፕሪል 1 እስከ 30/2024 የነበረው የአየር ጠባይ በውሃው ዘርፍ ላይ ያሳደረው ተፅዕኖ.....	6 -
ካርታ 6 እ.ኤ.አ ከኤፕሪል 1 እስከ 30/2024 ድረስ የነበረው የእርጥበት ሁኔታ.....	6 -
እ.ኤ.አ ከሜይ 1 እስከ 31/2024 የሚኖረው የአየር ጠባይ.....	7 -
ካርታ 7: እ.ኤ.አ ከሜይ 1-31፣ 2024 የሚኖረው የዝናብ መጠንና ስርጭት.....	8 -
እ.ኤ.አ ከሜይ 1 እስከ 31/2024 የሚኖረው የአየር ጠባይ አዝማሚያ በእርሻ ሥራ ላይ ሊያሳድር የሚችለው ተፅዕኖ.....	8 -
እ.ኤ.አ ከሜይ 1 እስከ 31/2024 የሚኖረው የአየር ጠባይ አዝማሚያ በወሀው ዘርፍ ላይ ሊያሳድር የሚችለው ተፅዕኖ.....	9 -



**በኢትዮጵያ የሚቴዎሮሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎሮሎጂ ትንበያ፣ ቅድሚያ
ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ**

እ.ኤ.አ ከኤፕሪል 1 እስከ 30/2024 የነበረው የአየር ጠባይ ግምገማ

በአፕሪል የመጀመሪያው አስር ቀናት በሰሜን ምስራቅ፣ በመካከለኛው፣ በደቡብ፣ በደቡብ ምስራቅ፣ በምዕራብ እንዲሁም በደቡብ ምዕራብ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ ከነበረው ጠንካራ የደመና ሽፋን ጋር ተያይዞ በብዙ ቦታዎቻቸው ላይ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ የተመዘገበ ሲሆን፤ በሁለተኛው አስር ቀናት ደግሞ በምዕራብ አጋማሽ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ የዝናቡ ሁኔታ በመጠንም ሆነ በስጭርት የመቀነስ አዝመሚያ የታየበት ቢሆንም በልግ ዋነኛ የዝናብ ወቅታቸው እና ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው በሆኑት የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ ከመካከለኛ እስከ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ አግኝተዋል፡፡ በሶስተኛው አስር ቀናት በደቡብ፣ በደቡብ ምዕራብ፣ በመካከለኛው፣ በምስራቅ፣ በሰሜን ምስራቅ፣ በደቡብ ምስራቅ እና በደቡብ ምዕራብ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ ከመካከለኛ እስከ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ የተመዘገበ ሲሆን፤ በተለይም የምድር ወገብን አቋርጦ ወደ ሀገራችን ሲገባ የነበረው እርጥበት አዘል አየር ይበልጥ በመጠናከሩ ምክንያት በተለይም በመጨረሻዎቹ ቀናት በደቡብ፣ በመካከለኛው እና በምስራቅ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ እንዲሁም በሌሎች የሀገሪቱ ክፍሎች በብዙ ቦታዎቻቸው ላይ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ተመዝግቧል፡፡

በአጠቃላይ በኤፕሪል ወር በመካከለኛው፣ በምስራቅ፣ በሰሜን ምስራቅ፣ በደቡብ፣ በደቡብ ምዕራብ፣ በደቡብ ምስራቅ እና በምዕራብ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ ዝናቡ በመጠንም ሆነ በስርጭት ብዙ የገሪቱ አካባቢዎችን ያዳረሰ ሲሆን፤ በበርካታ አካባቢዎች ላይም ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ተመዝግቧል፡፡ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ከተመዘገበባቸው የሚቴዎሮሎጂ ጣቢያዎች መካከል፤ በአዲስ አበባ ቦሌ 34.0፣ በጅማ 33.8፣ በመተሃራ 36.0፣ በነገሌ 40.0 እና 36.0፣ በአቦምሳ 47.4፣ በአዲስ አበባ ጥቁር አንበሳ 53.1 እና 81.4፣ በአዲግራት 34.3፣ በአማን 42.3 እና 35.2፣ በአምቦ 37.2፣ በአይሻ 113.0፣ በአዋሽ አርባ 57.2፣ በአርባ ምንጭ 41.8 እና 42.7፣ በአለም ተፈሪ 44.2፣ በአልጌ 45.0፣ በብላቴ 39.7፣ በቦሬ 36.0 እና 30.4፣ በቡሬ 55.0፣ በቡሌ ሆራ 36.3፣ 42.9 እና 73.8፣ በጨፋ 36.4፣ በዳሊፋጊ 33.7፣ 35.3፣ በደብረ ወርቅ 66.0፣ በዲላ 38.4 እና 30.5፣ በዶሎመና 30.2፣ በዱብቲ 37.5፣ በእንዋሪ 36.4፣ በጎዴ 30.5፣ በጊኒር 53.0፣ በሀዋሳ 32.3፣ በሆሳዕና 60.6፣ 46.5 እና 50.0፣ በእምድብር 36.1፣ 34.2 እና 43.1፣ በጅግጅጋ 61.7፣ በኮምቦልቻ



እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

52.3፣ በኮንሶ 58.4፣ 47.6 እና 32.5፣ በሊሙገነት 56.8 እና 35.5፣ በማጀቱ 61.6 እና 33.0፣ በማጂ 32.2፣ 37.0፣ 71.5 እና 42.7፣ በማሻ 30.6፣ በሞያሌ 84.0፣ 45.2፣ 49.5 እና 76.0፣ በሚሌ 54.0፣ በንፋስ መወጫ 44.7፣ በኑራኤራ 34፣ 45.5 እና 34.1፣ በነጆ 31.2፣ በሳዉላ 52.4 እና 37.9፣ በሰመራ 30.0፣ በሲርንቃ 30.4 እና 39.0፣ በተርጫ 31.9፣ በወረኢሉ 43.0፣ በያቤሎ 40.4፣ በቁለቢ 43.8፣ 38.6 እና 36.8፣ በደንገጎ 31.4፣ በላንጌ 32.6 እና 32.0፣ በጨለንቆ 48.0፣ 30.0፣ 42.4 እና 55.8፣ በፌድስ 40.0፣ በአዋሬ 40.0 እና 31.0፣ በሽላቦ 39.5፣ 61.0፣ 114.5 እና 47.5፣ በዶሎ 58.2፣ በጉብይሬ 49.8፣ በካራሚሌ 53.8፣ 33.9 እና 38.5፣ ኮምቦልቻ (ምስራቅ ሀረርጌ) 48.2 እንዲሁም በሀረዋ 34.6 በሚ.ሜ ይገኙበታል።

በኤፕሪል ወር የዘነበዉ የዝናብ መጠን ከሀገሪቱ ቦታ ሽፋን አንፃር ሲገመገም ከኦሮሚያ ክልል ባሌ እና ምስራቅ ባሌ፣ ጉጂ እና ምዕራብ ጉጂ፣ ቦረና እና ምስራቅ ቦረና፣ አርሲ እና ምዕራብ አርሲ፣ ምስራቅ እና ምዕራብ ሀረርጌ፣ ሁሉም የሸዋ ዞኖች፣ ቡኖ በደሌ፣ ኢሉባቦር፣ ቀለም ወለጋ እና ጅማ ዞኖች፣ ከሱማሌ ክልል ሲቲ፣ ፋፋን፣ ጀረር፣ ዶሎ፣ ኤረር፣ ቆራሄ፣ ሸቦሌ፣ ኖጎብ፣ ሊበን እና ዳዋ ዞኖች፣ ከጋምቤላ ክልል ማዠንግ ዞን፣ ሁሉም የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል፣ የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል፣ የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል እና የሲዳማ ክልል ዞኖች፣ ከአማራ ክልል ሰሜን እና ደቡብ ወሎ፣ የኦሮሞ ልዩ ዞን፣ ሰሜን ሸዋ እና ምስራቅ ጎጃም ዞኖች፣ ከአፋር ክልል ሀወሲ፣ ሀሪ እና ጋቢ ዞኖች፣ አዲስ አበባ፣ ሀረርና ድሬ ዳዋ ላይ 61-350 የሚደርስ ዝናብ ከ13-30 ቀናት ያህል ነበራቸው። በተጨማሪም ከአማራ ክልል ሰሜን፣ ማዕከላዊ፣ ደቡብ እና ምዕራብ ጎንደር፣ አዊ ዞን፣ ምስራቅ እና ምዕራብ ጎጃም፣ ከትግራይ ክልል ሰሜን ምዕራብ፣ ደቡብ ምስራቅ ምዕራብ እና ማዕከላዊ ዞኖች፣ ከቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል መተከል፣ አሶሳ፣ ካማሺ እና የማኦኮሞ ልዩ ዞን፣ ከጋምቤላ ክልል ኑዌር፣ አኝዋክ እና የኢታንግ ልዩ ዞን፣ ከአፋር ክልል ቂልበቲ እና ፈንቲ ዞኖች ላይ ከ4-60 ሚ.ሜ የሚደርስ ዝናብ ከ2-12 ቀናት ያህል ነበራቸው (ካርታ 1 እና 2) ።


በኤፕሪል ወር የዘነበዉ የዝናብ መጠን ከመደበኛው ጋር ሲነፃፀር ከኦሮሚያ ክልል ምስራቅ እና ምዕራብ ሀረርጌ፣ ባሌ እና ምስራቅ ባሌ፣ ጉጂ እና ምስራቅ ጉጂ፣ ቦረና እና ምስራቅ ቦረና፣ ሁሉም የሸዋ ዞኖች፣ ጅማ፣ ቡኖ በደሌ፣ ኢሉባቦር፣ ቀለም ወለጋ እና ምዕራብ ወለጋ ዞኖች፣ ከደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል ቤንች ሸኮ፣ ዳወሮ፣ ከፋ፣ ሸካ ኮንታ እና ደቡብ



እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ


አሞ ዞኖች፣ ከደቡብ ኢትዮጵያ ክልል አማር፣ ቡርጂ፣ ደራሼ፣ ኮንሶ፣ ደቡብ አሞ፣ ወላይታ፣ ጌደኦ፣ ኣሪ እና አማር ዞኖች፣ ከማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ጉራጌ ሀላባ፣ ሀዲያ፣ ከምባታ፣ ስልጤ፣ ጠምባሮ እና የየም ልዩ ዞን፣ ከሰማሌ ክልል ዶሎ፣ ጀርሬ፣ ፋፋን፣ አፍዴር፣ ኤረር፣ ሊበን፣ ዳዋ እና ሲቲ ዞኖች፣ ከፋር ክልል ቂልበቲ፣ ፋንቲ፣ ሀሪ እና ጋቢ ዞኖች፣ ከአማራ ክልል ሰሜን እና ደቡብ ወሎ፣ ዋህምራ፣ የኦሮሞ ብሄረሰብ ልዩ ዞን እና ሰሜን ሸዋ ዞኖች፣ አዲስ አበባ፣ ሀረሪ እና ድሬ ዳዋ ላይ መደበኛና ከመደበኛ በላይ የሆነ የዝናብ መጠን ተመዝግቧል (ካርታ 3)።

በሌላ በኩል በምዕራብ፣ በሰሜን ምዕራብ፣ በሰሜን ምስራቅ እና በደቡብ ምስራቅ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ የቀኑ ከፍተኛ የሙቀት መጠን ከ36-43.8 ዲግሪ ሴልሺየስ ተመዝግቧል (ምስል 1) ።




ምስል 1 የቀኑ ከፍተኛ የሙቀት መጠን በዲ.ሴ


እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ




ካርታ 1 እ.ኤ.አ ከኤፕሪል 1 እስከ 30/2024 ድረስ የነበረው የዝናብ መጠን በሚ.ሜ



ካርታ 2 እ.ኤ.አ ከኤፕሪል 1 እስከ 30/2024 ድረስ ዝናብ የዘነበባቸው ቀናት ብዛት



የዘነበባ የዝናብ መጠን ከረጅም ጊዜ አማካይ ጋር ሲነፃፀር



ካርታ 4 እ.ኤ.አ ከኤፕሪል 1 እስከ 30/2024 ድረስ የነበረው የእርጥበት ሁኔታ

ካርታ 3 እ.ኤ.አ ከኤፕሪል 1 እስከ 30/2024 ድረስ የነበረው የዝናብ መጠን ከመደበኛው ጋር በመቶኛ ሲነፃፀር




እ.ኤ.አ ከኤፕሪል 1 እስከ 30/2024 የነበረው የአየር ጠባይ በግብርና ሥራ ላይ ያሳደረው ተፅዕኖ

ባላለፍነው ወር በተለይም የበልግ አብቃይና ዝናብ ተጠቃሚ በሆኑት የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ የተገኘው እርጥበት የበልግ የእርሻ ስራ እንቅስቃሴን ለማከናወን፣ ቀደም ብለው ለተዘሩና በተለያዩ የእድገት ደረጃ ላይ ለሚገኙ የበልግ ሰብሎች፣ ለጓሮ አትክልቶችና ለቋሚ ተክሎች የውሃ ፍላጎት መሟላት ከፍተኛ ጠቀሜታ ነበረው።

በተጨማሪም የተገኘው እርጥበት አስቀድመው ለሚዘሩ የመኸር ወቅት ሰብሎች ማሳን ለማዘጋጀትም ሆነ ዘር ለመዝራት ምቹ እንደነበረ የተተነተኑ የግብርና ሚቲዎሮሎጂ መረጃዎች ያመለክታሉ። ከዚህም በተጨማሪም ለአርብቶ አደርና ከፊል አርብቶ አደር አካባቢዎች ለመጠጥ ውሃና ለግጦሽ ሣር አቅርቦት መሻሻል የጎላ ጠቀሜታ ነበረው።

በሌላ በኩል በአንዳንድ ሥፍራዎች ላይ የነበረው ከፍተኛ መጠን ያለው እርጥበት በረባዳማ እና የአፈር ጸባያቸው ውሃን በማያስርጉ ማሳዎች እንዲሁም በወንዝ ዳርቻ አካባቢዎች በሚገኙ ማሳዎች ላይ የውሃ በሰብሎች ላይ መተኛት እና በደለል የመሞላት እንዲሁም በጎርፍ የመጠረግ ሁኔታዎች ነበሩ (ካርታ 5) ።




ካርታ 5 እ.ኤ.አ ከኤፕሪል 1 እስከ 30/2024 ድረስ የነበረው የእርጥበት ሁኔታ



እ.ኤ.አ ክሌፕሪል 1 እስከ 30/2024 የነበረው የአየር ጠባይ በውሃው ዘርፍ ላይ ያሳደረው ተፅዕኖ

ባሳለፍነው የክሌፕሪል ወር በገናሌ ዳዋ፣ በላይኛው አዋሽ፣ ባሮ አካባቢ፣ ዋቤ ሸበሌ ተፋሰሶች ላይ በጣም ከፍተኛ የእርጥበት ሁኔታ ነበራቸው። በተጨማሪም በአብዛኛው አሞጊቤ፣ ስምጥ ሸለቆ፣ ገናሌዳዋ፣ ዋቤ ሸበሌ፣ አዋሽ፣ አፋር ደናክል፣ ባሮአካባቢ፣ የላይኛውና የመካከለኛው አባይ እንዲሁም በጥቂት የላይኛው ተከሌ ተፋሰሶች ላይ ከመጠነኛ እስከ ከፍተኛ የእርጥበት ሁኔታ እንደነበራቸው የተተነተኑ የውሃ ሚቲዎሮሎጂ መረጃዎች ያመለክታሉ። ይህም ሁኔታ የገጸ ምድርንም ሆነ የክርስ ምድር የውሃ ሀብትን በማጎልበት ወደ ተለያዩ የውሃ መያዣዎች እና ማጠራቀሚያዎች የሚገባውን የውሃ ሀብት ከመጨመር አንጻር ከፍተኛ ጠቀሜታ የነበረው ቢሆንም፣ በአንዳንድ ተዳፋታማ እና ለጎርፍ ተጋላጭ በሆኑ ተፋሰሶችና ንዑስ ተፋሰሶች ላይ የጎርፍ ክስተቶችም ነበሩ። በሌላ በኩል በአብዛኛው ተከሌ እና የታችኛውና የመካከለኛው አባይ እንዲሁም በጥቂት የመካከለኛው ዋቤ ሸበሌ ተፋሰሶች ላይ ደረቅ እና ከፊል ደረቅ የአየር ሁኔታ አመዝግባቸው ተስተውሏል (ካርታ 6)።



ካርታ 6 እ.ኤ.አ ክሌፕሪል 1 እስከ 30/2024 ድረስ የነበረው የእርጥበት ሁኔታ




እ.ኤ.አ ከሜይ 1 እስከ 31/2024 የሚኖረው የአየር ጠባይ

በመደበኛ ሁኔታ በሜይ ወር ወቅታዊው ዝናብ ቀስ በቀስ ከበልግ አብቃይ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ እየቀነሰ በመሄድ ከክረምት ዝናብ ሰጪ የሚቴዎሮሎጂ ክስተቶች መጠናከር ጋር ተያይዞ ዝናቡ ወደ ደቡብ ምዕራብና ምዕራብ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ ይስፋፋል፡፡

በመጨረሻ ወር ለዝናብ መፈጠር አስተዋጽኦ የሚያደርጉ የሚቴዎሮሎጂ ገጽታዎች በአብዛኛዎቹ የበልግ ዝናብ ተጠቃሚ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ እንደሚጠናከሩና ከዚህም ጋር ተያይዞ ከቀደሙት ሶስት የበልግ ወራት በመጠንም ሆነ በሥርጭት የተሻለ ዝናብ በብዙ የሀገሪቱ ቦታዎች ላይ ሊኖር እንደሚችል የትንበያ መረጃዎች ይጠቁማሉ፡፡ ከዚህም ጋር ተያይዞ ከቀላል እስከ ከፍተኛ መጠን ያለው ዝናብ በአብዛኛው የሀገሪቱ አካባቢ ላይ እንደሚኖርና በአንዳንድ ሥፍራዎችም ላይ ከባድ ዝናብ የሚዘወተርና አልፎ አልፎ በተለያዩ ቦታዎች ላይ ቅጽበታዊ ኅርፍ ሊያስከትል እንደሚችል ይጠበቃል፡፡

በአጠቃላይ በሚቀጥለው ወር ከኦሮሚያ ክልል የቁለም ወሊጋ፣ ቡኖ በደሌ፣ ኢሊባቦር፣ ጅማ፣ ሁሉም የሸዋ ዞኖች፣ አርሲና ምዕራብ አርሲ፣ ባሌና ምስራቅ ባሌ፣ ጉጂና ምዕራብ ጉጂ፣ ቦረና፣ ምዕራብና ምስራቅ ሐረርጌ፣ እንዲሁም ሐረሪ እና ድሬዳዋ፣ አዲስ አበባ፣ ከአማራ ክልል የዋግህምራ ዞኖች፣ የሰሜንና የደቡብ ወሎ ዞኖች፣ የሰሜን ሸዋና የኦሮሚያ ልዩ ዞን፣ የአፋር ክልል ዞኖች፣ ከትግራይ ክልል የደቡብ፣ የደቡብ ምስራቅ፣ የምስራቅ ትግራይ ክልል ዞኖች፣ የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ዞኖች፣ የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል ዞኖች፣ የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ዞኖች፣ የሲዳማ ክልል ዞኖች፣ የሱማሌ ክልል ዞኖች ብዙ ቦታዎቻቸውን የሚያዳርስ የተስፋፋ ዝናብ የሚኖራቸው ሲሆን፣ በአንዳንድ ስፍራዎቻቸው ላይ ከመካከለኛ እስከ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ያገኛሉ (ካርታ 7በተለይም በሰሜን ምስራቅ፣ ስምጥ ሸለቆ፣ ምስራቅ፣ ደቡብና ደቡብ ምስራቅ የሀገራችን አካባቢዎች ላይ የሚኖረው ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ቅጽበታዊ ኅርፍ የማስከትል አቅም ሊኖረው ስለሚችል ማህበረሰቡና የሚመለከታቸው አካላት አስፈላጊውን የጥንቃቄ እርምጃ መውሰድ ያስፈልጋል፡፡

እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ



ካርታ 7: እ.ኤ.አ ከሜይ 1-31፣ 2024 የሚኖረው የዝናብ መጠንና ስርጭት

እ.ኤ.አ ከሜይ 1 እስከ 31/2024 የሚኖረው የአየር ጠባይ አዝማሚያ በእርሻ ሥራ ላይ ሊያሳድር የሚችለው ተፅዕኖ

በመጨረሻ ወር የሚጠበቀው እርጥበት የበልግም ሆነ በከፊል የመኸር ወቅት የግብርና ተግባራትን ለማከናወን የጎላ ጠቀሜታ የሚኖረው ሲሆን ቀደም ብለው ለተዘፋና በተለያዩ የእድገት ደረጃ ላይ ለሚገኙ የበልግም ሆነ የረጅም ጊዜ የመኸር ሰብሎች፣ ለቋሚ ተክሎች፣ ከሜይ ወር ጀምረው ለሚዘፋ የመኸር ሰብሎች፣ በከተማ ግብርና ለሚለሙ የጓሮ አትክልቶች እንዲሁም ለተለያዩ እፅዋቶች የውሃ ፍላጎት መሟላት ከፍተኛ ጠቀሜታ ይኖረዋል፡፡ በተጨማሪ የሚጠበቀው እርጥበት ለአርብቶ አደርና ለከፊል የአርብቶ አደር አካባቢዎች የግጦሽ ሳርና የመጠጥ ውሃ አቅርቦትን ከማረጋገጥ አንጻር የጎላ ሚና ስለሚኖረው የሚመለከታቸው አካላት አስፈላጊ የግብርና ግብዓቶችን ከወዲሁ በማዘጋጀት ምርትና ምርታማነትን ለማሳደግ የሚያስችል ዝግጅት ማድረግ ያስፈልጋል፡፡

በሌላ በኩል በተለይም በመደበኛ ሁኔታ የክረምት እርጥበት ተጠቃሚ ያልሆኑ የአርብቶ አደር እና የከፊል አርብቶ አደር አካባቢዎች በቀሪ የበልግ ቀናት የሚገኘውን የዝናብ ውሃም ሆነ የእንስሳት መኖን በበቂ ሁኔታ በማሰባሰብ እና በተገቢው ቦታ



እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

በማከማቸት ዘላቂ የእንስሳት ልማትና ምርታማነት ለማሳደግ የሚያስችል ዝግጅት አንዲያደርጉ በዘርፉ የተሰማሩ አካላት ይመከራሉ።

በወሩ የሚጠበቀው ከፍተኛ መጠን ያለው እርጥበት በአንዳንድ የአፈር ፀባያቸው ውሃ በማያስርጉና ረባዳማ በሆኑ ማሳዎች ላይ የእርጥበት መብዛት እና ውሃ በሰብል ማሳዎች ላይ መተኛትን ሊያስከትል ስለሚችል ይህንን ለመከላከል የሚያስችል የውሃ ማንጣፈፍ ስራዎችን መስራትና እንዲሁም ተዳፋታማ እና ለጎርፍ ተጋላጭ በሆኑ ማሳዎች ላይ ደግሞ ሰብሎች በጎርፍ ተጠርገው እንዳይሄዱ የጎርፍ መቀልበሻ ቦቶችን በማዘጋጀት የቅድመ ጥንቃቄ ስራ መስራት ያስፈልጋል። በሌላ በኩል የሚኖረው ምቹ የአየር ሁኔታ ለበረሃ አንበጣ መራባትና መሰራጨት ምቹ ሊሆን ስለሚችል የሚመለከታቸው አካላት አስፈላጊውን ክትትልና ቁጥጥር ማድረግ ያስፈልጋል።

እ.ኤ.አ ከሜይ 1 እስከ 31/2024 የሚኖረው የአየር ጠባይ አዝማሚያ በዉሀዉ ዘርፍ ላይ ሊያሳድር የሚችለው ተፅዕኖ

በመጨረሻ የሜይ ወር በኦሞጊቤ፣ ባሮአኮቦ፣ ስምጥሽለቆ፣ ገናሌዳዋ፣ አባይ፣ አዋሽ፣ ዋቢ ሸበሌ፣ አፋር ደናክል፣ ኦጋዴን እና የላይኛው እና መካከለኛው ተከሄ ተፋሰሶች ላይ ከመጠነኛ እስከ ከፍተኛ እርጥበት እንደሚኖራቸው ይጠበቃል። ይህም ሁኔታ የገፀ ምድር እና የከረሰ ምድር ውሃ ሀብትን ከማጎልበት አንጻር አዎንታዊ ሚና ይኖረዋል።

በአንጻሩ ግን በአንዳንድ ለጎርፍ ተጋላጭ በሆኑ ተፋሰሶች እና ንዑስ ተፋሰሶች ላይ የሚጠበቀው ከፍተኛ መጠን ያለው እርጥበት በተለይም ለጎርፍ ተጋላጭ በሆኑ የከተማም ሆነ የገጠር አካባቢዎች ላይ በንብረትና በሰው ህይወት ላይ ጉዳት ሊያስከትል ስለሚችል አደጋን ለመቀነስ ብሎም ለማሰቀረት የሚያስችሉ መደበኛ የውሃ መፋሰሻዎችን የማጽዳት፣ የጎርፍ መቀልበሻ ቦቶችን የማዘጋጀት እና ለጎርፍ ተጋላጭ የሆኑ የወንዝ ዳርቻዎችን የመገደብ ተግባራትን አስቀድሞ ማከናወን ያስፈልጋል።