

በኢትዮጵያ የሚቴዎሮሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎሮሎጂ ትንበያ፣
ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ



የአስር ቀን የአየር ሁኔታና

ትንበያ መጽሔት

ከጁን 21-30/2024 የነበረው የአየር ሁኔታ

እና ግምገማ

እንዲሁም 1-10፣ 11-20 ጁላይ 2024

የሚኖረው የአየር ሁኔታ ትንበያ እና ምክረ ሃሳብ

ጁላይ 2024

አዲስ አበባ



ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

ርዕስ ገፅ

እ.ኤ.አ ከጁን 21 እስከ 30/2024 የነበረው የአየር ሁኔታ	- 1 -
ካርታ 1 እ.ኤ.አ ከጁን 21 እስከ 30/2024 ድረስ የነበረው የዝናብ መጠን በሚ.ሜ	- 3 -
ካርታ 2 እ.ኤ.አ ከጁን 21 እስከ 30/2024 ድረስ ዝናብ የዘነበባቸው ቀናት	- 3 -
ካርታ 3 እ.ኤ.አ ከጁን 21 እስከ 30/2024 ድረስ የነበረው የዝናብ መጠን ከመደበኛው ጋር በመቶኛ ሲነፃፀር	- 3 -
እ.ኤ.አ ከጁን 21 እስከ 30/2024 የነበረው የአየር ሁኔታ በግብርና ሥራ እንቅስቃሴ ላይ ያሳደረው ተፅዕኖ	- 4 -
ካርታ 4 እ.ኤ.አ ከጁን 21 እስከ 30/2024 ድረስ የነበረው የእርጥበት ሁኔታ	- 4 -
.....	- 4 -
እ.ኤ.አ ከጁን 21 እስከ 30/2024 የነበረው የአየር ሁኔታ በውሃው ዘርፍ ላይ ያሳደረው ተፅዕኖ	- 4 -
ካርታ 5 እ.ኤ.አ ከጁን 21 እስከ 30/2024 ድረስ የነበረው የእርጥበት ሁኔታ	- 5 -
እ.ኤ.አ ከጁላይ 1 እስከ 10/2024 የሚኖረው የአየር ሁኔታ	- 6 -
ካርታ 6 እ.ኤ.አ. ከጁላይ 1-10, 2024 የሚኖረው የዝናብ መጠን በሚ.ሜ	- 7 -
ካርታ 7 እ.ኤ.አ. ከጁላይ 1-10, 2024 የሚኖረው ከፍተኛ የዝናብ መጠን	- 7 -
እ.ኤ.አ ከጁላይ 11 እስከ 20/2024 የሚኖረው የአየር ሁኔታ	- 7 -
ካርታ 8 እ.ኤ.አ ከጁላይ 11-20፣ 2024 የሚኖረው የዝናብ መጠን በሚ.ሜ	- 8 -
.....	- 8 -
እ.ኤ.አ ከጁላይ 1 እስከ 10/2024 የሚኖረው የአየር ሁኔታ አዝማሚያ በእርሻ ሥራ ላይ ሊያሳድር የሚችለው ተፅዕኖ	- 9 -
እ.ኤ.አ ከጁላይ 1 እስከ 10/2024 የሚኖረው የአየር ሁኔታ አዝማሚያ በወሀው ዘርፍ ላይ ሊያሳድር የሚችለው ተፅዕኖ	- 9 -



እ.ኤ.አ ከጁን 21 እስከ 30/2024 የነበረው የአየር ሁኔታ

ባለፉት አስር ቀናት በምስራቅ፣ በመካከለኛው፣ በደቡብ ምዕራብ፣ በምዕራብ፣ በሰሜን እና በሰሜን ምስራቅ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ ጠንካራ እና የተስፋፋ የደመና ክምችት ነበራቸው። ከዚህ ጋር በተያያዘም የክረምት ዝናብ ተጠቃሚ በሆኑት በብዙ አካባቢዎች ላይ ከቀላል እስከ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ አግኝተዋል። ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ከተመዘገበባቸው የሚቴዎርሎጂ ጣቢያዎች መካከል በባህርዳር 34.2 እና 32.5፣ በጎንደር 31.5፣ በጎሬ 45.3፣ በመተሃራ 52.3፣ በነቀምቴ 31.1፣ 44.3፣ በአቦምሳ 36.5፣ በአዴት 40.4፣ በአምቦ 37.8፣ አፅቢ 40.0፣ በአልጌ 55.0፣ በአንገርጉትን 32.0፣ በአሶሳ 54.0 እና 51.7፣ በአይከል 37.9 እና 37.8፣ በቻግኒ 35.0፣ በደብረወርቅ 30.4፣ በዳንግላ 33.7፣ በደባርቅ 87.2 እና 50.0፣ በኢጃጂ 31.2፣ በፍቼ 32.6 እና 38.1፣ በእምድብር 31.4፣ በካቺሴ 50.5፣ 33.0 እና 32.6፣ በላይበር 31.0፣ በሊሙ ገነት 87.7፣ በማጆቴ 31.8፣ በማሻ 40.6፣ በመተማ 32.2 እና 32.7፣ በሞጣ 30.0፣ በመካነ ሰላም 32.1፣ በሻምቡ 37.7 እና 32.1፣ በአዳማ 32.8፣ በወረኢሉ 33.7፣ በየትኖራ 30.4፣ በባቱ 31.6፣ በሂርና 32.6፣ በኮምቦልቻ (ምስራቅ ሀረርጌ) 38.8 እንዲሁም በጨለንቆ 30.4 በሚ.ሜ ይገኙበታል።

ባለፉት ቀናት የዘነበዉ የዝናብ መጠን ከሀገሪቱ ቦታ ሽፋን አንፃር ሲገመገም ከአማራ ክልል ሰሜን፣ ማዕከላዊ፣ ደቡብ እና ምዕራብ ጎንደር፣ ሰሜን እና ደቡብ ወሎ፣ የኦሮሞ ብሄረሰብ ልዩ ዞን፣ ዋህማምራ፣ ምስራቅ እና ምዕራብ ጎጃም፣ አዊ፣ ሰሜን ሸዋ ዞኖች፣ ከኦሮሚያ ክልል ምስራቅ፣ ምዕራብ፣ ደቡብ ምዕራብ እና ሰሜን ሸዋ (ሰላሌ)፣ ምስራቅ እና ምዕራብ ወለጋ፣ ሆሮ ጉዳሩ ወለጋ፣ ቂለም ወለጋ፣ ቡኖ በደሌ፣ ኢሉባቦር፣ ጅማ፣ ምስራቅ እና ምዕራብ ሀረርጌ፣ አርሲ እና ምዕራብ አርሲ እንዲሁም ባሌ ዞኖች፣ አዲስ አበባ፣ ከቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል አሶሳ፣ መተከል፣ ካማሺ እና የማኦኮሞ ልዩ ዞን፣ ከጋምቤላ ክልል ማዣንግ፣ ኑዌር፣ አኝዋክ እና የኢታንግ ልዩ ዞን፣ ከሱማሌ ክልል ፋፋን እና ሲቲ ዞኖች፣ ከአፋር ክልል ቅልብቲ፣ ፈንቲ፣ ሀሪ እና ጋቢ ዞኖች፣ ከትግራይ ክልል ምስራቅ፣ ደቡብ ምስራቅ፣ ማዕከላዊ፣ ሰሜን ምዕራብ እና ምዕራብ ዞኖች፣ ከማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ጉራጌ፣ ሀላባ፣ ስልጤ፣ ሀዲያ እና የየም ልዩ ዞን፣ ከደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል ቤንች ሽኮ፣ ኮንታ፣ ከፋ፣ ሽካ እና ዳዉሮ ዞኖች፣ ሀረር እና ድሬዳዋ ላይ ከ81-228 ሚ.ሜ የሚደርስ ዝናብ ከ6-10 ቀናት ያህል ዝናብ



ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ



ነበራቸው። በተጨማሪም ከኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ባሌ እና ምዕራብ አርሲ ዞኖች፤ ከአፋር ክልል አውሲ ዞኖች፤ ከደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ወላይታ፤ ጋሞ፤ ጌዲኦ፤ ቡርጂ፤ ደራሼ፤ ከንሶ እና ደቡብ አሞ ዞኖች ላይ ከ5-30 ሚ.ሜ የሚደርስ ከ1-5 ቀናት ያህል ዝናብ ነበራቸው (ካርታ 1 እና 2) ።

ባለፉት አስር ቀናት የዘነበዉ የዝናብ መጠን ከመደበኛዉ ጋር ሲነፃፀር ከኦሮሚያ ክልል ምስራቅ እና ምዕራብ ሀረርጌ፤ አርሲ እና ምዕራብ አርሲ፤ ባሌ እና ምስራቅ ባሌ፤ ምስራቅ፤ ምዕራብ፤ ደቡብ ምዕራብ እና ሰሜን ሸዋ (ሰላሌ)፤ ምስራቅ እና ምዕራብ ወለጋ፤ ሆሮ ጉዳሩ ወለጋ፤ ቡኖ በደሌ፤ ቁለም ወለጋ፤ ጅማ እና ኢሉባቦር ዞኖች፤ አዲስ አበባ፤ ከሰማሌ ክልል ሲቲ እና ፋፋን ዞኖች፤ ከአፋር ክልል ቅልበቲ፤ ፈንቲ፤ አውሲ፤ ሀሪ እና ጋቢ ዞኖች፤ ከትግራይ ክልል ምስራቅ፤ ደቡብ ምስራቅ፤ ማዕከላዊ፤ ሰሜን ምዕራብ እና ምዕራብ ዞኖች፤ ከአማራ ክልል ሰሜን ማዕከላዊ፤ ደቡብ እና ምዕራብ ጎንደር፤ ምስራቅ እና ምዕራብ ጎጃም፤ ሰሜን እና ደቡብ ወሎ፤ ዋህማምራ፤ የኦሮሞ ብሄረሰብ ልዩ ዞን፤ አዊ እና ሰሜን ሸዋ ዞኖች፤ ከቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል መተከል፤ ካማሺ፤ አሶሳ እና የማኦኮሞ ልዩ ዞን፤ ከጋምቤላ ክልል ማዣንግ፤ አኝዋክ፤ ኑዌር እና የኢታንግ ልዩ ዞን፤ ከማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ጉራጌ፤ ስልጤ፤ ሀላባ፤ ሀዲያ፤ ከምባታ፤ ስልጤ እና ጠምባሮ ዞኖች፤ ከደቡብ ኢትዮጵያ ክልል አማሮ፤ አሪ፤ ባስኬቶ፤ ቡርጂ፤ ደራሼ፤ ጋሞ፤ ጎፋ፤ ጌዲኦ፤ ኮንሶ፤ ደቡብ አሞ እና ወላይታ ዞኖች፤ ሁሉም የሲዳማ ክልል ዞኖች፤ ሀረር እና ድሬዳዋ ላይ መደበኛና ከመደበኛ በላይ ዝናብ አግኝተዋል (ካርታ 3) ።

በኢትዮጵያ የሚቴዎሮሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎሮሎጂ ትንበያ፡




ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ



ካርታ 1 እ.ኤ.አ ከጁን 21 እስከ 30/2024 ድረስ
የነበረው የዝናብ መጠን በሚ.ሜ

ካርታ 2 እ.ኤ.አ ከጁን 21 እስከ 30/2024
ድረስ ዝናብ የዘነበባቸዉ ቀናት




ካርታ 3 እ.ኤ.አ ከጁን 21 እስከ 30/2024 ድረስ የነበረዉ የዝናብ መጠን ከመደበኛዉ
ጋር በመቶኛ ሲነፃፀር



እ.ኤ.አ ከጁን 21 እስከ 30/2024 የነበረው የአየር ሁኔታ በግብርና ሥራ

እንቅስቃሴ ላይ ያሳደረው ተፅዕኖ

ባለፉት ቀናት የነበረው እርጥበት ለመኸር የእርሻ ስራ እንቅስቃሴ አዎንታዊ ሚና የነበረው ሲሆን፤ አስቀድመው ለተዘሩም ሆነ በመዝራት ላይ ለነበሩ እንዲሁም በምዕራብና በደቡብ ምዕራብ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ ቀደም ብለው ለተዘሩ ለረጅም ጊዜ ሰብሎች የውሃ ፍላጎታቸውን ከማሟላት አንጻር አዎንታዊ ሚና ነበረው። በተጨማሪም በምስራቃዊ የሀገሪቱ አካባቢዎች ለሚገኙ የአርብቶ አደሮችና ከፊል አርብቶ አደሮች የተገኘው እርጥበት ለሰው ሰራሽም ሆነ የተፈጥሮ ምንጮችን ከማጎልበቱም በላይ የተሻለ የመጠጥ ውሃና የግጦሽ ሳር አቅርቦት እንዲኖር ጠቀሜታ ነበረው (ካርታ 4)፡፡



ካርታ 4 እ.ኤ.አ ከጁን 21 እስከ 30/2024 ድረስ የነበረው የእርጥበት ሁኔታ

እ.ኤ.አ ከጁን 21 እስከ 30/2024 የነበረው የአየር ሁኔታ በውሃው ዘርፍ ላይ

ያሳደረው ተፅዕኖ


ባለፉት ቀናት በአብዛኛው አባይ፣ ተከይ፣ አዋሽ፣ ባሮአኮቦ፣ ኦሞጊቤ፣ አፋር ደናክሌ፣ የላይኛው እና የመካከለኛው የስምጥ ሸለቆ፣ የላይኛው ዋቤ ሸበሌና ኦጋዴን ተፋሰሶች ላይ ከ እርጥበታማ እስከ ከፍተኛ የእርጥበት መጠን አግኝተዋል። ይህም ሁኔታ ለገጸ ምድርም

በኢትዮጵያ የሚቴዎሮሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎሮሎጂ ትንበያ፡



ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

ሆነ ለከርሰ ምድር የውኃ ሀብት መሻሻል እንዲሁም የግድቦችን እና የወንዞች የውኃ አቅም ከማሳልበት አንጻር አዎንታዊ ሚና ነበረው (ካርታ 5) ።



ካርታ 5 እ.ኤ.አ ከጁን 21 እስከ 30/2024 ድረስ የነበረው የእርጥበት ሁኔታ



እ.ኤ.አ ከጁላይ 1 እስከ 10/2024 የሚኖረው የአየር ሁኔታ


በመደበኛ ሁኔታ በጁላይ የመጀመሪያው አሥር ቀናት ዝናብ ሰጭ የሚቲዎሮሎጂ ክስተቶች በሁሉም የክረምት ዝናብ ተጠቃሚ በሆኑት የሀገሪቱ አካባቢዎችን የሚያዳርስበት ጊዜ ነው፡፡ ከዚህ ጋር በተያያዘም በምዕራብ፣ በደቡብ ምዕራብ፣ መካከለኛው እና በሰሜን ምዕራብ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ ነጎድጓዳማ እና ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ይዘወተራል፡፡

በሚቀጥሉት አሥር ቀናት ዝናብ ሰጭ የሚቲዎሮሎጂ ገጽታዎች የክረምት ዝናብ ተጠቃሚ በሆኑት የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ ይበልጥ ይጠናከራል፡፡ ስለሆነም በደቡብ ምዕራብ፣ በምዕራብ፣ በሰሜን ምዕራብ፣ በሰሜን፣ በመካከለኛው እና በሰሜን ምስራቅ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ በ24 ሰዓት ውስጥ ከ30 ሚ.ሜ በላይ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ እንደሚኖር የአሀዛዊ የትንበያ መረጃዎች ይጠቁማሉ (ካርታ 6) ፡፡ በተጨማሪም በምስራቅ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን ያለው ዝናብ ይገኛል፡፡

በአጠቃላይ በሚቀጥሉት አስር ቀናት ከኦሮሚያ ክልል ቡኖ በደሴ፣ ኢሉባቦር፣ ጅማ፣ ምስራቅ እና ምዕራብ ወለጋ፣ ሆሮ ጉዳሩ፣ ቄለም ወለጋ፣ ሰሜን ሸዋ (ሰላሌ)፣ ምዕራብ፣ ደቡብ ምዕራብ እና ምስራቅ ሸዋ ዞኖች፣ አዲስ አበባ፣ ከአማራ ክልል ሰሜን፣ ማዕከላዊ፣ ደቡብ እና ምዕራብ ጎንደር፣ ምስራቅ እና ምዕራብ ጎጃም፣ ዋህግምራ፣ አዊ፣ ሰሜን እና ደቡብ ወሎ፣ ሰሜን ሸዋ፣ የኦሮሞ ብሄረሰብ ልዩ ዞን፣ ከትግራይ ክልል ምዕራብ፣ ሰሜን ምዕራብ፣ ማዕከላዊ፣ ምስራቅ እና ደቡብ ምስራቅ ዞኖች፣ ከአፋር ክልል ቅልበቲ፣ ፈንቲ፣ አውሲ፣ ዞኖች፣ ከቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል መተከል፣ ፓዌ፣ አሶሳ፣ ካማሺ፣ ዞኖች እና ማኦ ኮሞ ልዩ ወረዳ፣ ከማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ጉራጌ፣ ምስራቅ ጉራጌ፣ ሃዲያ፣ ሀላባ፣ ከምባታ፣ ስልጤ፣ የየም ዞኖች፣ ጠምባሮ፣ ቀቤና እና ማረቆ ልዩ ወረዳ፣ ከደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል ዳውሮ፣ ከፋ፣ ሸካ፣ ኮንታ ዞኖች፣ ከደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ጎፋ፣ ጋሞ፣ ወላይታ፣ ጌድኦ፣ ባስኬቶ፣ አማሮ፣ ዞኖች፣ የሲዳማ ክልል ዞኖች ላይ ከመካከለኛ እስከ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ይገኛል (ካርታ 6 እና 7)፡፡ በተጨማሪም ከዕለት ወደ ዕለት ከሚጠናከሩት የአየር ሁኔታ ገጽታዎች ላይ በመነሳት ከኦሮሚያ ክልል ምስራቅና ምዕራብ ሀረርጌ፣ አርሲ እና ምዕራብ አርሲ፣ ባሌ እና ምስራቅ ባሌ፣ ጉጂ እና ምዕራብ ጉጂ ዞኖች፣

ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

ሀረር እና ድሬ ዳዋ፤ ከጋምቤላ ክልል ንዌር፤ አኝዋክ፤ ማኅንግ እና የኢታንግ ልዩ ዞን፤ ከሱማሌ ክልል ሲቲ፤ ፋፋን፤ ጀራር፤ ኤረር፤ ኖጎብ፤ ሊበን እና ዳዋ ዞኖች፤ ከአፋር ክልል ጋቢ እና ሀሪ ዞኖች፤ ከደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ኮንሶ፤ አሪ ደራሼ፤ ቡረጂ እና ደቡብ ኦሞ ዞኖች፤ ከደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል ቤንች ሸኮ፤ እና ምዕራብ ኦሞ ዞኖች ላይ ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን ያለው ዝናብ ያገኛሉ (ካርታ 6)፡፡



ካርታ 6 እ.ኤ.አ. ከጁላይ 1-10, 2024
የሚኖረው የዝናብ መጠን በሚሜ

ካርታ 7 እ.ኤ.አ. ከጁላይ 1-10, 2024
የሚኖረው ከፍተኛ የዝናብ መጠን

እ.ኤ.አ ከጁላይ 11 እስከ 20/2024 የሚኖረው የአየር ሁኔታ


በመደበኛ ሁኔታ በጁላይ ሀለተኛው አሥር ቀናት ዝናብ ሰጭ የሚቲዎሮሎጂ ገጽታዎች ይበልጥ የሚጠናከሩ ሲሆን፤ የክረምት ዝናብ ተጠቃሚ አካባቢዎች ላይ በመጠንም ሆነ በሥርጭት የተስፋፋ ዝናብ ሊኖር እንደሚችል የትንበያ መረጃዎች ይጠቁማሉ፡፡

በመጨረሻ የጁላይ ሁለተኛው አሥር ቀናት ዝናብ ሰጭ የሚቲዎሮሎጂ ገጽታዎች በአብዛኛው የሀገሪቱ ሥፍራዎች ተጠናክረው ይቀጥላሉ፡፡ በመሆኑም በደቡብ ምዕራብ፤ በምዕራብ፤ በሰሜን ምዕራብና በመካከለኛው የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ የተስፋፋና ጠንካራ የደመና ክምችት ይኖራቸዋል፡፡ ከዚህ ጋር በተያያዘም በክረምት ዝናብ ተጠቃሚ

ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

አካባቢዎች ላይ ብዙ ቦታዎቻቸውን የሚሸፍን ከቀላል እስከ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ይኖራቸዋል (ካርታ 8) ፡፡

Rainfall performance (mm) for 11-20 July 2024



ካርታ 8 እ.ኤ.አ ከጁላይ 11-20፣ 2024 የሚኖረው የዝናብ መጠን በሚ.ሜ



**እ.ኤ.አ ከጁላይ 1 እስከ 10/2024 የሚኖረው የአየር ሁኔታ አዝማሚያ በእርሻ
ሥራ ላይ ሊያሳድር የሚችለው ተፅዕኖ**

በሚቀጥሉት ቀናት የሚኖረው እርጥበት ወቅታቸውን ጠብቅው ለሚዘሩ የመኸር ሰብሎች ማለትም የጥራጥሬ ሰብሎችን፣ የቅባት እህሎችን፣ የጓሮ አትክልቶችንና ፍራፍሬዎችን ለመዝራትና ማሳን ለማዘጋጀት ከፍተኛ ጠቀሜታ ይኖረዋል። በተጨማሪም ከመጋቢት መጨረሻ ጀምሮ ለተዘሩና በተለያዩ የእድገት ደረጃ ለሚገኙ የረጅም ጊዜ ሰብሎችና ለቋሚ ተክሎች የውሃ ፍላጎትን ከማሟላት አንጻር ከፍተኛ ጠቀሜታ ይኖረዋል። በሌላ በኩል የሚጠበቀው እርጥበት የክረምት ተጠቃሚ በሆኑት የምስራቅ እና ሰሜን ምስራቅ አካባቢ በሚገኙ አርብቶ አደርና ከፊል አርብቶ አደር አካባቢዎች የአረንጓዴ እጽዋት ልምላሜን፣ የግጦሽ ሳርንና የመጠጥ ውሃ አቅርቦትን ከማሻሻል አንጻር አዎንታዊ ሚና ይኖረዋል።

በአንፃሩም ከባድ ዝናብ ጋር ተያይዞ በተለይም ለጎርፍ ተጋላጭ በሆኑና በረባዳማ አካባቢዎች ላይ የሰብሎች በጎርፍ የመጠረግ እና የአገፈር መሸርሸር ሊከሰት ስለሚችል ይህንን ለመከላከል የሚያስችል የጎርፍ መቀልበሻ ቦቶችንና የውሃ ማንጣፈፊያ ዘዴዎችን ከወዲሁ በማዘጋጀት አስፈላጊውን የቅድመ ጥንቃቄ ስራዎች ማከናወን ያስፈልጋል።

**እ.ኤ.አ ከጁላይ 1 እስከ 10/2024 የሚኖረው የአየር ሁኔታ አዝማሚያ በወሀው
ዘርፍ ላይ ሊያሳድር የሚችለው ተፅዕኖ**

በሚቀጥሉት አስር ቀናት በአብዛኛው አባይ፣ ተከሜ፣ ባሮ አኮቦ፣ የላይኛው እና የመካከለኛው ኦሞጊቤ፣ የስምጥ ሸለቆ፣ አዋሽ፣ የላይኛው ዋቢ ሸበሌና የገናሌ ዳዋ ተፋሰሶች ላይ የተሻለ የእርጥበት ሁኔታ እንደሚያገኙ ይጠበቃል። በተጨማሪም በአፋር ደናክል በታችኛው አዋሽ እንዲሁም በመካከለኛው ገናሌ ዳዋ መካከለኛ እርጥበት እንደሚኖራቸው የሚጠበቅ ሲሆን፤ ይህም ሁኔታ የግድቦች የውሃ መጠንን ከማሻሻል እንዲሁም የወንዞችን እና ሌሎች ውሃማ አካላት የተሻለ የውኃ መጠን እንዲኖራቸው ከማስቻል አንጻር አዎንታዊ ሚና እንደሚኖረው ይጠበቃል።