



ከሜይ 1-10 የነበረው የአየር ሁኔታ እንዲሁም

ከሜይ 11-20 እና ከሜይ 21-31/2025 የሚኖረው የአየር ሁኔታ

ትንበያ እና ምክረ ሃሳብ

ሚያ 2025

አዲስ አበባ



1. እ.ኤ.አ ከሜይ 1 እስከ 10/2025 የነበረው የአየር ሁኔታ

ባለፉት አስር ቀናት በደቡብ፣ በደቡብ ምዕራብ፣ በመካከለኛው፣ በምስራቅ እና በሰሜን ምስራቅ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ በተለይም በመጀመሪያዎቹ ስድስት ቀናት የተሻለ የደመና ሽፋን እና ክምችት ነበራቸው፡፡ ከዚህ ጋር ተያይዞ በደቡብ፣ በመካከለኛው፣ በምስራቅ እና በደቡብ ምዕራብ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ ከቀላል እስከ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ተመዝግቧል፡፡ ከመካከለኛ እስከ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ከተመዘገበባቸው የሚቴዎሮሎጂ ጣቢያዎች መካከል አዲስ አበባ ቦሌ 20.1፣ አዲስ አበባ ጥቁር እንበሳ 19.7 32.5፣ በአርባምንጭ 16.5፣ 15.7፣ ሀዋሳ 39.7፣ ደብረ ማርቆስ 31.5፣ 27፣ ቢሾፍቱ 30.2፣ ድሬ ዳዋ 20.4፣ 23.7፣ ጎሬ 20.2፣ ጅማ 45፣ መተሃራ 54.4፣ 28.6፣ ነቀምት 59.1፣ አቦምሳ 18.6፣ 88.7፣ አደሌ 20፣ አደት 17.4፣ አድዋ 24.2፣ አዲግራት 15.5፣ አይደር 16.5፣ ሐሮማያ 26፣ 17.2፣ አልም ከተማ 15.4፣ 26.5፣ አምቦ 18.9፣ 30.5፣ 22.5፣ 22.1፣ አምደ ወርቅ 32.9፣ አንገር ጉትን 20.4፣ አርጆ 18.8፣ 20.6፣ አርሲ ሮቤ 16.6፣ 48.2፣ አሶሳ 23.5፣ አዋሽ አርባ 18፣ አይሻ 26.6፣ ባቲ 29፣ 48፣ በደሌ 17፣ ብላቴ 19.2፣ 67.8፣ ቦሬ 18.1፣ 51.1፣ 18.1፣ 20.3፣ 19.6፣ ቡሂ 21.7፣ ቡርጂ 15.9፣ 16.3፣ ጨፋ 16.1፣ 15.7፣ ጭራ 27.7፣ 22፣ 26.4፣ ደባርቅ 19.4፣ 16.5፣ ደበረ ተቦር 15.2፣ ደምቢ ዶሎ 16.5፣ ዲላ 26.8፣ 19.4፣ 16፣ ዶሎ መና 20.8፣ 30.4፣ 40.3፣ ኢጃጂ 17.2፣ ፊቹ 26.1፣ ጋምቤላ 19.2፣ ገለምሶ 18.2፣ ወሊሶ 18.1፣ 18.5፣ ቡሌ ሆራ 35.8፣ 19.3፣ 31.2፣ ሐረር 23.9፣ ሆሳዕና 27፣ 17.3፣ 17.5፣ እምድብር 21.3፣ 22.6፣ 19.6፣ ጃራ 20.9፣ ጂንካ 35.7፣ ካቺሴ 32፣ ኮንሶ 16.2፣ 40፣ ቁሉምሳ 50.7፣ ሊሙ ገነት 17.2፣ ማይጨው 32.7፣ 29፣ ማጀቱ 29፣ 21፣ ማጂ 24.7፣ መኢሶ 24፣ 16.5፣ መካነ ሰላም 16.2፣ 26.3፣ ምዕራብ አባያ 30.2፣ 17፣ ሞያሌ 20.3፣ 24.4፣ አዳማ 40.3፣ ንፋስ መጨጨያ 21፣ ሳጢላ 20.3፣ 28.2፣ 25.8፣ ሰንቃጣ 24.2፣ ሻምቡ 56.5፣ ሾላ ገበያ 20.4፣ 42.8፣ ስሪንቃ 70.2፣ ቴፒ 49.4፣ ተርጫ 24.6፣ 32.6፣ ጽጽቃ 37.8፣ ወራቤ 15.2፣ 16.4፣ ወረኢሉ 18.6፣ ወላይታ ሶዶ 30.4፣ 18.7፣ 17.1፣ 17.4፣ ያቤሎ 33.1፣ የትኖራ 16.4፣ ባቲ 26.6፣ አዋሮ 18.7፣ ኩረፋ ጨሌ 15.7 እንዲሁም ሽላቦ 26.5፣ 90.1 ሚ.ሜ የሚደርስ ከመካከለኛ እስከ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ተመዝግቦባቸዋል፡፡

በአጠቃላይ ባለፉት አስር ቀናት በ32 የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ በ24 ሰዓት ውስጥ ከ30 ሚ.ሜ በላይ የሆነ ከባድ መጠን ያለው የዝናብ መጠን ነበራቸው፡፡ በተጨማሪም




በአንዳንድ የበልግ ተጠቃሚ በሆኑ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ በ24 ሰዓት ውስጥ 40-90.1 ሚ.ሜ የሚደርስ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ተመዝግቧል፡፡ ከ50 ሚ.ሜ በላይ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ከተመዘገበባቸው የሀገሪቱ አካባቢዎች መካከል ሽላቦ፣ አቦምሳ፣ ሲረንቃ፣ ብላቴ፣ ነቀምት፣ ሻምቡ፣ መተሃራ፣ ቦሬ፣ ቁሉምሳ ይገኙበታል (ምስል 1)፡፡



ምስል:1 ከሜይ 1-10 በ24 ሰዓት ውስጥ ከ35 ሚ.ሜ በላይ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ የተመዘገበባቸው

ባለፉት አስር ቀናት የዘነበዉ የዝናብ መጠን ከሀገሪቱ ቦታ ሽፋን አንፃር

ሲገመገም፣ ከደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ጎፋ፣ ጋሞ፣ ወላይታ፣ ጌዲዮ፣ የደቡብ ኦሞ፣ ባሕቤቶ፣ ኮሬ፣ ቡርጂ፣ አሌ፣ ኮንሶ፣ አሪ፣ ጋርዱላ ዞኖች ፣ ከደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል ኮንታ፣ ዳዉሮ፣ ከፋ፣ ምዕራብ ኦሞ፣ ሸካ፣ ቤንች ሸኮ ዞኖች፣ የሲዳማ ክልል ዞኖች፣ ከማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ጉራጌ፣ ምስራቅ ጉራጌ፣ የሀዲያ፣ ስልጤ፣ የከንባታ፣ የሃላባ፣ የም ዞኖች፣ ቀቤና፣ ማረቆ፣ ጠምባሮ ልዩ ወረዳ፣ ከኦሮሚያ ክልል ቦረና፣ ምስራቅ ቦረና፣ ጉጂ፣ ምዕራብ ጉጂ፣ ባሌ፣ ምስራቅ ባሌ፣ ምዕራብ አርሲ፣ አርሲ፣ ጅማ፣ ቡኖ በደሌ፣ ኢሊባቦር፣ ሁሉም የሸዋ ዞኖች፣ ከሱማሌ ክልል የዳዋ፣ ሊበን፣ አፍዴር፣ ኤረር እና የሲቲ፣ ዞኖች፣ ከአማራ ክልል ምስራቅ ጎጃም፣ የሰሜን የደቡብ ጎንደር ዞኖች የሰሜን እና የደቡብ ወሎ፣ የሰሜን ሸዋ እና ዋግህምራ ዞኖች፣ ከትግራይ ክልል የመካከለኛው የምስራቅ፣ የደቡብ ምስራቅ እና የደቡብ ትግራይ ዞኖች፣ ከአፋር ክልል ቀልበቲ፣ ፋንቲ፣ ማሂ፣ ሃሪ እና የጋቢ ዞኖች፣ አዲስ አበባ፣ ድሬ ደዋና ሐረር ላይ ከ31-160 ሚ.ሜ የሚደርስ ዝናብ ከ5-10 ቀናት ያህል ዝናብ ነበራቸው (ካርታ 1 እና 2) ፡፡




ካርታ 1 እ.ኤ.አ ከሜይ 1 እስከ 10/2025 ድረስ የነበረው የዝናብ መጠን በሚ.ሜ




ባለፉት አስር ቀናት የዘነበዉ የዝናብ መጠን ከመደበኛዉ ጋር ሲነፃፀር ከደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ጎፋ፣ ጋሞ፣ ወላይታ፣ ጌዲዮ፣ የደቡብ አሞ፣ ባስኬቶ፣ ኮሬ፣ ቡርጂ፣ አሌ፣ ኮንሶ፣ አሪ፣ ጋርዱላ ዞኖች ፤ ከደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል ኮንታ፣ ዳዉሮ፣ ከፋ፣ ምዕራብ አሞ፣ ሸካ፣ ቤንች ሸኮ ዞኖች፣ የሲዳማ ክልል ዞኖች፣ ከማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ጉራጌ፣ ምስራቅ ጉራጌ፣ የሀዲያ፣ ስልጤ፣ የከንባታ፣ የሃላባ፣ የም ዞኖች፣ ቀቤና፣ ማረቆ፣ ጠምባሮ ልዩ ወረዳ፣ ከአሮሚያ ክልል ቦረና፣ ምስራቅ ቦረና፣ ጉጂ፣ ምዕራብ ጉጂ፣ ባሌ፣ ምስራቅ ባሌ፣ ምዕራብ አርሲ፣ አርሲ፣ ጅማ፣ ሆሮ ጉድሩ ወለጋ፣ ምስራቅ ወለጋ፣ ሁሉም የሸዋ ዞኖች፣ ከሱማሌ ክልል የዳዋ፣ ሊበን፣ አፍዴር፣ ነጎብ፣ ጃራር፣ ኤረር፣ ፋፋን እና የሲቲ፣ ዞኖች፣ ከአማራ ክልል ምስራቅ ጎጃም፣ የሰሜን የደቡብ ጎንደር ዞኖች የሰሜን እና የደቡብ ወሎ፣ የሰሜን ሸዋ እና ዋጋህምራ ዞኖች፣ ከትግራይ ክልል የምዕራብ፣ የሰሜን ምዕራብ፣ የመካከለኛዉ የምስራቅ፣ የደቡብ ምስራቅ እና የደቡብ ትግራይ ዞኖች፣ ከአፋር ክልል ቀልበቲ፣ ፋንቲ፣ ማሂ፣ ሃሪ፣ ሃዉሲ እና የጋቢ ዞኖች፣ አዲስ አበባ፣ ድሬ ደዋና ሐረር መደበኛ እና ከመደበኛ በላይ የሆነ የዝናብ መጠን ተመዝግቧል (ካርታ 3) ፡፡

በሌላ በኩል በአቦቦ፣ በአሶሳ፣ በአዋሽ አርባ፣ በአይሻ፣ በባቲ፣ በብላቴ፣ በቻግኒ፣ በጨፋ፣ በጨዋቃ፣ በድሬ ዳዋ፣ በፉኙዶ፣ በጋምቤላ፣ በገዋኔ፣ በጎዴ፣ ጎንደር፣ በቀበሪዳሀር፣ ላይብር፣ በመኢሶ፣ በመተሃራ፣ በመተማ፣ በምዕራብ አባያ፣ በሰመራ፣ በሻምቡ፣ በሸርቆሌ፣ ሸዋሮቢት እና በቴፒ አካባቢዎች ላይ የቀኑ ከፍተኛ የሙቀት መጠን ከ 33.2 እስከ 43.0 ዲግሪ ሴልሽየስ ተመዝግቧል (ካርታ 4) ፡፡




ካርታ 2 እ.ኤ.አ ከሚያ 1 እስከ 10/2025 ድረስ ዝናብ የዘነበባቸዉ



የዘነበዉ የዝናብ መጠን ከረጅም ጊዜ አማካይ ጋር ሲነፃፀር ከመደበኛ በታች መደበኛ ከመደበኛ በላይ

ካርታ 3 እ.ኤ.አ ከሚያ 1 እስከ 10/2025 የነበረዉ




ካርታ 4 እ.ኤ.አ ከሚያ 1 እስከ 10/2025 ድረስ የነበረዉ የቀኑ ከፍተኛ የሙቀት መጠን በዲ.ሴ

1.2 እ.ኤ.አ ከሜይ 1 እስከ 10/2025 የነበረው የእርጥበት ሁኔታ በግብርና ሥራ እንቅስቃሴ ላይ ያሳደረው ተፅዕኖ

ባለፉት የሜይ የመጀመሪያው አስር ቀናት የበልግ አብቃይና ዝናብ ተጠቃሚ በሆኑት በደቡብ፣ በደቡብ ምስራቅ፣ በመካከለኛው፣ በሰሜን፣ በሰሜን ምስራቅ፣ በምስራቅ እና በደቡብ ምዕራብ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ የተገኘው እርጥበት ቀደም ብለው ለተዘሩና በተለያዩ የእድገት ደረጃ ላይ ለሚገኙ የበልግ ሰብሎች፣ ለጓሮ አትክልቶችና ለቋሚ ተክሎች የውሃ ፍላጎት መሟላት ከፍተኛ ጠቀሜታ ነበረው። በተጨማሪም የነበረው የእርጥበት ሁኔታ ቀደም ብለው ከኤፕሪል ወር ጀምሮ ለተዘሩ የመኸር ወቅት ሰብሎችን የውሃ ፍላጎት ከማሟላት አንጻርም ሆነ ከሰኔ በኋላ ለሚዘሩ የመኸር ሰብሎች የማሳ ዝግጅት ምቹ ሁኔታን የፈጠረ ነበር። ከዚህም በተጨማሪ የተገኘው እርጥበት በአርብቶ አደርና ከፊል አርብቶ አደር አካባቢዎች ለመጠጥ ውሃና ለግጦሽ ሣር አቅርቦት መሻሻል የጎላ ጠቀሜታ እንደነበረው ተስተዋል። በተመሳሳይ ሁኔታ የነበረው ከፍተኛ መጠን ያለው እርጥበት በአንዳንድ እርጥበት አጠር በሆኑት አካባቢዎች የዝናብ ውሃን ለማሰባሰብና ለማከማቸት መልካም አጋጣሚን ፈጥሯል።

በሌላ በኩል በአንዳንድ ሥፍራዎች ላይ የነበረው ከፍተኛ መጠን ያለው እርጥበት በረባዳማ እና የአፈር ጸባያቸው ውሃን በማያሰርጉ እና በወንዝ ዳርቻ አካባቢዎች በሚገኙ ማሳዎች ላይ መጠነኛ የሆነ የውሃ በሰብሎች ላይ መተኛት እና በጎርፍ መጠረግ ሊያስከትል የሚችል አቅም እንደነበረው የተተነተኑ የግብርና ሚቴዎሮሎጂ መረጃዎች ያመለክታል (ካርታ 5) ።



ካርታ 5 እ.ኤ.አ ከሜይ 1 እስከ 10/2025 ድረስ የነበረው የእርጥበት ሁኔታ



2. መግቢያ


ሜይ የበልግ ወቅት የመጨረሻ ወር ሲሆን የዝናቡ መጠንና ሥርጭት ከደቡብና ከደቡብ ምሥራቅ በልግ አብቃይ አካባቢዎች ላይ ከሞላ ጎደል ቀጣይነት ይኖረዋል። በተጨማሪም ለክረምት ዝናብ መፈጠር ምቹ ሁኔታ የሚፈጥሩ የአየር ሁኔታ መጠናከር ጋር ተያይዞ ዝናቡ በደቡብ ምዕራብ፣ በምዕራብና በሰሜን ምዕራብ አካባቢዎች ላይ እየተስፋፋ በመሄድ ብዙ ቦታዎችን ይሸፍናል። በዚህም መሠረት አብዛኛው የኦሮሚያ ክልል፣ የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ፣ የደቡብ ኢትዮጵያ፣ የማዕከላዊ ኢትዮጵያ፣ የሲዳማ ክልል፣ የጋምቤላና የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ከ121-260 ሚ.ሜ የሚደርስ ዝናብ ከ15-20 ቀናት ያህል ያገኛሉ። በሌላ በኩል ደግሞ የትግራይና የአማራ ምዕራባዊ ክፍልና የሱማሌ አካባቢዎች ከ41 እስከ 120 ሚ.ሜ የሚደርስ ዝናብ ለ10 ቀናት ያህል በአማካይ ያገኛሉ። ከበልግ ወቅት ዝናብ ድርሻ አኳያ በሜይ የመካከለኛው፣ የደቡብና የደቡብ ምስራቅ የሀገሪቱ ክፍሎች እስከ 30% የሚሆነውን የወቅቱን የዝናብ ድርሻ ያገኛሉ።

2.1 እ.ኤ.አ ከሜይ 11 እስከ 20/2025 የሚኖረው የአየር ሁኔታ ትንበያ

በሜይ የሁለተኛው አስር ቀናት ለዝናብ መፈጠር አስዋጽኦ የሚያደርጉ የሚቲዎሮሎጂ ገጽታዎች በአብዛኛው የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ እንደሚቀጥሉ የትንበያ መረጃዎች ይጠቁማሉ (ካርታ 1)። በመሆኑም በሚቀጥሉት አሥር ቀናት የበልግ ዝናብ ተጠቃሚ ስፍራዎች ላይ ለዝናብ መፈጠር አመቺ የሆኑ የሚቲዎሮሎጂ ገጽታዎች በተለይም ከሳምንቱ አጋማሽ በኋላ አንጻራዊ ጥንካሬ እንደሚኖራቸውና በተለይም የምድር ወገብን በማቋረጥ ወደ ሀገራችን የሚገባው ዕርጥበት አዘል የአየር ሁኔታ ጋር ተያይዞ የተሻለ የዝናብ ሥርጭት ይኖራቸዋል። ከዚህ ጋር በተያያዘም በደቡብ ምዕራብ፣ በምዕራብ፣ በደቡብ ምስራቅ፣ በምስራቅ፣ እንዲሁም በስምጥ ሸለቆ አካባቢዎች የተሻለ የዝናብ መጠንና ስርጭት ይኖራቸዋል (ካርታ 7)።


በሚቀጥሉት ቀናቶች ከሚጠናከሩት የሚቲዎሮሎጂ ገጽታዎች ላይ በመነሳት የበልግ ዝናብ ተጠቃሚ አካባቢዎች ጨምሮ የደቡብ ምስራቅ፣ የምስራቅ እና የመካከለኛው የሀገሪቱ ቦታዎቻቸውን የሚሸፍን ከቀላል እስከ መካከለኛ (ከ1-30 ሚ.ሜ) መጠን ያለው ዝናብ ያገኛሉ። በተጨማሪም አልፎ አልፎ በውሃ አካላትና በከባቢ አየር ውስጥ ከሚጠናከሩት የሚቲዎሮሎጂ ገጽታዎች ላይ በመነሳት በደቡብ ምዕራብ፣ በምዕራብ እና በደቡብ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ በ24 ሠዓት ውስጥ ከ30 ሚ.ሜ በላይ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ እንደሚያገኙ አሃዛዊ የትንበያ መረጃዎች ይጠቁማሉ (ካርታ 8)።

Total Rainfall (mm) for 11-21 May 2025



ካርታ 7 እ.ኤ.አ. ሜይ 11-20, 2025 የሚኖረው የዝናብ መጠን በሚ.ሜ

Exceptional Rainfall for 10-11 May 2025



ካርታ 8 እ.ኤ.አ. ከሜይ 11-20, የሚኖረው የዝናብ መጠን ከረጅም ጊዜ አማካይ ሲነፃፀር

**በኢትዮጵያ የሚኒስቴር ሚኒስትር ኢንስቲትዩት የሚኒስቴር ትንበያ፣ ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ
እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ**



ሠንጠረዥ 1፡ በሚቀጥሉት ቀናቶች ዝናብ የሚያገኙ አካባቢዎችና የሚያገኙት የዝናብ መጠን


ክልል	ዞን	የሚኖረው የዝናብ መጠን
አሮሚያ	ቁለም ወለጋ፣ ሆሮ ጉድሩ ወለጋ፣ ምስራቅ ወለጋ፣ ምዕራብ ወለጋ፣ ጅማ፣ ኢሉባቦር፣ ቡኖ በደሌ፣ ምዕራብ ጉጂ እና ጉጂ ባሌ፣ ምዕራብ አርሲ፣ ምስራቅ ሐረርጌ ዞኖች	ከመካከለኛ እስከ ከባድ መጠን (ከ 30 ሚ.ሜ በላይ)
	ቦረና፣ ምስራቅ ቦረና፣ አርሲ፣ ምስራቅ ባሌ፣ ምዕራብ ሐረርጌ፣ ሁሉም የሸዋ ዞኖች፤	ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን (ከ1-29 ሚ.ሜ)
ደቡብ ኢትዮጵያ	ወላይታ፣ ጋሞ፣ ጎፋ፣ ጌድዮ፣ ኮሬ፣ ባስኬቶ እና አሪ ዞኖች	ከመካከለኛ እስከ ከባድ መጠን (ከ 30 ሚ.ሜ)
	ኮንሶ፣ ቡርጂ፣ አሌ፣ ጋርዱላ፣ ደቡብ አሞ ዞኖች	ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን (ከ1-29 ሚ.ሜ)
ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ	ከፋ፣ ኮንታ፣ ዳውሮ፣ ቤንች ሸኮ፣ ሸካ፣ ምዕራብ አሞ	ከመካከለኛ እስከ ከባድ መጠን (ከ11 እስከ 30 ሚ.ሜ)
ሶማሌ	ዳዋ፣ ሊበን፣ አፍዴር፣ ሸበሌ፣ ቆራሂ፣ ነጎብ፣ ኤረር፣ ጃራር ዶሎ፣ ፋፈን እና ሲቲ ዞኖች	ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን (ከ1-29 ሚ.ሜ)
አማራ	የሰሜን እና የምዕራብ ጎጃም፣ የመካከለኛው የሰሜን እና የምዕራብ ጎንደር ዞኖች፣ የአዊ ዞኖች	ከመካከለኛ እስከ ከባድ መጠን (ከ11 እስከ 30 ሚ.ሜ)
	የምስራቅ ጎጃም፣ የደቡብ ጎንደር፣ የባህርዳር ዙሪያ፣ ዋግ ህምራ፣ ሰሜን እና የደቡብ ወሎ፣ የሰሜን ሸዋ ዞኖች፤	ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን (ከ1-29 ሚ.ሜ)
ትግራይ	የምዕራብ እና የሰሜን ምዕራብ ትግራይ ዞኖች	ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን (ከ1-29 ሚ.ሜ)
	የደቡብ፣ የደቡብ ምስራቅ፣ የመካከለኛው እና የምስራቅ ዞኖች	ቀላል መጠን
ሲዳማ ክልል	ሁሉም የክልሉ ዞኖች	ከመካከለኛ እስከ ከባድ መጠን (ከ11 እስከ 30 ሚ.ሜ)



ማዕከላዊ ኢትዮጵያ	ጉራጌ፣ ምስራቅ ጉራጌ፣ ስልጤ፣ ሀዲያ፣ ከምባታ፣ ሀላባ፣ የም፣ ጠምባሮ ልዩ ወረዳ፣ ቀቤና ልዩ ወረዳ፣ማረቆ ልዩ ወረዳ	ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን (ከ1-29 ሚ.ሜ)
ጋምቤላ	አኝዋክ፣ መሻጥንግ፣ የኑዌር እና የኢታንግ ልዩ ወረዳ	ከቀላል እስከ ከመካከለኛ መጠን (ከ1-29 ሚ.ሜ)
ቤንሻንጉል ጉምዝ	ካማሺ፣ መተከል፣ አሶሳ፣ ማኦ ኮሞ ዞኖች	ከመካከለኛ እስከ ከባድ መጠን (ከ11 እስከ 30 ሚ.ሜ)
አዲስ አበባ፣ ድሬደዋ እና ሐረሪ		ከቀላል መጠን እስከ መካከለኛ መጠን (ከ1-29 ሚ.ሜ)

2.3 የሚኖረው የቀኑ ከፍተኛ የሙቀት ሁኔታ


በበልግ ወቅት በመደበኛነት ትኩረት ከሚሸፍን የአየር ሁኔታ ክስተቶች መካከል ቀን ላይ የሚኖረው የሙቀት መጠንና ሌሊት ላይ ደግሞ የሚታየው ወበቅ አንዱ ነው። በሜይ የሁለተኛው አስር ቀናት ከሚኖረው ከፍተኛ የፀሐይ ሀይል ጋር በተያያዘ በተለይም በአፋር፣ በምዕራብ አማራ፣ በጋምቤላ፣ በሶማሌ እና በቤንሻንጉል-ጉምዝና አካባቢዎች ላይ የቀኑ ከፍተኛ ሙቀት 29 ዲግሪ ሴልሺየስ እንዲሁም በጥቂት ስፍራዎቻቸው ላይ ከ35 ዲግሪ ሴልሺየስ በላይ እንደሚሆን የትንበያ መረጃዎች ያሳያሉ (ካርታ 9)።





2.4 እ.ኤ.አ ከሜይ 21 እስከ 31/2025 የሚኖረው የአየር ሁኔታ አዝማሚያ

በመጨረሻው የሜይ ሶስተኛው አስራ አንድ ቀናት ለዝናብ መፈጠር አስዋጽኦ ሊያደርጉ የሚችሉ የሚቲዎሮሎጂ ገጽታዎች በደቡብ ምዕራብ እና በምዕራብ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ ተጠናክረው እንደሚቀጥሉ የትንበያ መረጃዎች ይጠቁማሉ። ከዚህ ጋር ተያይዞ በሜይ የሶስተኛው አሥራ አንድ ቀናት የበልግ ዝናብ ተጠቃሚ ስፍራዎች ላይ ለዝናብ መፈጠር አመቺ የሆኑ የሚቲዎሮሎጂ ገጽታዎች ቀጣይነት እንደሚኖራቸውና በተለይም የምድር ወገብን አቋርጦ ወደ ሀገራችን የሚገባው ዕርጥበት አዘል የአየር ሁኔታ ጋር ተያይዞ የተሻለ የደመናና የዝናብ ሥርጭት በደቡብ፣ በደቡብ ምዕራብ፣ በምዕራብ፣ በመካከለኛው እና በሰሜን ምእራብ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ ከቀላል እስከ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ እንደሚኖራቸው የትንበያ መረጃዎች ይጠቁማሉ (ካርታ 10)።



ካርታ 10 እ.ኤ.አ. ከሜይ 21-31, 2025 የሚኖረው የዝናብ መጠን በሚ.ሜ

2.5 እ.ኤ.አ ከሜይ 11 እስከ 20/2025 የሚኖረው የአየር ሁኔታ በግብርናው ሥራ እንቅስቃሴ ላይ ሊያሳድር የሚችለው ተፅዕኖ

በሚቀጥለው ሁለተኛው አሥር ቀናት በአብዛኛዎቹ የበልግ ዝናብ ተጠቃሚ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ የሚጠበቀው እርጥበት ቀደም ብለው ለተዘሩ የበልግ ሰብሎች ፍሬ ለማፍራትና ለቋሚ ተክሎች የውሃ ፍላጎት መሟላት እንዲሁም የረጅም ጊዜ ሰብሎችን ለመዝራት እና ቀደም ብለው ለተዘሩ ሰብሎች እድገት ምቹ ሁኔታ እንደሚፈጥር ይጠበቃል። በተጨማሪም የሚጠበቀው እርጥበት ለአርብቶ አደሮችና ከፊል አርብቶ አደር አካባቢዎች ለእንሰሳት መኖርና ለመጠጥ ውሃ አቅርቦት ከፍተኛ ጠቀሜታ ይኖረዋል። በአንጻሩ አልፎ አልፎ በደቡብ ምዕራብ፣ በምዕራብ እና በደቡብ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ የሚጠበቀው ከባድ ዝናብ ለወቅቱ የእርሻ ስራ እንቅስቃሴ አመቺ ሁኔታን የሚፈጥር ቢሆንም በተወሰኑ ውሃ ገብ በሆኑና በወንዝ ዳርቻ ባሉ ማሳዎች ላይ የውሃ መተኛትና የአፈር መታጠብን ሊያስከትል ይችላል። ባጠቃላይ በመጨረሻው የሜይ ሁለተኛው አስር ቀናት የሚኖረውን አሉታዊ ተጽዕኖ



ለመቀነስና የሚኖሩትን መልካም አጋጣሚዎች ለመጠቀም ከታች ያሉትን ቦታ ተኮር የግብርና ሚኒስቴር ምክረ ሀሳቦች በተገቢው ሁኔታ መተግበር ያስፈልጋል፡፡

ሠንጠረዥ 2፡ በሚቀጥሉት አስር ቀናት የሚኖረው የእርጥበት ሁኔታ በግብርናው እንቅስቃሴ ላይ

ዞኖች	የእርጥበት ሁኔታ	አዎንታዊ ተጽዕኖ	አሉታዊ ተጽዕኖ	የተሰጠ ምክረ ሃሳብ
የበልግ እርጥበት ተጠቃሚ የመኸር አምራች ዞኖች				
ቁለም ወለጋ፣ ሆሮ ጉድሩ ወለጋ፣ ምስራቅ ወለጋ፣ ምዕራብ ወለጋ፣ ጅማ፣ ኢሉባቦር፣ ቡኖ በደሌ፣ ምዕራብ ጉጂ እና ጉጂ፣ ባሌ፣ ምዕራብ አርሲ፣ ምስራቅ ሐረርጌ፣ የሰሜን እና የምዕራብ ጎጃም፣ የመካከለኛው፣ የሰሜን እና የምዕራብ ጎንደር ዞኖች፣ አዊ፣ ካማሺ፣ መተከል፣ አሰሳ፣ ማኦ ኮሞ፣ ከፋ፣ ኮንታ፣ ዳውሮ፣ ቤንች ሸኮ፣ ሸካ፣ ምዕራብ ኦሞ ዞኖች	ከመካከለኛ እስከ ከባድ መጠን ያለው እርጥበት	• ለመኸር እርሻ የማሳ ዝግጅት ለማከናወን • የረጅም ጊዜ ሰብሎችን ለመዝራት • የመጠጥ ውሃና የግጦሽ ሳር አቅርቦት ለመሻሻል • ለቋሚ ተክሎች የውኃ ፍላጎት መሟላት	• የእርጥበት መብዛትን በማይቋቋሙ የአፈር ጠባይ ያላቸው ማሳዎች መጨቅየት እና የውኃ መተኛት • ውሃገብ በሆኑና በወንዝ ዳርቻ ባሉ ሰብሎች ላይ የአፈር መታጠብ እንዲሁም የመሬት መንሸራተት	• የሚገኘውን እርጥበት በመጠቀም የመኸር እርሻን ቀድመው የሚጀምሩ አካባቢዎች የማሳ ዝግጅት ማከናወን እና ዘር መዝራት • የውሃ ማንጣፈፍያ እና የጎርፍ መቀልበሻ ቦታዎችን ከወዲሁ በማዘጋጀት ጥቅም ላይ ማዋል ያስፈልጋል፡፡
የምስራቅ ጎጃም፣ የደቡብ ጎንደር፣ የባህርዳር ዙሪያ፣ ዋግ ህምራ፣ የምዕራብ እና የሰሜን ምዕራብ ትግራይ ዞኖች አኝዋክ፣ መሻሻንግ፣ የኑዌር እና የኢታንግ ልዩ ወረዳ	ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን ያለው እርጥበት	• ለመኸር እርሻ ስራ እንቅስቃሴ የማሳ ዝግጅት ለማከናወን • የረጅም ጊዜ ሰብሎችን ለመዝራት • የመጠጥ ውሃና የግጦሽ ሳር አቅርቦት መሻሻል • ለቋሚ ተክሎች የውኃ ፍላጎት መሟላት	• ከፍተኛ ትነት በሚኖርባቸው አካባቢዎች መጠነኛ የሆነ የአፈር ዉስጥ እርጥበት መኖር	• የእርጥበት እጥረት ባለባቸው አካባቢዎች የአፈርና የውሃ እቀባ ስራ ማከናወን • የዝናብ ውኃን በማሰባሰብ በደረቅ ሰሞናት ተግባር ላይ ማዋል



በልግ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው የሆኑ ዞኖች				
ዋግ ህምራ፣ ሰሜን እና የደቡብ ወሎ፣ የሰሜን ሸዋ፣ የደቡብ፣ የደቡብ ምስራቅ፣ የመካከለኛው እና የምስራቅ ትግራይ ዞኖች፣ ጉራጌ፣ ምስራቅ ጉራጌ፣ ስልጤ፣ ሀዲያ፣ ከምባታ፣ ሀላባ፣ የም፣ ጠምባሮ ልዩ ወረዳ፣ ቀቤና ልዩ ወረዳ፣ማረቆ ልዩ ወረዳ፣ አዲስ አበባ፣ድሬደዋ እና ሐረሪ፣ አርሲ፣ ምስራቅ ባሌ፣ ምዕራብ ሐረርጌ፣ ሁሉም የሸዋ ዞኖች፣ ኤረር፣ ጃራር፣ ፋፈን እና ሲቲ ዞኖች	ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን ያለው እርጥበት	• ለበልግ እድገት • ለመኸር ግብርና እንቅስቃሴ የማሳዘጋጀትና ዘር ለመዝራት • ለእንስሳት መኖር የመጠጥ ውሃ አቅርቦት መሻሻል	• የሚኖረው እርጥበት ለሰብሎች የውሃ ፍላጎት በቂ አለመሆን • ደረቅ ሰሞናት መኖር • ከፍተኛ ትነት መኖር	• የሚገኘውን እርጥበት በመጠቀም የመኸር የማሳዘጋጀት ማከናወን • የአፈርና የውሃ እቀባ ማከናወን • የዝናብ ውኃን በማሰባሰብ በደረቅ ሰሞናት ተግባር ላይ ማዋል
በልግ ዋነኛ የዝናብ ወቅታቸው የሆኑ ዞኖች				
ወላይታ፣ ጋሞ፣ ጎፋ፣ ጌድዮ፣ ኮሬ፣ ባስኬቶ፣ አሪ እና ሁሉም የሲዳማ ዞኖች	ከመካከለኛ እስከ ከባድ መጠን ያለው እርጥበት	• ሰብል አብቃይ በሆኑት አካባቢዎች ለተዘፋ ሰብሎች እድገትና ፍሬ ለማፍራት • ለእንስሳት መኖር የመጠጥ ውሃ አቅርቦት • የዝናብ ውኃ ለማሰባሰብና ለማጠራቀም	• ተዳፋታማ በሆኑ አካባቢዎች የውሃ በማሳዎች ላይ መተኛት • የአፈር መሸርሸር	• ረባዳማ በሆኑ ማሳዎች ላይ የእርጥበት መብዛት እና ውሃ በሰብሎች ላይ መተኛትን ሊያስከትሉ ስለሚችሉ ይህንን ለመከላከል የሚያስችሉ የውሃ ማንጣፊፍ ስራዎችን መስራትና የጎርፍ መቀልበሻ ቦቶችን በማዘጋጀት የቅድመ ጥንቃቄ ስራ መስራት • የአፈርና የውሃ እቀባና የእርከንስራ ማከናወን
ቦረና፣ ምስራቅ ቦረና፣ ኮንሶ፣ ቡርጂ፣ አሌ፣ ጋርዱላ፣ ደቡብ አሞ ዞኖች፣ ዳዋ፣ ሊበን፣ አፍዴር፣ ሸበሌ፣ ቆራሂ፣ ነጎብ፣ ዶሎ	ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን ያለው እርጥበት	• ለተዘፋ እድገትና ፍሬ ለማፍራት • የዝናብ ውኃ ለማሰባሰብና ለማጠራቀም • ለእንስሳት መኖር የመጠጥ ውሃ አቅርቦት	• ከፍተኛ ትነት መኖር • ደረቅ ሰሞናት መኖር • የሚኖረው እርጥበት ለሰብሎች የውሃ ፍላጎት በቂ አለመሆን	• የዝናብ ውኃን በማሰባሰብ በደረቅ ሰሞናት ተግባር ላይ ማዋል



2.6 እ.ኤ.አ ከሚያ 11 እስከ 20/2025 የሚኖረው የአየር ሁኔታ በውኃ ዘርፍ ላይ ሊያሳድር የሚችለው ተፅዕኖ

በሚቀጥሉት የሚያ ሁለተኛ አስር ቀናት የበልግ እርጥበት ተጠቃሚ የሆኑት ተፋሰሶች ከመጠነኛ እስከ ከፍተኛ እርጥበት ያገኛሉ። በመሆኑም የሚጠበቀውን እርጥበት ከግንዛቤ ውስጥ በማስገባት ሊኖር የሚችለው አሉታዊ ለመቀነስ እና ሊኖር የሚችለውን መልካም አጋጣም አልቆ ለመጠቀም እንዲቻል ከታች የተቀመጡትን የውሃ ሚቴዎርሎጂ ምክረ ሀሳብ በመተግብር የቅድመ ዝግጅት ማድረግ ያስፈልጋል፡፡

**በኢትዮጵያ የሚቲዎሮሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቲዎሮሎጂ ትንበያ፣ ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ
እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ**



ሠንጠረዥ 3፡ በሚቀጥሉት አስር ቀናት የሚኖረው የእርጥበት ሁኔታ በወሃው ዘር ላይ

ተፋሰሶች	የሚጠበቀው እርጥበት	አዎንታዊ ተፅዕኖ	አሉታዊ ተፅዕኖ	የውኃ ሚቲዎሮሎጂ ምክረ ሃሳብ
በመካከለኛ እና ታችኛው ኦሞ ጊቤ፣ ስምጥ ሸለቆ፣ ገናሌ ዳዋ፣ በላይኛው ዋቢ ሸበሌ፣ አባይ እና ባሮ አካባቢ	ከመካከለኛ እስከ ከፍተኛ እርጥበት	- የመጠጥ ውኃ አቅርቦት መሻሻል - የገፀ ምድር የውሃ ፍሰት መሻሻል - የመስኖ እና የሀይል ማመንጫ ግድቦች የውኃ ክምችት መሻሻል	- ቅፅበታዊ ጎረፍ - የውሃ በጎርፍ መበክል - የደለል ስጋት - የውኃ ወለድ በሽታዎች ስጋት መጨመር	- የፍላሽ መውረጃዎች ማፅዳት - የጎርፍ መቀልበሻ ቦይ እንዳሰፈላጊነቱ ማዘጋጀት - የመጠጥ ውኃን አክሞ መጠቀም - በጎርጎር እንዲሁም በወንዝ ዳርቻ የሚኖሩ ግንዛቤ መስጠት ወይም ማስተጠንቀቅ - ትንበያዎችን በቅርበት መከታተል - የእርጥበት እጥረት ያለባቸው አካባቢዎች የዝናብ ውሃ ማሰባሰብ
በመካከለኛው እና ታችኛው ባሮ አካባቢ፣ ተከቤ አባይ፣	ከአነስተኛ እስከ መካከለኛ እርጥበት	- የገፀ ምድር የውሃ ፍሰት በመጠኑ መሻሻል - የጎርፍ ስጋት እና የመሬት መንሸራተት	- የመጠጥ ውኃ አቅርቦት ማነስ - ከፍተኛ ትነት	- የዝናብ ውኃ የተለያዩ ዘዴዎች በመጠቀም ማሰባሰብ እና ማጠራቀም - የሚገኘውን የዝናብ ውኃ ከብክነት እና ከብክለት በመከላከል ማስተዳደር - የዝናብ ውኃ ማሰባሰብና ማጠራቀም - ከመሬት እና ጣራ ላይ የዝናብ ውኃ የማሰባሰብ ተግባራትን ማከናወን
በአብዛኛው በአይሻ፣ አፋር ደናከል፣ መረብጋሽ፣ አዋሽ ተፋሰሶች	ደረቅ ሁኔታ		- የንጹህ መጠጥ ውሃ እጥረት - ከፍተኛ ሙቀት	- ውሃን በቁጠባ መጠቀም - ውሃን አክሞ ወይም አፍልቶ መጠቀም

**በኢትዮጵያ የሚቴዎሮሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎሮሎጂ ትንበያ፣ ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ
እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ**

