



በኢትዮጵያ የሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎርሎጂ ትንበያ፡
ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ



ከጁላይ 1-31/2025 የነበረው የአየር ጠባይ ግምግማ እንዲሁም

ከኦገስት 1-31/2025 የሚኖረው የአየር ጠባይ ትንበያ እና

ምክረ ሃሳብ

ኦገስት 2025

አዲስ አበባ

1.1 እ.ኤ.አ ከጁላይ 1 እስከ 31/2025 የነበረው የአየር ጠባይ

ባለፈው የጁላይ ወር በምዕራብ፣ ሰሜን ምዕራብ፣ ደቡብ ምዕራብ፣ በሰሜን እና መካከለኛው የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ የተሻለ የደመና ሽፋን እና ክምችት ነበራቸው፡፡ ከዚህ ጋር ተያይዞ በምዕራብ፣ በሰሜን ምዕራብ እና በመካከለኛው የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ ከመካከለኛ እስከ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ተመዝግቧል፡፡ በ 24 ሰዓት ውስጥ ከ30 ሚ.ሜ በላይ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ከተመዘገበባቸው የሚቴዎርሎጂ ጣቢያዎች መካከል አርባ ምንጭ 36.5፣ ባህርዳር 34፣ 62.3፣ 45.4፣ 32.2፣ ደብረ ማርቆስ 32.3፣ ኮምቦልቻ 39.6፣ ቢሾፍቱ 41.4፣ 37.7፣ ጎንደር 35.5፣ 39.7፣ ጎሬ 39.5፣ ጅማ 39.7፣ 51.5፣ መተሃራ 40፣ 35.7፣ ነቀምት 58.1፣ 35.8፣ 40.8፣ አቦምሳ 52.5፣ አቦቦ 37.6፣ አዲስ አበባ 35፣ አዴት 36፣ አይደር 31፣ አዲግራት 60.8፣ አይራ 32፣ 40.2፣ አማን 43.6፣ 65.6፣ 61.3፣ 41.6፣ አምቦ 34.5፣ አንግር ጉትን 30.2፣ 33.2፣ 39.4፣ 30፣ አሶሳ 54.6፣ አርጆ 34፣ 32.6፣ አዋሽ አርባ 78፣ አክሱም 38፣ አየሁ 36፣ አይከል 32.5፣ 31.4፣ 31.3፣ 31.6፣ በደሌ 39.4፣ 60.2፣ በሂ 34.3፣ ብላቴ 32.7፣ ቦሬ 30፣ ቡለን 39፣ 30፣ 34.5፣ ቻግኒ 50.6፣ ጭራ 50.2፣ 47.4፣ ዳንግላ 39.7፣ 31፣ ደብረ ብርሃን 35.5፣ 31.6፣ ደብረ ታቦር 30.4፣ 52.7፣ ደብረ ወርቅ 33.1፣ 34.1፣ ኢጃጂ 30.8፣ 40.2፣ እነዋሪ 36.3፣ ፈኙንዶ 30.6፣ 64.5፣ 38.2፣ ጋምቤላ 38.5፣ 39.2፣ 33.7፣ 30.5፣ 127፣ ወሊሶ 35.9፣ 43.6፣ ገዋኔ 52፣ ጊዳ አያና 38.1፣ 34.1፣ 49.8፣ 38.4፣ ጊምቤ 58.3፣ 31.3፣ 40.5፣ ጉንዶ መስቀል 36፣ 32.8፣ 42፣ 52.3፣ 54.7፣ ሆሳዕና 31፣ ቁለምሳ 45.2፣ ካቺሴ 30.2፣ 33፣ ሊሙገነት 101፣ ማሻ 30.2፣ 40.4፣ 50.2፣ መተማ 37.4፣ ማይጨው 30፣ ማንኩሽ 46.6፣ ሞጣ 31.7፣ 32.1፣ 47.9፣ 39.6፣ ላሊበላ 34.4፣ መሃል ሜዳ 42.3፣ አዳማ 71.3፣ 44.3፣ 84.9፣ ንፋስ መወጫያ 32.8፣ 36.8፣ ኑራ ኤራ 34፣ 60.7፣ ፓዌ 31.5፣ 31፣ 32.1፣ 51.4፣ ሳውላ 34.5፣ ሰኮሩ 64.6፣ 30.6፣ ሰንቃጣ 34.2፣ 32.4፣ ሲሪንቃ 34.5፣ ሽሬ 40፣ ሻምቡ 38.8፣ ሾላ ገቢያ 50.5፣ 30፣ 36.6፣ ጽጺቃ 30.2፣ ተርጫ 45.6፣ ወገልጤና 37.1፣ ወረኢሉ 39.1፣ 42፣ ወላይታ 44.1፣ የትኖራ 47.3፣ 57.7፣ 30.8፣ አባይ ሸለቆ 32.3፣ 39.8፣ 31.2፣ 36.5፣ 36.4፣ 41.2፣ 37.8፣ 45.3፣ አቦሞሪንጋ 45.2፣ 65.2፣ አዲስ አለም 31፣ አዲስ ዘመን 33.2፣ አዲ አርቃይ 90፣ 95፣ 90.1፣ 98፣ 105፣ 80.4፣ 75.8፣ 77.7፣ 80፣ 81.5፣ 75.7፣ 75፣ 70፣ 72.5፣ 71.5፣ 72.8፣ አቃቂ 41፣ አሳሳ 30.5፣ 59፣ አታንጎ 36.5፣ 45.3፣ 48.6፣ አዋሮ መልካ 55.4፣ አዋሽ ሸለቆ 32.3፣ ቢላምቢሎ 63.7፣ ቡልቂ 31.5፣ ቡሬ 30፣ 30፣ ጨፌ ዶንሳ 67.3፣ ደራ 55፣ 40.5፣ 35.5፣ 35.5፣ 60፣ 70፣ 55.5፣ 30፣ 45፣ 32፣ 55.5፣ 40፣ 60.5፣ 45.5፣ 65፣ 75፣ 45.5፣ ደበረ ሲና 59.7፣ ደጋን 38.8፣ ደንገሃ 30.4፣ ፣ ዲንሾ 45.2፣ 41፣ እንዳ በጉና 39፣ ፈስ ቤት 35.9፣ 33.7፣ 38.1፣ 34.6፣ ፊንጫ 57.7፣



በኢትዮጵያ የሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎርሎጂ ትንበያ፡

ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

ጋሽና 37.2፣ 39፣ 106.9፣ 52.5፣ 61፣ 46፣ ጊናገረ 38.9፣ ጉብሬ 49.3፣ ጊሽ ራቢለ 66.7 ጉጉፈቱ 32.4፣ 36.8፣ 35.6፣ ሃይቅ 33.2፣ 40.5፣ ሃሮ 30.2፣ 30.4፣ 40፣ 30.2፣ 32.1፣ 50፣ 32.1፣ 30.2፣ 30፣ 50.1፣ 40.2፣ 30፣ ሀርዶዮ 48.5፣ ሁንቲ 32.5፣ ጅሁር 49.8፣ መንደዲ 64.8፣ 65.5፣ 114.8፣ ሰቆጣ 30.5፣ ከሚሴ 30.5፣ ቅዳሜ ገበያ 56.7 46.8፣ 36.7፣ 48.6፣ 56.8፣ ካራሚሌ 48፣ ኩሚ 80.4፣ 40፣ 33፣ ማርዬ 40.7፣ ማይሃነስ 64.6፣ መከነ እየሱስ 33.7፣ ሞላሌ 31.4፣ 36.3፣ ሙጊ 56.4፣ 32.7፣ ኖፓ 35፣ አሞ ናዳ 40.4፣ 37.6፣ 32.6፣ አንጋ 32፣ ሼንዲ 31.5፣ 53.5፣ 32.5፣ ሸበል በረንታ 35.6፣ ትንሹ ሚጢ 35.9፣ ወቅሮ 36፣ 30፣ ወልበርግ 53፣ ያንፋ 39.7፣ 68፣ 57.5፣ 40.5፣ 59.9፣ ያዮ 41.3፣ 42.7፣ 36.1፣ ይርጋጨፌ 64፣ ዲክሲስ 33.2፣ ስልጋ 39.4፣ መንደር አስራ አንድ 45፣ 82፣ 42፣ 38፣ 33.5፣ ስልጋ 39.4፣ ደዊ 32.1፣ ሃረሲስ 35፣ ስልሳ 32.2፣ ተሩ 45፣ እንዲሁም ተላላቅ 36.2፣ 48.6፣ ሚ.ሜ የሚደርስ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ተመዝግቦባቸዋል።


በአጠቃላይ ባለፈው የጁላይ ወር በ137 የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ በ24 ሰዓት ውስጥ ከ30 ሚ.ሜ በላይ የሆነ ከባድ መጠን ያለው የዝናብ መጠን ነበራቸው (ምስል 1)። በተጨማሪም በአንዳንድ የክረምት ዝናብ ተጠቃሚ በሆኑ የምዕራብና የደቡብ ምዕራብ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ በ24 ሰዓት ውስጥ 50.1-127 ሚ.ሜ የሚደርስ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ተመዝግቧል። ከ65 ሚ.ሜ በላይ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ከተመዘገባቸው የሀገሪቱ አካባቢዎች መካከል ጋምቤላ፣ መንደዳ፣ ጋሽና፣ አዲዓርቃይ፣ አዳማ፣ መንደር አስራ አንድ፣ ኩሚ፣ አዋሽ አርባ፣ ደራ፣ ማይሃነስ፣ ተርኮዲ፣ ያንፋ፣ ጨፌ ዶንሳ፣ ጊሽ ራቢለ፣ አቦ መሪንጋ ይገኙበታል (ምስል 1)።

Ethiopian Meteorology Institute




በኢትዮጵያ የሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎርሎጂ ትንበያ፣

ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ



ምስል:1 ከጁላይ 1-31 በ24 ሰዓት ውስጥ ከ60 ሚ.ሜ በላይ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ የተመዘገበባቸው

ባለፉት የጁላይ ወር የዘነበው የዝናብ መጠን ከሀገሪቱ ቦታ ሽፋን አንፃር ሲገመገም፤ ከአሮሚያ ክልል ቁለም ወለጋ፣ ምዕራብ ወለጋ፣ ምስራቅ ወለጋ፣ ሆሮ ጉድፋ ወለጋ፣ ኢሉባቦር፣ ቡኖ በደሌ፣ ጅማ፣ ሁሉም የሸዋ ዞኖች፣ አርሲ፣ ምዕራብ አርሲ፣ ምስራቅ ባሌ፣ ባሌ፣ ምዕራብና ምስራቅ ሓረርጌ ዞኖች፣ ከአማራ ክልል የሰሜን፣ የመካከለኛው፣ የምዕራብና የደቡብ ጎንደር ዞኖች፣ ሰሜን፣ ምስራቅና ምዕራብ ጎጃም፣ የባህርዳር ዙሪያ፣ የአዊ፣ ዞኖች፣ የሰሜን ሸዋ ዞን፣ ዋግ ህምራ፣ የሰሜን እና የደቡብ ወሎ ዞኖች፣ ከቤንሻንጉል ጉምዝ ካማሺና መተከል ዞኖች፣ ከትግራይ ክልል የምዕራብ፣ የሰሜን ምዕራብ፣ ምስራቅ፣ ደቡብ ምስራቅና ደቡብ ትግራይ ዞኖች፣ ከአፋር ክልል የቀልበቲ፣ ሃሪ እና የጋቢ ዞኖች፣ ከጋምቤላ ክልል አኝዋክ፣ መሻርንግ፣ የኑዌር እና የኢታንግ ልዩ ወረዳ፣ ከደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል ኮንታ፣ ዳዉሮ፣ ከፋ፣ ሸካ፣ ቤንሻ ሸከ ዞኖች፣ ከማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ጉራጌ፣ ምስራቅ ጉራጌ፣ የሀዲያ፣ ስልጤ፣ የከንባታ፣ የሃላባ፣ የም ዞኖች፣ ቀቤና፣ ማረቆ፣ ጠምባሮ ልዩ ወረዳ፣ ከደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ጎፋ፣ ወላይታ፣ ደቡብ አሞ፣ ባስኬቶ ዞኖች፣ አዲስ አበባ ላይ ከ151-900 ሚ.ሜ የሚደርስ ዝናብ ከ13-31 ቀናት ያህል ዝናብ ነበራቸው (ካርታ 1 እና 2) ።



ካርታ 1 እ.ኤ.አ ከጁላይ 1 እስከ 31/2025 ድረስ የነበረው የዝናብ መጠን በሚ.ሜ


በኢትዮጵያ የሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎርሎጂ ትንበያ፡




ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

ባለፈው የጁላይ ወር የዘነበው የዝናብ መጠን ከመደበኛው ጋር ሲነፃፀር ከአሮሚያ ክልል ቁለም ወለጋ፣ ምዕራብ ወለጋ፣ ምስራቅ ወለጋ፣ ሆሮ ጉድሩ ወለጋ፣ ኢሉባቦር፣ ቡኖ በደሌ፣ ጅማ፣ ምስራቅ ባሌ፣ ሁሉም የሸዋ ዞኖች፣ ምስራቅና ምዕራብ ሀረርጌ፣ ከአማራ ክልል ክልል የሰሜን፣ መካከለኛው፣ ምዕራብና ደቡብ ጎንደር ዞኖች፣ ሰሜን፣ ምስራቅና ምዕራብ ጎጃም፣ ባህርዳር ዙሪያ፣ አዊ፣ ዋግ ህምራ፣ ሰሜንና ደቡብ ወሎ፣ የሰሜን ሸዋ ዞኖች፣ ከቤንሻንጉል ጉምዝ ካማሺ፣ መተከል፣ አሶሳ፣ ማኦ ኮሞ ዞኖች፣ ከጋምቤላ ክልል አኝዋክ፣ መሻርንግ፣ የኑዌር እና የኢታንግ ልዩ ወረዳ፣ ከትግራይ ክልል የምዕራብ፣ የሰሜን ምዕራብ፣ መካከለኛው፣ ምምራቅ፣ ደቡብ ምስራቅና ደቡብ ትግራይ ዞኖች፣ ከደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል ኮንታ፣ ዳዉሮ፣ ከፋ፣ ሸካ፣ ቤንች ሸኮ ዞኖች፣ ከደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ጎፋ፣ ጋሞ፣ ወላይታና ባስኬቶ ዞኖች፣ ከማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ጉራጌ፣ ምስራቅ ጉራጌ፣ የሀዲያ፣ ስልጤ፣ የከንባታ፣ የሃላባ፣ የም ዞኖች፣ ቀቤና፣ ማረቆ፣ ጠምባሮ ልዩ ወረዳ፣ አዲስ አበባ፣ ድሬዳዋና ሐረሪ ላይ በአብዛኛው ከመደበኛ ጋር የተቀራረበና በጥቂት ቦታዎች ላይ ከመደበኛ በላይ የሆነ የዝናብ መጠን ተመዝግቧል (ካርታ 3) ፡፡

በሌላ በኩል ኤሊዳር፣ ሰመራ፣ አዋሽ አርባ፣ ገዋኔ፣ አይሻ፣ መተሃራ፣ ዳሊፋጊ፣ ጎዴ፣ ጭፍራ፣ ድሬ ዳዋ፣ ሻዉራ፣ ቀበሪ ዳሀር፣ መተማ፣ መኢሶ፣ ጨፋ፣ ኑራ ኤራ፣ ጋምቤላ፣ አቦቦ፣ ባቲ፣ ሸርቆሌ፣ ፋኙዶ፣ ሻዉራ፣ ማሻ፣ አቦምሳ፣ ማጀቴ፣ ሲሪንቃ፣ ላሬ፣ ኮምቦልቻ፣ እና አካባቢዎች ላይ የቀኑ ከፍተኛ የመቀት መጠን ከ 32.0 እስከ 45.8 ዲግሪ ሴልሺየስ ተመዝግቧል፡፡



ካርታ 2 እ.ኤ.አ ከጁላይ 1 እስከ 31/2025 ድረስ ዝናብ የዘነበባቸው ቀናት




ካርታ 3 እ.ኤ.አ ከጁላይ 1 እስከ 31/2025 የነበረው የዝናብ መጠን ከመደበኛው ጋር ሲነፃፀር

1.2 እ.ኤ.አ ከጁላይ 1 እስከ 31/2025 የነበረው የአየር ጠባይ በግብርና

ሥራ እንቅስቃሴ ላይ ያሳደረው ተፅዕኖ

ባሳለፍነው የጁላይ ወር በአብዛኛው የክረምት ዝናብ ተጠቃሚ አካባቢዎች ከቦታ ቦታ በመጠን ይለያይ እንጂ በስርጭት ረገድ ብዙ ቦታዎችን ያደረሰ የእርጥበት ሁኔታ ነበራቸዋል፡፡ ይህም የተገኘው ዝናብ የአፈርን እርጥበት ከማሻሻልም አልፎ ከጁላይ ጀምሮ ለሚዘሩ የመኸር ሰብሎች ለመዝራትና አስቀድሞው ተዘርተው በተለያዩ የእድገት ደረጃ ላይ ለሚገኙ የመኸር ሰብሎች የውሃ ፍላጎታቸውን ከሚሟላት አንፃር የጎላ ሚና ከመኖሩም በላይ ከኤፕሪል ጀምሮ ቀደም ብለው ለተዘሩ እንደ በቆሎና ማሽላ ለመሳሰሉ የረጅም ጊዜ የመኸር ሰብሎች እንዲሁም ለተለያዩ ቋሚ ተክሎች ለኋላ አትክልቶችና ለፍራፍሬዎች በተሟላ ሁኔታ እንዲያድጉ የጎላ አስተዋፅዖ ነበረው፡፡ ከዚህ በተጨማሪ በአርብቶ አደርና በከፊል የአርብቶ አደር አካባቢዎች የነበረው የእርጥበት ሁኔታ ለግጦሽ ሳርና ለመጠጥ ውሃ አቅርቦት አዎንታዊ አስተዋፅዖ ነበረው፡፡ በሌላ በኩል በአንዳንድ አካባቢዎች በተለይም ምዕራብ፣ በደቡብ ምዕራብ፣ በሰሜን ምስራቅና በመካከለኛው የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ የነበረው ከፍተኛና ተከታታይነት ያለው እርጥበት ለጎርፍ መከሰትና በሰብል ማሳዎች ላይ የውሃ መተኛት ያስከተለ ሲሆን ይህም ሁኔታ እየተከናወነ በሚገኘው የእርሻ ስራ እንቅስቃሴ ላይ በመጠኑም ቢሆን አሉታዊ ጎን ነበረው፡፡ በአንፃሩ በአንዳንድ አካባቢዎች ለመጥቀስም በደቡብ አሪ ወረዳ ከመር ቀበሌ በተከሰተው የመሬት ናዳ በሰው ህይወትና በንብረት ላይ ጉዳት አስከትሏል፡፡ በተጨማሪም በረዶ ቀላቅሎ ከጣለው ከባድ ዝናብ ጋር ተያይዞ በሰሜን ሸዋ በቅንብቢት እና በመሃል ሜዳ በሰብሎች ላይ ጉዳት እንዳደተረሰ መረጃዎች ያመለክታሉ (ካርታ 4)፡፡



ካርታ 4 እ.ኤ.አ ከጁላይ 1 እስከ 31/2025


ድረስ የነበረው የእርጥበት ሁኔታ

በኢትዮጵያ የሚቲዎሮሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቲዎሮሎጂ ትንበያ፡

ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

1.3 እ.ኤ.አ ከጁላይ 1 እስከ 31/2025 የነበረው የአየር ጠባይ በውሃው ዘርፍ ላይ ያሳደረው ተፅዕኖ

ባሳለፍነው ጁላይ ወር በአብዛኛው አባይ፣ አሞ ጊቤ፣ ባሮ አኮቦ፣ ተከሌ፣ አዋሽ፣ ስምጥ ሸለቆ በላይኛው ገናሌ ዳዋ እና ዋቢ ሸበሌ ተፋሰሶች ላይ ከመጠነኛ እስከ ከፍተኛ የሆነ የገጸ ምድር የውኃ ፍሰት ነበራቸው፡፡ በተጨማሪም በላይኛው እና በመካከለኛው አባይ በጣም ከፍተኛ የሆነ የገጸ ምድር የውኃ ፍሰት ነበራቸው፡፡ ይህ ሁኔታ ለገፀ ምድር ውሃ መሻሻል ጥሩ አስተዋፅኦ እንደ ነበረው የተተነተኑ የውሃ የሚቲዎሮሎጂ መረጃዎች ያመላክታሉ፡፡ በሌላ በኩል በወሩ ከነበረው ከፍተኛ የገጸ ምድር የውኃ ፍሰት ጋር ተያይዞ በአሮሚያ፣ በጋምቤላ፣ ደቡብ ኢትዮጵያ፣ እንዲሁም በአዲስ አካባቢ በሸገር ከተሞች የተከሰተው ጎርፍ በመሰረተ ልማት እና በንብረት ላይ መጠኛ ጉዳት ጉዳት አድርጏል (ካርታ 5)።



ካርታ 5 እ.ኤ.አ ከጁላይ 1 እስከ 31/2025

ድረስ የነበረው የአርጥበት ሁኔታ

በኢትዮጵያ የሚቲዎሮሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቲዎሮሎጂ ትንበያ፡




ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

2 መግቢያ

በመደበኛ ሁኔታ የክረምት ዝናብ ቀደም ብሎ በደቡብ ምዕራብ እና በምዕራብ አጋማሽ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ የሚጀምር ሲሆን፤ በሂደትም እየተጠናከሩ ከሚሄዱ ዝናብ ሰጭ የሚቲዎሮሎጂ ገጽታዎች ጋር ተያይዞ በአገልግሎት ወር ውስጥ የክረምት ዝናብ ተጠቃሚ አካባቢዎች ሙሉ በሙሉ ዝናብ ያገኛሉ፡፡ የአገልግሎት ወር ከተቀሩት የክረምት ወራት በተሻለ ሁኔታ ሁሉንም የክረምት ዝናብ ተጠቃሚ አካባቢዎችን አካቶ በመጠንም ሆነ በሥርጭት ከፍተኛ ደረጃ የሚደርስበት ወር ነው፡፡ ስለሆነም የወሩ አማካይ የዝናብ መጠን በምዕራብ አጋማሽ በአብዛኛው የሀገሪቱ ሥፋራዎች ላይ ከ200-400 ሚ.ሜ እና በአንዳንድ ሥፋራዎች ላይ ከ400 ሚ.ሜ በላይ ይደርሳል፡፡ በእነዚህ አካባቢዎች የዝናብ ቀናትም በዚያው መልክ የሚጨምር በመሆኑ ከ18-30 ለሚደርሱት ቀናት ዝናብ ይኖራል፡፡ በሌላ በኩል በምስራቅ፣ በሰሜን ምስራቅ እና በመካከለኛው ኢትዮጵያ አካባቢዎች ላይም ቢሆን የዝናቡ መጠንና ሥርጭት እየተስፋፋ የሚሄድ በመሆኑ ከ6-20 ቀናት ያህል እስከ 300 ሚ.ሜ የሚደርስ ዝናብ በአማካይ ይኖራል፡፡ በመሆኑም የክረምቱ ዝናብ በስርጭትም ሆነ በመጠን በተሻለ ሁኔታ የክረምት ዝናብ ተጠቃሚ አካባቢዎችን ላይ ከፍተኛ ጥንካሬ የሚያሳይበት ጊዜ ነው፡፡ በተለይም በደቡብ ምዕራብ፣ ምዕራብ፣ ሰሜን ምዕራብ እና መካከለኛው የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ ነጎድጓዳማ እና ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ይዘወተራል፡፡

2.2 እ.ኤ.አ ከአገልግሎት 1 እስከ 10/2025 የሚኖረው የአየር ሁኔታ ትንበያ

በአገልግሎት የመጀመሪያው አስር ቀናት ለክረምት ዝናብ መፈጠር ምቹ ሁኔታን የሚፈጥሩ የሚቲዎሮሎጂ ገጽታዎች ይበልጥ እየተስፋፉና እየተጠናከሩ ይሄዳሉ፡፡ ከዚህ ጋር በተያያዘም በደቡብ ምዕራብ፣ ምዕራብ፣ ሰሜን ምዕራብ፣ ሰሜን፣ መካከለኛው፣ ምስራቅ እና ሰሜን ምስራቅ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ የተሻለ የዝናብ መጠንና ሥርጭት እንደሚኖራቸው አሃዛዊ የትንበያ መረጃዎች ይጠቁማሉ (ካርታ 6)፡፡ ስለሆነም እርጥበታማው የአየር ሁኔታ በተለይም በምዕራብ፣ ሰሜን ምዕራብ እና መካከለኛው የሀገራችን አካባቢዎች ላይ በመጠንም ሆነ በሥርጭት እየተስፋፋ ከመሄዱ ጋር ተያይዞ በብዙ ቦታዎቻቸው ላይ ከመካከለኛ እስከ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ይኖራቸዋል፡፡ በተጨማሪም በደቡብ ምዕራብ፣ ሰሜን ምዕራቅ፣ ምዕራቅ እና በደቡብ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን ያለው ዝናብ እንደሚኖራቸው አሃዛዊ የትንበያ መረጃዎች ያመለክታሉ (ካርታ 6 እና 7)፡፡ በሌላ በኩል በመካከለኛው፣ በደቡብ ምዕራብ፣ ምዕራብ እና ሰሜን ምዕራቅ የሀገራችን አካባቢዎች ላይ አልፎ አልፎ ከሚጠናከሩት የአየር ሁኔታ ክስተቶች ላይ በመነሳት ቅጽበታዊ ጎርፍ ሊያስከትል የሚችል ከባድ መጠን ያለው ዝናብ እንደሚኖር የትንበያ መረጃዎች ይጠቁማሉ፡፡




ካርታ 6 እ.ኤ.አ. ከአገልግሎት 1-10, 2025 የሚኖረው የዝናብ መጠን በሚ.ሜ

በኢትዮጵያ የሚቲዎሮሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቲዎሮሎጂ ትንበያ፡



ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

በሚቀጥሉት አስር ቀናቶች ከሚጠናከሩት የሚቲዎሮሎጂ ገጽታዎች ላይ በመነሳት የክረምት ዝናብ ተጠቃሚ በሆኑ የሀገሪቱ አካባቢዎች ብዙ ቦታዎቻቸውን የሚሸፍን ከመካከለኛ እስከ ከባድ (ከ11-30 ሚ.ሜ) መጠን ያለው ዝናብ ያገኛሉ፡፡ በተጨማሪም በውሃ አካላትና በከባቢ አየር ውስጥ ከሚጠናከሩት የሚቲዎሮሎጂ ገጽታዎች ላይ በመነሳት በመካከለኛው፣ ደቡብ ምዕራብ፣ ምዕራብ፣ ሰሜን ምዕራብ፣ ሰሜን ምስራቅ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ በ24 ሰዓት ውስጥ ከ30 ሚ.ሜ በላይ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ እንደሚያገኙ አሃዛዊ የትንበያ መረጃዎች ይጠቁማሉ (ካርታ 7)፡፡



ካርታ 7 እ.ኤ.አ. ከኦገስት 1-10, 2025

የሚኖረው ከፍተኛ የዝናብ መጠን

ሠንጠረዥ 1፡ በሚቀጥሉት አስር ቀናት ዝናብ የሚያገኙ አካባቢዎችና በ24 ሰዓት ውስጥ የሚኖረው የዝናብ መጠን

ክልል	ዞን	በ 24 ሰዓት ውስጥ የሚኖረው የዝናብ መጠን
አሮሚያ	የቁለም ወሊጋ፣ ምዕራብ ወሊጋ፣ ምስራቅ ወሊጋ፣ ሆሮ ጉድሩ ወሊጋ፣ ኢሉባቦር፣ ቡኖ በደሌ፣ ጅማ፣ የሰሜን፣ ምዕራብ እና ደቡብ ምዕራብ ሸዋ ዞኖች፣	ከመካከለኛ እስከ ከባድ መጠን (ከ11 እስከ 30 ሚ.ሜ)
	የምስራቅ ሸዋ፣ ምዕራብ አርሲ፣ አርሲ፣ ምዕራብ ሐረርጌ፣ ምስራቅ ሐረርጌ፣ ባሌ፣ ምስራቅ ባሌ፣ ምዕራብ ጉጂ፣ ጉጂ እና ቦረና ዞኖች	ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን (ከ1-29 ሚ.ሜ)
አማራ	የሰሜን፣ ምዕራብ፣ መካከለኛው እና ደቡብ ጎንደር፣ የባህርዳር ዙሪያ፣ የአዊ፣ የሰሜን፣ ምዕራብ እና ምስራቅ ጎጃም እና የሰሜን ሸዋ ዞኖች	ከባድ መጠን (ከ30 ሚ.ሜ በላይ)
	የዋግ ህምራ፣ ሰሜን እና ደቡብ ወሎ ዞኖች	ከቀላል እስከ መካከለኛ ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን (ከ1-29 ሚ.ሜ)
ትግራይ	የምዕራብ፣ የሰሜን ምዕራብ፣ የመካከለኛው፣ የደቡብ ምስራቅ እና የደቡብ ትግራይ ዞኖች	ከመካከለኛ እስከ ከባድ መጠን (ከ11 እስከ 30 ሚ.ሜ)

በኢትዮጵያ የሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎርሎጂ ትንበያ፡




ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

ቤንሻንጉል ጉምዝ	የካማሺ፣ መተከል፣ አሶሳ፣ ማኦ ኮሞ ዞኖች	ከመካከለኛ እስከ ከባድ መጠን (ከ11 እስከ 30 ሚ.ሜ)
ጋምቤላ	የአኝዋክ፣ መሻጉንግ፣ የኑዌር እና የኢታንግ ልዩ ወረዳ	ከመካከለኛ እስከ ከባድ መጠን (ከ11 እስከ 30 ሚ.ሜ በላይ)
ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ	የከፋ፣ ኮንታ፣ ዳውሮ፣ ቤንሻ ሸኮ፣ ሸካ እና ምዕራብ ኦሞ	ከመካከለኛ እስከ ከባድ መጠን (ከ11 እስከ 30 ሚ.ሜ)
ማዕከላዊ ኢትዮጵያ	ጉራጌ፣ ምስራቅ ጉራጌ፣ ስልጤ፣ ሀዲያ፣ ከምባታ፣ ሀላባ፣ የም፣ ጠምባሮ ልዩ ወረዳ፣ ቀቤና ልዩ ወረዳ፣ ማረቆ ልዩ ወረዳ	ከመካከለኛ እስከ ከባድ መጠን (ከ11 እስከ 30 ሚ.ሜ)
ሲዳማ ክልል	ሁሉም የክልሉ ዞኖች	ከመካከለኛ እስከ ከባድ መጠን (ከ11 እስከ 30 ሚ.ሜ)
አዲስ አበባ፣ ድሬዳዋ እና ሐረሪ		ከመካከለኛ እስከ ከባድ መጠን (ከ11 እስከ 30 ሚ.ሜ)
አፋር	የማሂ፣ ሀሪ፣ ቀልበቲ፣ ፈንቲ፣ አውሲ እና ጋቢ ዞኖች	ከመካከለኛ እስከ ከባድ መጠን (ከ11 እስከ 30 ሚ.ሜ)
ደቡብ ኢትዮጵያ	የወላይታ፣ ጎፋ እና ባስኬቶ	ከመካከለኛ እስከ ከባድ መጠን (ከ11 እስከ 30 ሚ.ሜ)
	ጋሞ፣ ጌድዮ፣ አሪ፣ ኮንሶ፣ ቡርጂ፣ አሌ፣ ጋርዱላ፣ ኮሬ እና ደቡብ ኦሞ ዞኖች	ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን (ከ1 እስከ 29 ሚ.ሜ)
ሶማሌ	ሲቲ እና ፋፈን ዞኖች	ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን (ከ1 እስከ 29 ሚ.ሜ)
	የኤረር፣ ጃረር፣ ነጎብ፣ ቆራሂ እና ዳዋ፣ ዞኖች	ቀላል መጠን (ከ1-10 ሚ.ሜ)

2.4 የሚኖረው የቀን ከፍተኛ የሙቀት ሁኔታ

በኦገስት የመጀመሪያው አስር ቀናት ከሚኖረው የቀን ከፍተኛ የፀሐይ ሀይል ጋር በተያያዘ የቀን ከፍተኛ ሙቀት በኤሊዳር፣ ዱብቲ፣ ሰመራ፣ ቡሬ፣ አሳይታ፣ ሁንዱፎ፣ ገዋኔ፣ ሚሌ፣ ዳሊፋጊ፣ አይሻ፣ ጉሊና፣ አዋሽ አርባ፣ ባቲ፣ ዶሎ አዶ፣ ዳዋ፣ ጎዴ፣ አቦቦ፣ ቋራ፣ አዋሽ ፈንታሌ፣ ጭፍራ፣ ላሬ፣ መተሃራ እና ፉኙዶ አካባቢዎች ላይ ከ30.2 እስከ 38 ዲግሪ ሴልሺየስ እንደሚሆን አሃዛዊ ትንበያዎች ያመለክታሉ (ካርታ 8)፡፡



2.5 እ.ኤ.አ ከኦገስት 11 እስከ 20/2025 የሚኖረው የአየር ሁኔታ

በመደበኛ ሁኔታ በኦገስት ሁለተኛው አስር ቀናት ዝናብ ሰጭ የሚቴዎርሎጂ ገጽታዎች በበለጠ ሁኔታ እየተጠናከሩ የሚሄዱበት ጊዜ ነው፡፡ በተጨማሪም አልፎ አልፎ ባሉት ቀናት ከሚጠናከሩ የደመና ክምችቶች በአንዳንድ ቦታዎች ላይ በረዶ የቀላቀለ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ለወንዞች ሙላትና ለቅጽበታዊ ጎርፍ መከሰት አስተዋጽኦ ያደርጋሉ፡፡

በመጨረሻም የኦገስት ሁለተኛው አሥር ቀናት ዝናብ ሰጭ የሚቴዎርሎጂ ገጽታዎች የክረምት ዝናብ ተጠቃሚ በሆኑት የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ የተሻለ የዝናብ መጠንና ሥርጭት እንደሚኖራቸው የትንበያ መረጃዎች ይጠቁማሉ፡፡ ከዚህ ጋር በተያያዘም በምዕራብ፣ ሰሜን ምዕራብ፣ ሰሜን፣ እና መካከለኛው የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ በ24 ሰዓት ውስጥ ከ30 ሚ.ሜ በላይ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ እንደሚኖር የአሃዛዊ የትንበያ መረጃዎች ይጠቁማሉ፡፡ በተጨማሪም በሰሜን ምዕራቅ እና ምዕራቅ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን ያለው ዝናብ ያገኛሉ፡፡

2.6 እ.ኤ.አ ከኦገስት 1 እስከ 31/2025 የሚኖረው የአየር ጠባይ ትንበያ

በመደበኛ ሁኔታ የኦገስት ወር ካለፉት የክረምት ወራት በተሻላ ሁኔታ ሁሉንም የክረምት ዝናብ ተጠቃሚ አካባቢዎችን በመጠንም ሆነ በሥርጭት በከፍተኛ መጠን የሚያደርስበት ወር ነው። ከዚህም ጋር ተያይዞ በአንዳንድ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ ለተከታታይ ሰዓትና ቀናት የሚዘንብበትና በተጨማሪም በፀሐይ ሀይል ታግዘው ከሚፈጠሩ የደመና ክምችቶች በረዶ የቀላቀለ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ የሚስተዋልበት ሲሆን፤ ከዚህ ጋር ተያይዞ ለወንዞች ሙላትና ቅጽበታዊ ጎርፍ የሚከሰትበት ወር ነው።


በመጨረሻ የኦገስት ወር ዝናብ ሰጪ የሚቲዎሮሎጂ ገጽታዎች እየተጠናከሩ ሊሄዱ እንደሚችሉ አሃዛዊ የትንበያ መረጃዎች ይጠቁማሉ። ከሚጠናከሩት ዝናብ ሰጭ የሚቲዎሮሎጂ ገጽታዎች ጋር ተያይዞ በተለይም በሰሜን ምስራቅ፣ በሰሜን፣ በመካከለኛው፣ በደቡብ ምዕራብና በምዕራብ የሀገሪቱ ቦታዎች ላይ ከመካከለኛ እስከ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ያገኛሉ። በተጨማሪም በአንዳንድ ቦታዎች ላይ በፀሐይ ሀይል ታግዘው ከሚፈጠሩ የደመና ክምችቶች በመነሳት በረዶ የቀላቀለ እና ቅጽበታዊ ጎርፍ ሊያስከትል የሚችል ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ሊኖር እንደሚችል የትንበያ መረጃዎች ይጠቁማሉ።

በአጠቃላይ በሚቀጥለው ወር ከኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ወለጋ፣ ምስራቅ ወለጋ፣ ሆሮ ጉድሩ ወለጋ፣ ቁለም ወለጋ፣ ኢሉባቦር፣ ቡኖ በደሌ፣ ጅማ፣ ሰሜን ሸዋ (ሰላሌ)፣ ሁሉም የሸዋ ዞኖች፣ ከአማራ ክልል የሰሜን፣ ምዕራብ፣ መካከለኛው እና ደቡብ ጎንደር፣ የባህርዳር ዙሪያ፣ የአዊ፣ የሰሜን፣ ምዕራብ እና ምስራቅ ጎጃም፣ ዋግ ህምራ፣ የሰሜን እና ደቡብ ወሎ፣ የሰሜን ሸዋ ዞኖች፣ የኦሮሞ ብሄረሰብ ልዩ ዞን፣ ከትግራይ ክልል ምዕራብ፣ ሰሜን ምዕራብ፣ ከቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል መተከል፣ ፓዌ፣ አሶሳ፣ ካማሺ ዞኖች እና ማኦ ኮሞ ልዩ ወረዳ፣ ከጋምቤላ ክልል ንዌር፣ አኝዋክ፣ ማዣንግ እና የኢታንግ ልዩ ዞን፣ የሲዳማ ክልል ዞኖች፣ ከማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ጉራጌ፣ ምስራቅ ጉራጌ፣ ስልጤ፣ ሀዲያ፣ ከምባታ፣ ሀላባ፣ የም፣ ጠምባሮ ልዩ ወረዳ፣ ቀቤና ልዩ ወረዳ፣ ማረቆ ልዩ ወረዳ፣ ከደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል ከፋ፣ ኮንታ፣ ዳውሮ፣ ቤንች ሸኮ፣ ሸካ ዞኖች፣ አዲስ አበባ፣ ድሬዳዋ እና ሐረሪ ላይ ከመካከለኛ እስከ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ያገኛሉ። በተጨማሪም ከዕለት ወደ ዕለት ከሚጠናከሩት የአየር ሁኔታ ገጽታዎች ላይ በመነሳት፣ ከኦሮሚያ ክልል ምስራቅና ምዕራብ ሀረርጌ፣ አርሲ እና ምዕራብ አርሲ፣ ባሌ እና ምስራቅ ባሌ፣ ጉጂ እና ምዕራብ ጉጂ፣ ምስራቅ ቦረና ዞኖች፣ ከሱማሌ ክልል ሲቲ፣ ፋፋን፣ ጀራር፣ ኤረር፣ ኖጎብ፣ ሊቦን እና ዳዋ ዞኖች፣ ከአፋር ክልል ቅልበቲ፣ ፈንቲ፣ አውሲ፣ ጋቢ፣ ማሂ እና ሀሪ ዞኖች፣ ከደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ወላይታ፣ ጋሞ፣

በኢትዮጵያ የሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎርሎጂ ትንበያ፡

ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

ጎፋ፣ ባስኬቶ፣ ጌድዮ፣ አሪ፣ ኮንሶ፣ ቡርጂ፣ አሌ፣ ጋርዱላ፣ ኮሬ እና ደቡብ አሞ ዞኖች ላይ ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን ያለው ዝናብ ያገኛል፡ (ካርታ 9)፡፡



ካርታ 9 እ.ኤ.አ ከኦገስት-1-31/ 2025 የሚኖረው የዝናብ መጠን

Ethiopian Meteorology Institute



2.7 እ.ኤ.አ ከኦገስት 1 እስከ 31/2025 የሚኖረው የአየር ጠባይ

በግብርናው ሥራ እንቅስቃሴ ላይ ሊያሳድር የሚችለው ተፅዕኖ

በሚቀጥለው ወር ሰሜን ምስራቅ፣ ሰሜን፣ መካከለኛው፣ ደቡብ ምዕራብና ምዕራብ የሃገሪቱ ቦታዎች ላይ ከመካከለኛ እስከ ከባድ መጠን ያለው እርጥበት ይኖራቸዋል፡፡ ይህም የሚኖረው እርጥበት በተለያየ የእድገት ደረጃ ላይ ለሚገኙ ሰብሎች፣ ለቋሚ ተክሎች፣ ለጓሮ አትክልቶችና ፍራፍሬዎች የወሃ ፍላጎትን ለማሟላት እና በአሁኑ ጊዜ እርጥበት በማግኘት ላይ ለሚገኙት አርብቶ አደርና ከፊል አርብቶ አደር አካባቢዎች የግጦሽ ሳርና የመጠጥ ወሃ አቅርቦት ከማሻሻል አንፃር ከፍተኛ ጠቀሜታ ይኖረዋል፡፡

በሌላም በኩል በአንዳንድ ቦታዎች ከሚኖረው ተደጋጋሚ የሆነ የእርጥበት መብዛት ጋር ተያይዞ በረባዳማ አካባቢዎች የውሃ በሰብል ላይ መተኛት፣ የመሬት አቀማመጡ ከፍታ ባላቸውና ተዳፋታማ በሆኑ አካባቢዎች ደግሞ የመሬት መንሸራተትና በጎርፍ የመጠቃት እንዲሁም እርጥበት በሚበዛባቸው አካባቢዎች የሰብል በሽታ እና የአረም መስፋፋት ሊከሰት ይችላል፡፡ በመሆኑም አርሶ አደሮች እና ከፊል አርብቶ አደሮች እንዲሁም የሚመለከታቸው አካላት ሰብሎች በጎርፍ እንዳይጠቁ እና በማሳ ላይ ውሃ እንዳይተኛ የጎርፍ መቀልበሻዎችንና ከማሳ ውስጥ ውሃን ማንጣፈፊያ ቦቶችን ማዘጋጀት እንዲሁም የፀረ-አረም እና የፀረ-ተባይ ኬሚካሎችን በወቅቱና የአየር ሁኔታ ምቹነትን ባገናዘበ ሁኔታ ጥቅም ላይ ማዋል ያስፈልጋል፡፡

2.8 እ.ኤ.አ ከኦገስት 1 እስከ 31/2025 የሚኖረው የአየር ጠባይ በውሃ

ዘርፍ ላይ ሊያሳድር የሚችለው ተፅዕኖ

በቀጣይ የኦገስት ወር በአብዛኛው አባይ፣ ተከሌ፣ ባሮ አኮቦ፣ አዋሽ፣ ኦሞ ጊቤ፣ አፋር ደናክል፣ መራብ ጋሽ፣ የላይኛው እና መካከለኛው ስምጥ ሸለቆ፣ የላይኛው ዋቢ ሸበሌ እና በጥቂት የላይኛው ገናሌ ዳዋ ተፋሰሶች ላይ ከመካከለኛ እስከ እጅግ በጣም ከፍተኛ የሆነ የገፀ ምድር የውሃ ፍሰት ይኖራቸዋል፡፡ በመሆኑም አልፎ አልፎ ከሚኖር ከባድ እና ተደጋጋሚ የዝናብ ሁኔታ ጋር ተያይዞ በተለይም ለጎርፍ ተጋላጭ በሆኑ ተፋሰሶች እና ለጎረፍ መፈጠር አመቺ በሆኑ በአዲስ አበባ፣ ሀረር፣ ድሬ ዳዋ እና የኦሞራቴ ከተሞች ላይ ቅፅበታዊ ጎርፍ እና የወንዞች ሙላት የማስከተል አቅም ሊኖረው ይችላል፡፡ ስለዚህ ለጎርፍ ተጋላጭ በሆኑ ወንዝ ዳርቻዎች፣ በረግረጋማ እንዲሁም ረባዳማ እና ተዳፋት አካባቢ በሚኖሩ ማህበረሰቦች በንብረት እንዲሁም በህይወት ላይ ጉዳት እንዳያስከትል ቅድመ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል፡፡