



ከኦገስት 1-10/2025 የነበረው የአየር ሁኔታ ግምገማ

እንዲሁም

ከኦገስት 11-20 እና ከኦገስት 21-31/2025

የሚኖረው የአየር ሁኔታ ትንበያ እና ምክረ ሃሳብ

ኦገስት 2025

አዲስ አበባ

1. እ.ኤ.አ ከኦገስት 1 እስከ 10/2025 የነበረው የአየር ሁኔታ


ባለፉት አስር ቀናት በምዕራብ፣ ሰሜን ምዕራብ፣ መካከለኛው፣ ሰሜን ምስራቅ እና ደቡብ ምዕራብ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ የተሻለ የደመና ሽፋን እና ክምችት ነበራቸው፡፡ ከዚህ ጋር ተያይዞ በምዕራብ፣ ሰሜን ምዕራብ፣ ሰሜን እና መካከለኛው የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ ከመካከለኛ እስከ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ተመዝግቧል፡፡ በ24 ሰዓት ውስጥ ከ30 ሚ.ሜ በላይ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ከተመዘገበባቸው የሚቴዎርሎጂ ጣቢያዎች መካከል አዲስ አበባ 06.32.2፣ አርባምንጭ 40.3፣ በህር ዳር 42.3፣ 38.1፣ ኮምቦልቻ 66፣ ቢሾፍቱ 38፣ 31፣ ድሬዳዋ 40.4፣ ጎንደር 30.3፣ ጎሬ 39.7፣ ጅማ 55.2፣ መቀሌ 50.4፣ 51፣ መተሃራ 32.9፣ ነቀምት 167.6፣ 52.8፣ 33.4፣ አዲስ አበባ ጥቁር አንበሳ 46.5፣ አዴት 41.5፣ አዲግራት 40.5፣ አይደር 38.3፣ አይራ 37.6፣ ሃሮማያ 40.4፣ አልጌ 30፣ አማን 31.2፣ 65.8፣ አምቦ 35.9፣ አምደወርቅ 37.8፣ 39፣ 38.9፣ 32.5፣ አይከል 36.1፣ ባቲ 30፣ ቡሂ 38.2፣ ቡለን 30፣ 40.2፣ ቻግኒ 33.2፣ 50፣ ጨዋቃ 30፣ ደባርቅ 51.5፣ ደብረ ብርሃን 32.7፣ 37.5፣ 32.8፣ ደብረ ወርቅ 30.7፣ ፍቼ 44.9፣ 34.4፣ ጋምቤላ 40.3፣ 44.7፣ 39፣ ጊዳ አያና 40.9፣ ጉንዶ መስቀል 32.7፣ 45፣ 30.2፣ 36.6፣ 48.6፣ ካቺሴ 105.2፣ ላሊበላ 39.2፣ ሊሙገነት 44.7፣ ማይጨው 33.5፣ ማጀቱ 36.1፣ ማንኩሽ 49፣ 59፣ ማሻ 70.4፣ 30.4፣ መሃል ሜዳ 58.2፣ 54.6፣ መኢሶ 47.5፣ መተማ 31.9፣ አዳማ 43.6፣ 59.4፣ ነራ ኤራ 32.6፣ ሰኮሩ 38፣ ሻሁራ 44.8፣ 33.3፣ ሽሬ 35.5፣ ተርጫ 37.8፣ ወገል ጤና 33.5፣ ወረኢሉ 44.9፣ 32.1፣ 39.7፣ አዲስ አለም 31.5፣ 32.5፣ አዲስ ዘመን 34.3፣ 42.2፣ 40፣ አዲ አርቃይ 40፣ 31፣ 32.5፣ አሸ 32.6፣ 32.8፣ አሳሳ 46.5፣ አታንጎ 57፣ አዋሽ ሸለቆ 41.3፣ 46.3፣ 30.1፣ 32.3፣ ቢላምቢሎ 37.7፣ ጫጫ 32.6፣ 53.6፣ ጨፌ ዶንሳ 48.4፣ 50.3፣ 52፣ 30.3፣ ምንደር ሰባት 31.3፣ ደበሌ 33.1፣ ደብረ ሲና 39.1፣ 50.4፣ 74.4፣ 31.7፣ ደጋን 32፣ ደነባ 54.1፣ ደንጎለታ 46.4፣ 46.4፣ ደራ 45፣ እብናት 30፣ 30.6፣ እርምጭ 46፣ ፈረስ ቤት 31.2፣ ጋሸና 55.4፣ 34.2፣ 51.1፣ 34.2፣ 34.8፣ ጊናገር 35.7፣ 38.9፣ ጊሽ ራቢል 34.4፣ ሃሪ 30.2፣ 40.5፣ ሂርና 50.2፣ 59.4፣ ሆርዶዮ 70.2፣ 32.1፣ 31፣ ጅሁር 37.5፣ ካራሚሌ 51.4፣ 30.8፣ 91.8፣ ቀርሳ 34.8፣ 75.1፣ ቁሉቢ 32.5፣ 37.6፣ 47.5፣ 34.5፣ ኩሚ 64.5፣ 110፣ ሊበን 47.4፣ መካነ ኢየሱስ 38.3፣ 41.8፣ መልካ ጀበዱ 38.8፣ 37.4፣ መንዲዳ 34.2፣ መርሳ 32.8፣ 54.2፣ ሞላሊ 34.3፣ 41.9፣ ሙጊ 57፣ ሙጃ 30.3፣ ሮቢት 33.1፣ 32.5፣ 39.5፣ ሰቆጣ 35.6፣ ተርኮዲ 33.2፣ 33.7፣ ያንፋ 35.3፣ ይችላ 49.8፣ ምንደር አስራ አንድ 60፣ 39.5፣ 36.5፣ የሪ 125፣ 30፣ ወልዲያ 32.1፣ ኢዳግ አርቢ 30.4፣ 40.2፣ 45.3፣ ጎቢይር 38.9፣ 30.5፣ 36.4፣ 43.5፣

በኢትዮጵያ የሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎርሎጂ ትንበያ፡

ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

43.5፣ 48.3፣ 40.2፣ አዋሽ ሰባት 32.2 እንዲሁም አንኮበር 40፣ 41፣ 31.1፣ 70 ሚ.ሜ የሚደርስ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ተመዝግቦባቸዋል።

በአጠቃላይ ባለፉት አስር ቀናት በ108 በሚደርሱ የሀገራችን አካባቢዎች ላይ በ24 ሰዓት ውስጥ ከ30 ሚ.ሜ በላይ የሆነ ከባድ መጠን ያለው የዝናብ መጠን ነበራቸው (ምስል 1)። በተጨማሪም በአንዳንድ የክረምት ዝናብ ተጠቃሚ በሆኑ የምዕራብና የደቡብ ምዕራብ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ በ24 ሰዓት ውስጥ 60.0-167.6 ሚ.ሜ የሚደርስ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ተመዝግቧል። ከ60 ሚ.ሜ በላይ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ከተመዘገበባቸው የሀገሪቱ አካባቢዎች መካከል ነቀምት፣ የሪ፣ ኪሚ፣ ካቺሴ፣ ካራሚሌ፣ ቀርሳ፣ ጨለንቆ፣ ደብረ ሲና፣ መሻ፣ ሆርዶዮ፣ አንኮበር፣ ኮምቦልቻ፣ አማን፣ መንደር አስራ አንድ ይገኙበታል (ምስል 1)።



ምስል:1 ከአገሪት 1-10 በ24 ሰዓት ውስጥ ከ50 ሚ.ሜ በላይ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ የተመዘገበባቸው


በኢትዮጵያ የሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎርሎጂ ትንበያ፡




ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

ባለፉት አስር ቀናት የዘነበዉ የዝናብ መጠን ከሀገሪቱ ቦታ ሽፋን አንፃር ሲገመገም፤ ከአሮሚያ ክልል የቁለም ወሊጋ፣ ምዕራብ ወሊጋ፣ ምስራቅ ወሊጋ፣ ሆሮ ጉድፋ ወሊጋ፣ ኢሉባቦር፣ ቡኖ በደሌ፣ ጅማ፣ ሰሜን፣ ምዕራብ፣ መካከለኛና የደቡብ ምዕራብ ሸዋ ዞኖች፣ ከአማራ ክልል የሰሜን፣ መካከለኛዉ፣ ምዕራብና ደቡብ ጎንደር ዞኖች፣ ሰሜን፣ ምስራቅና ምዕራብ ጎጃም፣ የባህርዳር ዙሪያ፣ የአዊ፣ የደቡብ ወሎ እና የሰሜን ሸዋ ዞኖች፣ ከቤንሻንጉል ጉምዝ ካማሺ፣ መተከል፣ አሶሳ፣ ዞኖች፣ ከትግራይ ክልል የምዕራብ፣ የሰሜን ምዕራብ እና ምስራቅ ትግራይ ዞኖች፣ ከአፋር ክልል የቀልበቲ፣ ሃሪ እና የጋቢ ዞኖች፣ ከደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል ኮንታ፣ ዳዉሮ፣ ከፋ፣ ሸካ፣ ቤንች ሸኮ ዞኖች ላይ ከ61-340 ሚ.ሜ የሚደርስ ዝናብ ከ5-10 ቀናት ያህል ዝናብ ነበራቸዉ (ካርታ 1 እና 2)፡

: በተጨማሪም የምዕራብ አርሲ፣ አርሲ፣ ምስራቅ ባሌ፣ ባሌ፣ የምስራቅ ሸዋ፣ ምዕራብ ሀረርጌ ዞኖች፣ የዋግ ህምራ፣ የሰሜን ወሎ፣ ማኦ ኮሞ፣ ከጋምቤላ ክልል አኝዋክ፣ መሻርንግ፣ የኑዌር እና የኢታንግ ልዩ ወረዳ፣ የመካከለኛዉ፣ የደቡብ ምስራቅና የደቡብ ትግራይ ዞኖች፣ ከማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ጉራጌ፣ ምስራቅ ጉራጌ፣ የሀዲያ፣ ስልጤ፣ የከንባታ፣ የሃላባ፣ የም ዞኖች፣ ቀቤና፣ ማረቆ፣ ጠምባሮ ልዩ ወረዳ፣ ከደቡብ ኢትዮጵያ ክልል የጎፋና ባስኬቶ ዞኖች፣ ከአፋር ፋንቲ፣ አዉሲ፣ እና ማሂ ዞኖች፣ ከሱማሌ ክልል የሲቲ፣ ጥቂት የኤረር፣ ነጎብ፣ አፍዴር፣ እና የሊበን ዞኖች፣አዲስ አበባ፣ ድሬዳዋ እና ሐረሪ ላይ ከ11-100 ሚ.ሜ የሚደርስ ዝናብ ከ2-8 ቀናት ያህል ዝናብ ነበራቸዉ (ካርታ 1 እና 2) ፡፡



ካርታ 1 እ.ኤ.አ ከኦገስት 1 እስከ 10/2025 ድረስ የነበረው የዝናብ መጠን በሚ.ሜ




ካርታ 2 እ.ኤ.አ ከኦገስት 1 እስከ 10/2025 ድረስ ዝናብ የዘነበባቸዉ ቀናት



በኢትዮጵያ የሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎርሎጂ ትንበያ፡

ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

ባለፉት አስር ቀናት የዘነበዉ የዝናብ መጠን ከመደበኛዉ ጋር ሲነፃፀር ከአሮሚያ ክልል የቁለም ወለጋ፣ ምዕራብ ወለጋ፣ ምስራቅ ወለጋ፣ ሆሮ ጉድሩ ወለጋ፣ ኢሉባቦር፣ ቡኖ በደሌ፣ ጅማ፣ ምስራቅ ባሌ፣ ሁሉም የሸዋ ዞኖች፣ ምስራቅና ምዕራብ ሓረርጌ፣ ከአማራ ክልል ክልል የሰሜን፣ መካከለኛዉ፣ ምዕራብና ደቡብ ጎንደር ዞኖች፣ ሰሜን፣ ምስራቅና ምዕራብ ጎጃም፣ ባህርዳር ዙሪያ፣ አዊ፣ ዋግ ህምራ፣ ሰሜንና ደቡብ ወሎ፣ የሰሜን ሸዋ ዞኖች፣ ከቤንሻንጉል ጉምዝ ካማሺ፣ መተከል፣ አሶሳ፣ ማኦ ኮሞ ዞኖች፣ ከጋምቤላ ክልል አኝዋክ፣ መሻርንግ፣ የኑዌር እና የኢታንግ ልዩ ወረዳ፣ ከትግራይ ክልል የምዕራብ፣ የሰሜን ምዕራብ፣ መካከለኛዉ፣ ምምራቅ፣ ደቡብ ምስራቅና ደቡብ ትግራይ ዞኖች፣ ከደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል ኮንታ፣ ዳዉሮ፣ ከፋ፣ ሸካ፣ ቤንች ሸኮ ዞኖች፣ ከማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ጉራጌ፣ ምስራቅ ጉራጌ፣ የሀዲያ፣ ስልጤ፣ የከንባታ፣ የሃላባ፣ የም ዞኖች፣ ቀቤና፣ ማረቆ፣ ጠምባሮ ልዩ ወረዳ፣ ከሱማሌ ክልል የሲቲ፣ ኤረር እና ፋፈን ዞኖች፣ አዲስ አበባ፣ ድሬዳዋና ሐረሪ ላይ መደበኛና ከመደበኛው በላይ የሆነ የዝናብ



ካርታ 3 እ.ኤ.አ ከኦገስት 1 እስከ 10/2025 የነበረዉ የዝናብ መጠን ከመደበኛዉ ጋር ሲነፃፀር


በሌላ በኩል ኤሊዳር፣ ሰመራ፣ አይሻ፣ አዋሽ አርባ፣ ገዋኔ፣ ድሬ ዳዋ፣ ጎዴ፣ ቀበሪ ዳሀር፣ መተሃራ፣ አቦቦ፣ ዳሊፋጊ፣ መተማ፣ ጋምቤላ፣ ፉኙዶ፣ ጨፋ፣ ኑራ ኤራ፣ ሸርቆሌ፣ ጭፍራ፣ ላሬ፣ ባቲ፣ መኢሶ እና ቴፒ አካባቢዎች ላይ የቀኑ ከፍተኛ የመቀት መጠን ከ 31 እስከ 45.8 ዲግሪ ሴልሽየስ ተመዝግቧል፡፡

1.2 እ.ኤ.አ ከኦገስት 1 እስከ 10/2025 የነበረው የአየር ሁኔታ

በግብርና ሥራ እንቅስቃሴ ላይ ያሳደረው ተፅዕኖ

ባለፉት አስር ቀናት በአብዛኛው የክረምት ዝናብ ተጠቃሚ በሆኑት የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ የነበረው የተስፋፋ እርጥበት እንደ ማሽላና በቆሎ ለመሳሰሉት የረጅም ጊዜ ሰብሎች፣ እንደ ሰንዴ፣ ገብስ፣ አጃ እና ጤፍ ለመሳሰሉት የብርዕ ሰብሎች፣ የጥራጥሬና የቅባት እህሎች እና ለቋሚ ተክሎች የውሃ ፍላጎት መሟላት ምቹ ሁኔታን ከመፍጠሩም በላይ በምስራቅና በሰሜን ምስራቅ ለሚገኙት አርብቶ አደሮችና ከፊል አርብቶ አደሮች የመጠጥ ውሃ እና የግጦሽ ሳር አቅርቦትን ከማሻሻል አንጻር አዎንታዊ ሚና ነበረው፡፡

በአንፃሩ በአንዳንድ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ ከነበረው ከባድና ተከታታይነት ካለው እርጥበት ጋር ተያይዞ የጎርፍ፣ የመሬት መንሸራተትና በሰብሎች ላይ የውሃ መተኛትና መጥለቅለቅ ሁኔታዎች ተከስተዋል፡፡ በተለይም ባሳለፍናቸው አስር ቀናት በምሁር አክሊል ወረዳ መገራን ቀበሌ ላይ የተስተዋለ የጎርፍ እና የመሬት ናዳ በንብረትና በሰብል ላይ ጉዳት አድርጓል፤ በተጨማሪም በጋምቤላ ክልል በተከሰተው የጎርፍ አደጋ በተዘሩ ሰብሎችና በንብረት ላይ ጉዳት አድርጓል፡፡ እንዲሁም በአማራ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን ኤፍራታና ግድም ወረዳ ከባድ ነፋስ ቀላቅሎ የጣለው ዝናብ ባስከተለው ጎርፍና በተከሰተው የመሬት መንሸራተት በሰዎች ጤንነት፣ ሕይወትና ንብረት ላይ ጉዳት እንደደረሰ ከተለያዩ የመስክ መረጃዎች ለማወቅ ተችሏል (ካርታ 4) ፡፡




ካርታ 4 እ.ኤ.አ ከኦገስት 1 እስከ 10/2025

ድረስ የነበረው የእርጥበት ሁኔታ

1.3 እ.ኤ.አ ከኦገስት 1 እስከ 10/2025 የነበረው የአየር ሁኔታ በውሃው ዘርፍ ላይ ያሳደረው ተፅዕኖ

ባሳለፍነው አገራት የመጀመርያ አስር ቀን በአብዛኛው አባይ፣ ኦሞ ጊቤ፣ ተከሌ፣ ባሮ አኮቦ፣ መረብ ጋሽ፣ አፋር ደናክል፣ አዋሽ፣ ስምጥ ሸለቆ፣ አይሻ፣ በላይኛው እና በጥቂት ታችኛው ዋቢ ሸበሌ እና ገናሌ ዳዋ ተፋሰሶች ላይ ከመጠነኛ እስከ ከፍተኛ የሆነ የገጸ ምድር የውሃ ፍሰት ነበራቸው። በተጨማሪም በላይኛው እና በመካከለኛው አባይ እና በመካከለኛው ኦሞ ጊቤ፣ በላይኛው ተከሌ፣ አዋሽ እና ባሮ አኮቦ እጅግ በጣም ከፍተኛ የሆነ የገጸ ምድር የውሃ ፍሰት ነበራቸው። ይህ ሁኔታ ለገፀ ምድር ውሃ ሀብት አዎንታዊ አስተዋፅኦ እንደነበረው የተተነተኑ የውሃ ሚቴዎሮሎጂ መረጃዎች ያመላክታሉ። ከዚህም ጋር ተያይዞ የመስኖም ሆነ የሀይል ማመንጫ ግድቦች የተሻለ የውኃ አቅም እንዲኖራቸው አድርጓል። ሆኖም እንደተከሌ እና ቆቃ በመሳሰሉ ግድቦች የገባው ከፍተኛ የውሀ መጠን በተለይም ለታችኛው የተፋሰሱ አካባቢዎች አስጊ ደረጃ ላይ የደረሰ እንደሆነ ታይቷል። እንዲሁም በነበረው ከፍተኛ የገጸ ምድር የውሀ ፍሰት በቢሾፍቱ፣ በሰበታ እና ጋምቤላ ከተማ ጎርፍ በንብረት እና በቤቶች ላይ ጎዳት አስከትሎ ነበር። የተቀሩት በአብዛኛው ኦጋዴን፣ ገናሌ ዳዋ፣ መካከለኛው ዋቢ ሸበሌ፣ ታችኛው ስምጥ ሸለቆ፣ ባሮ አኮቦ ተፋሰሶች ላይ ደረቅ ሆነው ቆይተዋል (ካርታ 5) ።



ካርታ 5 እ.ኤ.አ ከኦገስት 1 እስከ 10/2025

ድረስ የነበረው የእርጥበት ሁኔታ


2. መግቢያ

በመደበኛ ሁኔታ የክረምት ዝናብ ቀደም ብሎ በደቡብ ምዕራብ እና በምዕራብ አጋማሽ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ የሚጀምር ሲሆን፤ በሂደትም እየተጠናከሩ ከሚሄዱ ዝናብ ሰጭ የሚቲዎሮሎጂ ገጽታዎች ጋር ተያይዞ በአገልግሎት ወር ውስጥ የክረምት ዝናብ ተጠቃሚ አካባቢዎች ሙሉ በሙሉ ዝናብ ያገኛሉ፡፡ የአገልግሎት ወር ከተቀሩት የክረምት ወራት በተሻለ ሁኔታ ሁሉንም የክረምት ዝናብ ተጠቃሚ አካባቢዎችን አካቶ በመጠንም ሆነ በሥርጭት ከፍተኛ ደረጃ የሚደርስበት ወር ነው፡፡ ስለሆነም የወሩ አማካይ የዝናብ መጠን በምዕራብ አጋማሽ በአብዛኛው የሀገሪቱ ሥፋራዎች ላይ ከ200-400 ሚ.ሜ እና በአንዳንድ ሥፋራዎች ላይ ከ400 ሚ.ሜ በላይ ይደርሳል፡፡ በእነዚህ አካባቢዎች የዝናብ ቀናትም በዚያው መልክ የሚጨምር በመሆኑ ከ18-30 ለሚደርሱት ቀናት ዝናብ ይኖራል፡፡ በሌላ በኩል በምስራቅ፣ በሰሜን ምስራቅ እና በመካከለኛው ኢትዮጵያ አካባቢዎች ላይም ቢሆን የዝናቡ መጠንና ሥርጭት እየተስፋፋ የሚሄድ በመሆኑ ከ6-20 ቀናት ያህል እስከ 300 ሚ.ሜ የሚደርስ ዝናብ በአማካይ ይኖራል፡፡

በመደበኛ ሁኔታ በአገልግሎት ሁለተኛው አስር ቀናት ዝናብ ሰጭ የሚቲዎሮሎጂ ገጽታዎች በበለጠ ሁኔታ እየተጠናከሩ የሚሄዱበት ጊዜ ነው፡፡ በተጨማሪም አልፎ አልፎ ባሉት ቀናት ከሚጠናከሩ የደመና ክምችቶች በአንዳንድ ቦታዎች ላይ በረዶ የቀላቀለ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ለወንዞች ሙላትና ለቅጽበታዊ ጎርፍ መከሰት አስተዋጽኦ ያደርጋል፡፡

2.1 እ.ኤ.አ ከአገልግሎት 11 እስከ 20/2025 የሚኖረው የአየር ሁኔታ ትንበያ

በአገልግሎት ሁለተኛው አስር ቀናት ለክረምት ዝናብ መፈጠር ምቹ ሁኔታን የሚፈጥሩ የሚቲዎሮሎጂ ገጽታዎች ይበልጥ እየተስፋፉና እየተጠናከሩ ይሄዳሉ፡፡ ከዚህ ጋር በተያያዘም በደቡብ ምዕራብ፣ ምዕራብ፣ ሰሜን ምዕራብ፣ ሰሜን፣ መካከለኛው፣ ምስራቅ እና ሰሜን ምስራቅ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ የተሻለ የዝናብ መጠንና ሥርጭት ይኖራቸዋል (ካርታ 6)፡፡ ስለሆነም እርጥበታማው የአየር ሁኔታ በተለይም በምዕራብ፣ ሰሜን ምዕራብ፣ የሰሜን ምስራቅ፣ ምስራቅ እና መካከለኛው የሀገራችን አካባቢዎች ላይ በመጠንም ሆነ በሥርጭት እየተስፋፋ ከመሄዱ ጋር ተያይዞ በብዙ ቦታዎቻቸው ላይ ከመካከለኛ እስከ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ይኖራቸዋል፡፡ በተጨማሪም በደቡብ ምዕራብ፣ ሰሜን ምዕራቅ እና በደቡብ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ አልፎ አልፎ ከሚጠናከሩት የአየር ሁኔታ ክስተቶች ላይ በመነሳት ቅፅበታዊ ጎርፍ ሊያስከትል የሚችል ከባድ መጠን ያለው ዝናብ እንደሚኖር የትንበያ መረጃዎች ይጠቁማሉ፡፡



ካርታ 6 እ.ኤ.አ. ከአገልግሎት 11-20, 2025 የሚኖረው የዝናብ መጠን በሚ.ሜ


በኢትዮጵያ የሚቲዎሮሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቲዎሮሎጂ ትንበያ፡



ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

በሚቀጥሉት አስር ቀናት ከሚጠናከሩት የሚቲዎሮሎጂ ገጽታዎች ላይ በመነሳት የክረምት ዝናብ ተጠቃሚ በሆኑ የሀገሪቱ አካባቢዎች ብዙ ቦታዎቻቸውን የሚሸፍን ከመካከለኛ እስከ ከባድ (ከ11-30 ሚ.ሜ) መጠን ያለው ዝናብ ያገኛሉ፡፡ በተጨማሪም በውሃ አካላትና በከባቢ አየር ውስጥ ከሚጠናከሩት የሚቲዎሮሎጂ ገጽታዎች ላይ በመነሳት በመካከለኛው፣ ምዕራብ፣ ሰሜን ምዕራብ፣ ሰሜን ምስራቅ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ በ24 ሰዓት ውስጥ ከ30 ሚ.ሜ በላይ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ እንደሚያገኙ አሃዛዊ የትንበያ መረጃዎች ይጠቁማሉ (ካርታ 7)፡፡

Exceptional Rainfall for 11-20 Aug 2025



ካርታ 7 እ.ኤ.አ. ከኦገስት 11-20, 2025

የሚኖረው ከፍተኛ የዝናብ መጠን

ሠንጠረዥ 1፡ በሚቀጥሉት አስር ቀናት ዝናብ የሚያገኙ አካባቢዎችና በ24 ሰዓት ውስጥ

የሚኖረው የዝናብ መጠን

ክልል	ዞን	በ 24 ሰዓት ውስጥ የሚኖረው የዝናብ መጠን
አሮሚያ	የቁለም ወሊጋ፣ ምዕራብ ወሊጋ፣ ምስራቅ ወሊጋ፣ ሆሮ ጉድሩ ወሊጋ፣ ኢሉባቦር፣ ቡኖ በደሌ፣ ጅማ፣ የሰሜን፣ ምዕራብ፣ ምስራቅ፣ ደቡብ ምዕራብ ሸዋ ዞኖች፣ ምዕራብ አርሲ እና አርሲ፣	ከባድ መጠን (ከ30 ሚ.ሜ በላይ)
	ምዕራብ ሐረርጌ፣ ምስራቅ ሐረርጌ፣ ባሌ፣ ምስራቅ ባሌ፣ ምዕራብ ጉጂ፣ ጉጂ እና ቦረና ዞኖች	ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን (ከ1-29 ሚ.ሜ)
አማራ	የሰሜን፣ ምዕራብ፣ መካከለኛው እና ደቡብ ጎንደር፣ የባህርዳር ዙሪያ፣ የአዊ፣ የሰሜን፣ ምዕራብ እና ምስራቅ ጎጃም፣ የዋግ ህምራ፣ የሰሜን ሸዋ ዞኖች፣ የሰሜን እና ደቡብ ወሎ ዞኖች	ከባድ መጠን (ከ30 ሚ.ሜ በላይ)
ትግራይ	የምዕራብ፣ የሰሜን ምዕራብ፣ የመካከለኛው፣ የደቡብ ምስራቅ እና የደቡብ ትግራይ ዞኖች	ከመካከለኛ እስከ ከባድ መጠን (ከ11 እስከ 30 ሚ.ሜ)

በኢትዮጵያ የሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎርሎጂ ትንበያ፡




ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

አፋር	የማሂ፡ ሀሪ፡ ቅልበቲ፡ ፈንቲ፡ ሀውሲ እና ጋቢ ዞኖች	ከመካከለኛ እስከ ከባድ መጠን (ከ11 እስከ 30 ሚ.ሜ)
ቤንሻንጉል ጉምዝ	የካማሺ፡ መተከል፡ አሶሳ፡ ማኦ ኮሞ ዞኖች	ከመካከለኛ እስከ ከባድ መጠን (ከ11 እስከ 30 ሚ.ሜ)
ጋምቤላ	የአኝዋክ፡ መሻጉንግ፡ የኑዌር እና የኢታንግ ልዩ ወረዳ	ከመካከለኛ እስከ ከባድ መጠን (ከ11 እስከ 30 ሚ.ሜ በላይ)
ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ	የክፋ፡ ኮንታ፡ ዳውሮ፡ ቤንች ሸኮ፡ ሸካ እና ምዕራብ ኦሞ	ከመካከለኛ እስከ ከባድ መጠን (ከ11 እስከ 30 ሚ.ሜ)
ማዕከላዊ ኢትዮጵያ	ጉራጌ፡ ምስራቅ ጉራጌ፡ ስልጤ፡ ሀዲያ፡ ከምባታ፡ ሀላባ፡ የም፡ ጠምባሮ ልዩ ወረዳ፡ ቀቤና ልዩ ወረዳ፡ ማረቆ ልዩ ወረዳ	ከመካከለኛ እስከ ከባድ መጠን (ከ11 እስከ 30 ሚ.ሜ)
ሲዳማ ክልል	ሁሉም የክልሉ ዞኖች	ከመካከለኛ እስከ ከባድ መጠን (ከ11 እስከ 30 ሚ.ሜ)
አዲስ አበባ፡ ድሬዳዋ እና ሐረሪ		ከመካከለኛ እስከ ከባድ መጠን (ከ11 እስከ 30 ሚ.ሜ)
ደቡብ ኢትዮጵያ	የወላይታ፡ ጎፋ፡ ጋሞ፡ እና ባስኬቶ	ከመካከለኛ እስከ ከባድ መጠን (ከ11 እስከ 30 ሚ.ሜ)
	ጌድዮ፡ አሪ፡ ኮንሶ፡ ቡርጂ፡ አሌ፡ ጋርዱላ፡ ኮሬ እና ደቡብ ኦሞ ዞኖች	ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን (ከ1 እስከ 29 ሚ.ሜ)
ሶማሌ	ሲቲ እና ፋፈን ዞኖች	ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን (ከ1 እስከ 29 ሚ.ሜ)
	የኤረር፡ ጃረር፡ ነጎብ፡ ቆራሂ እና ዳዋ፡ ዞኖች	ቀላል መጠን (ከ1-10 ሚ.ሜ)

2.3 የሚኖረው የቀኑ ከፍተኛ የሙቀት ሁኔታ

በኦገስት ሁለተኛው አስር ቀናት ከሚኖረው የፀሐይ ሀይል ጋር በተያያዘ የቀኑ ከፍተኛ ሙቀት በኤሊዳር፣ ዱብቲ፣ ሰመራ፣ ቡሬ፣ አሳይታ፣ ሁንዱፎ፣ ገዋኔ፣ ሚሌ፣ ዳሊፋጊ፣ አይሻ፣ ጉሊና፣ አዋሽ አርባ፣ ባቲ፣ ዶሎ አዶ፣ ዳዋ፣ ጎዴ፣ አቦቦ፣ ቋራ፣ አዋሽ ፈንታሌ፣ ጭፍራ፣ ላሬ፣ መተሃራ እና ፉኙዶ አካባቢዎች ላይ ከ30 እስከ 38 ዲግሪ ሴልሺየስ እንደሚሆን አሃዛዊ ትንበያዎች ያመለክታሉ (ካርታ 8)፡፡

Daily maximum temperature (C) for 11-20 Aug 2025



ካርታ 8 እ.ኤ.አ. ከኦገስት 11-20, 2025 የሚኖረው ከፍተኛ የሙቀት መጠን በዲ.ሴ

2.4 እ.ኤ.አ ከኦገስት 21 እስከ 31/2025 የሚኖረው የአየር ሁኔታ አዝማሚያ

በመደበኛ ሁኔታ በኦገስት የመጨረሻው አሥራ አንድ ቀናት ዝናብ ሰጭ የሚቴዎርሎጂ ገጽታዎች በበለጠ ሁኔታ እየተጠናከሩ የሚሄዱበት ጊዜ ነው፡፡ በተጨማሪም አልፎ አልፎ ባሉት ቀናት በፀሀሳይ ሃይል ተግዘው ከሚጠናከሩ የደመና ክምችቶች በአንዳንድ ቦታዎች ላይ በረዶ የቀላቀለ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ለወንዞች ሙላትና ለቅጽበታዊ ጎርፍ መከሰት አስተዋጽኦ ያደርጋል፡፡

በመጨረሻም የኦገስት ሶስተኛው አሥራ አንድ ቀናት ዝናብ ሰጭ የሚቴዎርሎጂ ገጽታዎች የክረምት ዝናብ ተጠቃሚ በሆኑት የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ የተሻለ የዝናብ መጠንና ሥርጭት እንደሚኖራቸው የትንበያ መረጃዎች ይጠቁማሉ፡፡ ከዚሁ ጋር በተያያዘም በምዕራብ፣ ሰሜን ምዕራብ፣ ሰሜን፣ እና መካከለኛው የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ በ24 ሰዓት ውስጥ ከ30 ሚ.ሜ በላይ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ እንደሚኖር የአሀዛዊ የትንበያ መረጃዎች ይጠቁማሉ ፡፡ በተጨማሪም በሰሜን ምስራቅ እና ምስራቅ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ ከመካከለኛ እስከ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ይገኛል፡፡

በኢትዮጵያ የሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎርሎጂ ትንበያ፡



ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

2.5 እ.አ.አ ከኦገስት 11 እስከ 20/2025 የሚኖረው የአየር ሁኔታ በግብርናው ሥራ እንቅስቃሴ ላይ ሊያሳድር የሚችለው ተፅዕኖ

በሚቀጥሉት አሥር ቀናት በምዕራብ፣ በሰሜን ምዕራብ፣ በሰሜን ምስራቅ፣ በምስራቅ፣ በመካከለኛው፣ በደቡብ ምዕራብ እና በደቡብ የሀገሪቱ ቦታዎች ላይ ከቀላል እስከ ከባድ መጠን ያለው እርጥበት ይኖራል። በመሆኑም የሚኖረው እርጥበት ለወቅቱ የግብርና ስራ እንቅስቃሴ በአመዛኙ አዎንታዊ ሚና የሚኖረው ቢሆንም፣ ተያያዥ ስጋቶችን ለመቀነስና የሚኖሩትን መልካም አጋጣሚዎች በላቀ ሁኔታ ለመጠቀም የቀረቡትን ቦታ ተኮር የግብርና ሚቴዎርሎጂ ምክረ ሀሳቦች በሁሉም ደረጃ በተገቢው ሁኔታ መተግበር ያስፈልጋል።

ሠንጠረዥ 2፡ በሚቀጥሉት አስር ቀናት የሚኖረው የእርጥበት ሁኔታ በግብርናው እንቅስቃሴ ላይ

ዞኖች	የእርጥበት ሁኔታ	አዎንታዊ ተጽዕኖ	አሉታዊ ተጽዕኖ	የተሰጠ ምክረ ሃሳብ
የክረምት እርጥበት ተጠቃሚ የመኸር አምራች ዞኖች				
የቁለም ወለጋ፣ ምዕራብ ወለጋ፣ ምስራቅ ወለጋ፣ ሆሮ ጉድፋ ወለጋ፣ ኢሉባቦር፣ ቡኖ በደሌ፣ ጅማ፣ የሰሜን፣ ምዕራብ፣ ምስራቅ እና ደቡብ ምዕራብ ሸዋ ዞኖች፣ የሰሜን፣ ምዕራብ፣ መካከለኛው እና ደቡብ ጎንደር፣ የባህርዳር ዙሪያ፣ የአዊ፣ የሰሜን፣ ምዕራብ እና ምስራቅ ጎጃም ዞኖች፣ የዋግ ህምራ፣ የምዕራብ፣ የሰሜን ምዕራብ፣ የመካከለኛው ትግራይ፣ የካማሺ፣ መተከል፣ አሶሳ፣ ማኦ ኮሞ ዞኖች፣ የአኝዋክ፣ መሻርንግ፣ የኑዌር እና የኢታንግ ልዩ ወረዳ፣ የከፋ፣ ኮንታ፣ ዳውሮ፣ ቤንች ሸኮ፣ ሸካ እና ምዕራብ ኦሞ ዞኖች	ከመካከለኛ እስከ ከባድ መጠን ያለው እርጥበት	- የአፈር ውስጥ እርጥበት መሻሻል - ለረጅምና መካከለኛ ጊዜ ሰብሎች እድገት - ለቋሚ ተክሎችና ለግጦሽ ሳር ዕድገት የመጠጥ ውሃ አቅርቦት መሻሻል	- በቡቃያ ሰብሎች ላይ የውሃ መተኛት - ተዳፋታማ በሆኑ አካባቢዎች የመሬት መንሸራተት - የአረም መስፋፋት የአፈር ማዳበሪያና ፀረ ተባይ ኬሚካል መታጠብ	- በማሳዎች ውስጥ የውሃ ማንጣፈፍያ እና የጎርፍ መቀልበሻ ቦቶችን ማዘጋጀት ያስፈልጋል - የአፈር መሸርሸር ስጋትን ለመቀነስ የጎርፍ መቀልበሻ ቦቶችን ማዘጋጀት - የማዳበሪያና የፀረ ተባይ ኬሚካል አጠቃቀምን በትክክለኛው ሰዓት መተግበር - አረምን በወቅቱ ማረም
በልግ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸውና የመኸር አብቃይ የሆኑ ዞኖች				

በኢትዮጵያ የሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎርሎጂ ትንበያ፡



ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

ምዕራብ አርሲ እና አርሲ፡ ሰሜን እና ደቡብ ወሎ እና የሰሜን ሸዋ ዞኖች የደቡብ ምስራቅ እና የደቡብ ትግራይ ዞኖች፡ ጉራጌ፡ ምስራቅ ጉራጌ፡ ስልጤ፡ ሀዲያ፡ ከምባታ፡ ሀላባ፡ የም፡ ጠምባሮ ልዩ ወረዳ፡ ቀቤና ልዩ ወረዳ፡ ማረቆ ልዩ ወረዳ፡ ሁሉም ሲዳማ የክልሉ ዞኖች፡ አዲስ አበባ፡ ድሬዳዋ እና ሐረሪ የወላይታ፡ ጎፋ እና ባስኬቶ፡ የማሂ፡ ሀሪ፡ ቀልበቲ፡ ፈንቲ፡ አውሲ እና ጋቢ ዞኖች	ከመካከለኛ እስከ ከባድ መጠን ያለው እርጥበት	• ለረጅምና መካከለኛ ጊዜ ሰብሎች እድገት • ለቋሚ ተክሎችና ለግጦሽ ሳር ዕድገት በቂ እርጥበት መኖር • ለእንስሳት መኖርና የመጠጥ ውሃ አቅርቦት መሻሻል	• በቡቃያ ሰብሎች ላይ የውሃ መተኛት • የአፈር መሸርሸር • የአረም መስፋፋት • የደረሱ የበልግ ሰብሎች ለመሰብሰብ አስቸጋሪ መሆን	• ረባዳማ በሆኑ ማሳዎች የውሃ ማንጣፈፍ ስራዎችን መስራት • የአፈር መሸርሸር ስጋትን ለመቀነስ የጎርፍ መቀልበሻ ሦሮችን ማዘጋጀት • የማዳበሪያና ፀረ-ተባይ ኬሚካሎችን አጠቃቀምን በትክክለኛው ሰዓት መተግበር • አረምን በወቅቱ ማረም፤ • የደረሱ የበልግ ሰብሎችን በደረቅ ሰሞናተ መሰብሰብ
ምዕራብ ሐረርጌ፡ ምስራቅ ሐረርጌ፡ ባሌ፡ ሲቲ እና ፋፈን ዞኖች	ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን ያለው እርጥበት	• ለረጅምና መካከለኛ ጊዜ ሰብሎች እድገት ለእንስሳት መኖርና የመጠጥ ውሃ አቅርቦት መሻሻል	• በጥቂት ቦታዎች ላይ የአፈር ዉስጥ እርጥበት ማነስ •	• የሚገኘውን እርጥበት በአግባቡ መጠቀም • የዝናብ ውሀ ማሰባሰብና በደረቅ ሰሞናተ መጠቀም • ማሳን በየጊዜው መጎብኘትና የሰብል ጥበቃ ስራን ማከናወን • ወሀን አክሞ ጥቅም ላይ ማዋል
በልግ ዋነኛ የዝናብ ወቅታቸው የሆኑ ዞኖች				
ምስራቅ ባሌ፡ ምዕራብ ጉጂ፡ ጉጂ እና ቦረና ዞኖች፡ ጋሞ፡ ጌድዮ፡ አሪ፡ ኮንሶ፡ ቡርጂ፡ አሌ፡ ጋርዱላ፡ ኮሬ እና ደቡብ ኦሞ ዞኖች፡ የኤረር፡ ጃረር፡ ነጎብ፡ ቆራሂ እና ዳዋ፡ ዞኖች	ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን ያለው እርጥበት	• የደረሱ የበልግ ሰብሎችን ለመሰብሰብ	• ከፍተኛ ትነት መኖር •	• የዝናብ ውሃን በማሰባሰብ በደረቅ ሰሞናተ ተግባር ላይ ማዋል • የመኖ አቅርቦትን ማረጋገጥ

በኢትዮጵያ የሚቲዎሮሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቲዎሮሎጂ ትንበያ፡



ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

2.6 እ.ኤ.አ ከኦገስት 11 እስከ 20/2025 የሚኖረው የአየር ሁኔታ በውሃ ዘርፍ ላይ ሊያሳድር የሚችለው ተፅዕኖ

በቀጣይ ኦገስት ሁለተኛ አስር ቀናት በአብዛኛው የክረምት ተጠቃሚ ተፋሰሶች ላይ ከመጠነኛ እስከ ከፍተኛ መጠን ያለው የገፀ ምድር የውሃ ፍሰት ይኖራቸዋል። ከዚህ ጋር ተያይዞ አልፎ አልፎ ከሚኖረው ተደጋጋሚ የሆነ ከባድ ዝናብ ጋር ተያይዞ በተለይም ለጎርፍ ተጋላጭ በሆኑ ተፋሰሶች ላይ ቅጽበታዊ ጎርፍ፣ እንዲሁም የወንዞች ከፍታ መጨመር በተጨማሪም በላይኛው ተፋሰስ በሚነሱ ወንዞች በታችኛው ተፋሰሶች ላይ የወንዞች መጥለቅለቅ የማስከተል እድል ይኖረዋል። በተለይም በአዋሽ ተፋሰስ አዋሽ ወንዝ ዳርቻ እና በአሞ ጊቤ ተፋሰስ አሞ ወንዝ ዳርቻ እንዲሁም በአብዛኛው ክረምት ተጠቃሚ ተፋሰሶች በረባዳማ እና ረግረጋማ የሚኖሩ የማህበረሰብ ክፍሎች አካባቢ ከፍተኛ ሰጋት ሊኖር ይችላል። በመሆኑም ተያያዥ ስጋቶችን ለመቀነስና የሚኖሩትን መልካም አጋጣሚዎች በላቀ ሁኔታ ለመጠቀም የቀረቡትን ቦታ ተኮር የውሃ ሚቲዎሮሎጂ ምክረ ሀሳቦች በሁሉም ደረጃ በተገቢው ሁኔታ መተግበር ያስፈልጋል።

ሠንጠረዥ 3፡ በሚቀጥሉት አስር ቀናት የሚኖረው የእርጥበት ሁኔታ በውሃ ዘር ላይ ሊኖር የሚችለው ተጽዕኖ

የውኃ ተፋሰሶች	የእርጥበት ሁኔታ	አዎንታዊ ተጽዕኖ	አሉታዊ ተጽዕኖ	የውኃ ሚቲዎሮሎጂ ምክረ ሃሳብ
በአብዛኛው አባይ፣ ተከኤ፣ መረብ ጋሽ፣ ባሮ አኮቦ፣ አሞ ጊቤ፣ አዋሽ፣ አፋር ደናክል፣ አይሻ፣ ላይኛው እና መካከለኛ ስምጥ ሸለቆ፣ በላይኛው ዋቢ ሸበሌና ገናሌ ዳዋ	ከመካከለኛ እስከ ከፍተኛ እርጥበት	የገፀ ምድር የውሃ ፍሰት መጨመር የመስኖም ሆነ የሃይል ማመንጫ ግድቦች ውኃ መጠን መጨመር የክርሰ ምድር የውኃ መጠን መሻሻል የመጠጥ ውኃ አቅርቦት መጨመር	- የወንዞች መሙላት - የቅፅበታዊ ጎርፍ ስጋት መጨመር - በውሃ መያዣዎች ላይ የደለል ስጋት መጨመር - የፍሳሽ መውረጃዎች በደለል እንዲሁም በጠጣር ቆሻሻ መዘጋት	- የጎርፍ መውረጃዎች ቦዮችን ማፅዳት - የጎርፉ መቀለበሻ ቦዮችን ማዘጋጀት - ፍሳሽ ሊዘጉ የሚችሉ ቆሻሻዎች በተገቢ ሁኔታ ማስወገድ - ከፍተኛ ወራጅ ውሀን በእግርም ሆነ በቀላል ተሽከርካሪ ለማቋረጥ አለመሞከር - የዝናብ ውሀ ማሰባሰብና ማጠራቀም - የጎርፍ ተጽዕኖ ትንበያዎችንና ምክረ ሀሳቦችን በየ ጊዜው መከታተል

በኢትዮጵያ የሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎርሎጂ ትንበያ፡



ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

በአብዛኛው መካከለኛው እና የታችኛው		• የጎርፍ ሆነ የደለል ስጋት መቀነስ	• ዝቅተኛ የውሀ ፍሰት • እርጥበት አጠር በሆኑ አካባቢዎች የውሃ አጥረት • ከፍተኛ ትነት	• የሚገኘው መጠነኛ የዝናብ ውሃ ከጣራ እና ከመሬት ወለል በተግባሩ ሁኔታ ማሰባሰብ • የውሀ ሀብትን በአግባቡ መጠቀም የሚገኘውን መጠነኛ የዝናብ ውሀ ከብክነት እና ከብክለት በመከላከል
• ገናሌ ዳዋ፣ ዋቤ ሸበሌና አጋዴን	ከመጠነኛ እስከ ደረቅ ሁኔታ			

