

በኢትዮጵያ የሚቴዎሮሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎሮሎጂ ትንበያ፣
ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ



ከሴፕቴምበር 11-20/2025 የነበረው የአየር ሁኔታ ግምገማ
እንዲሁም ከሴፕቴምበር 21-30 እና ከኦክቶበር 1-10/2025
የሚኖረው የአየር ሁኔታ ትንበያ እና ምክረ ሃሳብ

ሴፕቴምበር 2025

አዲስ አበባ

1. እ.ኤ.አ ከሴፕቴምበር 11 እስከ 20/2025 የነበረው የአየር ሁኔታ


ባለፉት አስር ቀናት ለዝናብ መፈጠርና መስፋፋት አተዋጽኦ የሚያደርጉ የሚቴዎርሎጂ ገጽታዎች በተለይም በመጀመሪያዎቹ ቀናቶች ላይ ተጠናክረው ተስተውለዋል፡፡ በመሆኑም ዝናቡ በስርጭትም ሆነ በመጠን በብዙ የክረምት ዝናብ ተጠቃሚ የሀገሪቱ አካባቢዎቹን ያዳረሰ የዝናብ ሁኔታ ነበር፡፡ ከዚህ ጋር በደቡብ ምዕራብ፣ ምዕራብ፣ ሰሜን ምዕራብ እና መካከለኛው የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ ከመካከለኛ እስከ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ተመዝግቧል፡፡ በተጨማሪም በ24 ሰዓት ውስጥ ከ30 ሚ.ሜ በላይ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ከተመዘገበባቸው የሚቴዎርሎጂ ጣቢያዎች መካከል አዲስ አበባ ቦሌ 30.1፣ 37.4፣ ባህርዳር 43.4፣ ጎሬ 44.3፣ ነቀምቴ 37.4፣ 43.4፣ አይራ 47.8፣ 44.5፣ 32፣ ሐሮማያ 44.5፣ አምደወርቅ 73.4፣ አንገር ጉትን 34፣ 46.2፣ አርሲ ሮቤ 33.8፣ በደሌ 44.4፣ ቡለን 40.2፣ ጨዋቃ 48፣ ደብረ ታቦር 34.5፣ 30፣ ፍቼ 35.8፣ ፋኙዶ 82.5፣ 56፣ ገለምሶ 37.2፣ ጊዳ አያና 33፣ 52.9፣ ጊምቢ 42.5፣ 31.3፣ ጃራ 38.2፣ ኮንሶ 38.7፣ ማንኩሽ 45፣ መተማ 30፣ 38.2፣ ሞጣ 40.2፣ ሰንቃጣ 31፣ ሸርቆሌ 36.3፣ አታንጎ 49፣ 54.5፣ ቦርቃ 44.8፣ ጨፌ ዶንሳ 37.3፣ ደራ 35.5፣ ጊነገር 35.6፣ ጎሮ 36፣ ሃሮ 30.4፣ 40.2፣ 50.1፣ 40.4፣ ቅዳሜ ገበያ 52.8፣ 34.8፣ ኮበን 35፣ መሆኒ 30.9፣ አሞ ናዳ 40.2፣ ኦንጋ 42፣ ተረኮዲ 33.8፣ ያንፋ 32.8፣ 40.3፣ ያዮ 41.6፣ ዩጫላ 40.3፣ እዳግ አርቢ 42.2፣ እንዲሁም ከርሳ 35.6 ሚ.ሜ የሚደርስ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ተመዝግቦባቸዋል፡፡

በአጠቃላይ ባለፉት አስር ቀናት በሀምሳ አምስት (55) የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ በ24 ሰዓት ውስጥ ከ30 ሚ.ሜ በላይ የሆነ ከባድ መጠን ያለው የዝናብ መጠን ነበራቸው (ምስል 1)፡፡ በተጨማሪም በአንዳንድ የክረምት ዝናብ ተጠቃሚ በሆኑ የምዕራብና የደቡብ ምዕራብ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ በ24 ሰዓት ውስጥ 41.6-82.5 ሚ.ሜ የሚደርስ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ተመዝግቧል፡፡ ከ50 ሚ.ሜ በላይ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ከተመዘገበባቸው የሀገሪቱ አካባቢዎች መካከል ፋኙዶ፣ አምደ ወርቅ፣ ማንኩሽ፣ ደራ፣ አታንጎ፣ ቡለን፣ ጊዳ አያና፣ ቅዳሜ ገበያይገኙበታል (ምስል 1)፡፡

በኢትዮጵያ የሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎርሎጂ ትንበያ፡




ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ




ምስል:1 ከሴፕቴምበር 11-20 በ24 ሰዓት ውስጥ ከ40 ሚ.ሜ በላይ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ የተመዘገበባቸው

ባለፉት አስር ቀናት የዘነበዉ የዝናብ መጠን ከሀገሪቱ ቦታ ሽፋን አንፃር ሲገመገም፤ ከአሮሚያ ክልል የቁለም ወለጋ፣ ምዕራብ ወለጋ፣ ምስራቅ ወለጋ፣ ሆሮ ጉድሩ ወለጋ፣ ኢሉባቦር፣ ቡኖ በደሌ፣ ጅማ፣ ሰሜን፣ ምዕራብ፣ መካከለኛና ምስራቅ ሸዋ፣ የምዕራብ አርሲ፣ አርሲ፣ ምስራቅ ባሌ፣ ባሌ፣ ምዕራብ እና ምስራቅ ሓረርጌ ዞኖች፣ ከአማራ ክልል የሰሜን፣ መካከለኛው፣ ምዕራብና ደቡብ ጎንደር ዞኖች፣ ሰሜን፣ ምስራቅና ምዕራብ ጎጃም፣ የአዊ፣ የባህርዳር ዙሪያ ዞኖች፣ ከትግራይ ክልል የምዕራብ፣ ሰሜን ምዕራብ፣ መካከለኛው፣ ደቡብ ምስራቅና ደቡብ ትግራይ ዞኖች፣ ከቤንሻንጉል ጉምዝ ካማሺ፣ መተከል፣ አሶሳ፣ ማኦ ኮሞ ዞኖች፣ ከጋምቤላ ክልል አኝዋክ፣ መሻንጉን፣ የኑዌር እና የኢታንግ ልዩ ወረዳ፣ ከማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ጉራጌ፣ ምስራቅ ጉራጌ፣ የሀዲያ፣ ስልጤ፣ የከንባታ፣ አዲስ አበባ፣ ድሬዳዋ እና ሐረሪ የሃላባ፣ የምዞር፣ ቀቤና፣ ማረቆ፣ ጠምባሮ ልዩ ወረዳ፣ ከደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል ኮንታ፣ ዳዉሮ፣ ከፋ፣ ሸካ፣ ቤንሻ ሸካ ዞኖች ላይ ከ41-220 ሚ.ሜ የሚደርስ ዝናብ ከ5-10 ቀናት ያህል ዝናብ ነበራቸዉ (ካርታ 1 እና 2)። በተጨማሪም የዋግ ህምራ፣ የደቡብ እና የሰሜን ወሎ፣ የሰሜን ሸዋ ዞኖች፣ ከደቡብ ኢትዮጵያ ክልል የጎፋ፣ የጋሞ፣ የወላይታ፣ ጌዲዮ እና ባስኬቶ ዞኖች፣ ከአፋር ክልል የቀልበቲ፣ ሃሪ፣ የጋቢ፣ ፋንቲ፣ አዉሲና ማሂ ዞኖች፣ ከሱማሌ ክልል የሲቲ፣ የኤረር፣ ነጎብ፣ አፍዴር፣ እና የሊቦን ዞኖች፣ ላይ ከ11-80 ሚ.ሜ የሚደርስ ዝናብ ከ3-6 ቀናት ያህል ዝናብ ነበራቸዉ (ካርታ 1 እና 2) ።



ካርታ 1 እ.ኤ.አ ከሴፕቴምበር 11 እስከ 20/2025 ድረስ የነበረው የዝናብ መጠን በሚ.ሜ




ካርታ 2 እ.ኤ.አ ከሴፕቴምበር 11 እስከ 20/2025 ድረስ ዝናብ የዘነበባቸዉ ቀናት

በኢትዮጵያ የሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎርሎጂ ትንበያ፡



ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

ባለፉት አስር ቀናት የዘነበዉ የዝናብ መጠን ከመደበኛዉ ጋር ሲነፃፀር ከአሮሚያ ክልል የቁለም ወለጋ፣ ምዕራብ ወለጋ፣ ምስራቅ ወለጋ፣ ሆሮ ጉድሩ ወለጋ፣ ኢሉባቦር፣ ቡኖ በደሌ፣ ጅማ፣ ሰሜን፣ ምዕራብ፣ መካከለኛና ምስራቅ ሸዋ፣ የምዕራብ አርሲ፣ አርሲ፣ ምስራቅ ባሌ፣ ባሌ፣ ምዕራብ እና ምስራቅ ሓረርጌ ዞኖች፣ ከአማራ ክልል የሰሜን፣ መካከለኛዉ፣ ምዕራብና ደቡብ ጎንደር ዞኖች፣ ሰሜን፣ ምስራቅና ምዕራብ ጎጃም፣ የባህርዳር ዙሪያ፣ የአዊ፣ የዋግ ህምራ፣ የሰሜን ወሎና የደቡብ ወሎ እና የሰሜን ሸዋ ዞኖች፣ ከቤንሻንጉል ጉምዝ ካማሺ፣ መተከል፣ አሶሳ፣ ማኦ ኮሞ ዞኖች፣ ከትግራይ ክልል የምዕራብ፣ የሰሜን ምዕራብ፣ መካከለኛዉ፣ ደቡብ ምስራቅና የደቡብ ትግራይ ዞኖች፣ ከጋምቤላ ክልል አኝዋክ፣ መሻዥንግ፣ የኑዌር እና የኢታንግ ልዩ ወረዳ፣ ከደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል ኮንታ፣ ዳዉሮ፣ ከፋ፣ ሸካ፣ ቤንች ሸኮ ዞኖች፣ ከማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ጉራጌ፣ ምስራቅ ጉራጌ፣ የሀዲያ፣ ስልጤ፣ የከንባታ፣ የሃላባ፣ የም ዞኖች፣ ቀቤና፣ ማረቆ፣ ጠምባሮ ልዩ ወረዳ፣ ከደቡብ ኢትዮጵያ ክልል የጎፋ፣ ጋሞ፣ ወላይታ፣ ጌዲዮ እና ባስኬቶ ዞኖች፣ ከአፋር ክልል የቀልበቲ፣ ሃሪ፣ የጋቢ፣ ፋንቲ፣ አዉሲና ማሂ ዞኖች፣ ከሱማሌ ክልል የሲቲ፣ ፋፈን፣ ጃረር፣ የኤረር፣ ነጎብ፣ አፍዴር፣ ዳዋ፣ እና የሊበን ዞኖች፣ አዲስ አበባ፣ ድሬዳዋ እና ሐረሪ ላይ በአብዛኛዉ ከመደበኛዉ በላይ የሆነ ዝናብ እና በትቂት ቦታዎች ላይ ደግሞ ከመደበኛዉ ጋር የተቀራረበ የዝናብ መጠን ተመዝግቧል (ካርታ 3) ፡፡




ካርታ 3 እ.ኤ.አ ከሴፕቴምበር 11 እስከ 20/2025 የነበረዉ የዝናብ መጠን ከመደበኛዉ ጋር ሲነፃፀር



1.2 እ.ኤ.አ ከሴፕቴምበር 11 እስከ 20/2025 የነበረው የአየር ሁኔታ

በግብርና ሥራ እንቅስቃሴ ላይ ያሳደረው ተፅዕኖ

ባለፉት የሴፕቴምበር ሁለተኛ አስር ቀናት በአብዛኛው የክረምት ዝናብ ተጠቃሚና የመኸር አብቃይ በሆኑት በተለይም የምዕራብ፣ የሰሜን ምዕራብ፣ የመካከለኛው እና የደቡብ ምዕራብ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ የነበረው ከመካከለኛ እስከ ከባድ መጠን ያለው የእርጥበት ሁኔታ አግኝተዋል፡፡ በመሆኑም የነበረው እርጥበት ቀደም ሲል ተዘርተው በተለያየ የዕድገት ደረጃና ፍሬ በመሙላት ላይ ለሚገኙት እንደ ማሽላና በቆሎ ለመሳሰሉት የረጅም ጊዜ ሰብሎች፣ ለቋሚ ተክሎች፣ ለፍራፍሬዎችና ለጓሮ አትክልቶች እንዲሁም ወቅታቸውን ጠብቀው ተዘርተው ፍሬ በማፍራትና በማበብ ላይ ባሉት የመካከለኛና የአጭር ጊዜ ሰብሎች የውሃ ፍላጎታቸውን ከመሟላት አንጻር ከፍተኛ ጠቀሜታ ነበረው፡፡ በተጨማሪም የተገኘው እርጥበት በሰሜን ምስራቅ፣ በምስራቅ እና በደቡብ ለሚገኙት አርብቶ አደሮችና ከፊል አርብቶ አደሮች ለግጦሽ ሳር፣ ለመጠጥ ውሃ ሆነ ለጥምር ግብርና ስራ የጎላ ጠቀሜታው ነበረው፡፡ በአንፃሩ በተከታታይ እርጥበት እያገኙ ባሉ አንዳንድ የሀገሪቱ አካባቢዎች ከእርጥበት መብዛት ጋር በሰብል ማሳዎች ላይ የውሃ መተኛት፣ በአንዳንድ አካባቢዎችም የሰብል በሽታና ተባይ እንዲሁም የአረም መስፋፋት በሰብሎች እድገትና ምርታማነት ላይ መጠነኛ ጉዳት አስከትሏል (ካርታ 4) ፡፡



ካርታ 4 እ.ኤ.አ ከሴፕቴምበር 11 እስከ 20/2025


ድረስ የነበረው የእርጥበት ሁኔታ

በኢትዮጵያ የሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎርሎጂ ትንበያ፡

ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

1.3 እ.ኤ.አ ከሴፕቴምበር 11 እስከ 20/2025 የነበረው የአየር ሁኔታ በውሃው ዘርፍ ላይ ያሳደረው ተፅዕኖ

ባሳለፍነው የሴፕቴምበር ሁለተኛ አስር ቀናት በአብዛኛው አባይ፣ ኦሞ ጊቤ፣ ተከዜ፣ ባሮ አኮቦ፣ መረብ ጋሽ፣ አዋሽ፣ ስምጥ ሸለቆ፣ በላይኛው እና መካከለኛው አዋሽ፣ በላይኛው ዋቢ ሸበሌ እና ገናሌ ዳዋ ተፋሰሶች ላይ ከመጠነኛ እስከ ከፍተኛ የሆነ የገጸ ምድር የውሀ ፍሰት ነበራቸው፡፡ በተጨማሪም በመካከለኛው እና በታቻኛው አባይ፣ በላይኛው ኦሞ ጊቤ፣ አዋሽ እና ባሮ አኮቦ ተፋሰሶች ላይ በጣም ከፍተኛ የሆነ የገጸ ምድር የውሃ ፍሰት እንደነበራቸው የተተነተኑ የውሃ ሚቴዎርሎጂ መረጃዎች ያመለክታሉ፡፡ ይህ ሁኔታ የገፀ ምድር ውሃ ፍሰትን በመጨመር ወደ ግድቦች የሚገባውን ውሃ መጠን በመጨመር የተሻለ የውሀ ሀብት ከምችት እንዲኖር ከማስቻል አንጻር አዎንታዊ ሚና እንደነበረው የተተነተኑ የውሃ ሚቴዎርሎጂ መረጃዎች ያመለክታሉ፡፡ የተቀሩት በአብዛኛው ኦጋዴን፣ አፋር ደናክል፣ አይሻ፣ መካከለኛው እና ታቻኛው ገናሌ ዳዋ፣ ዋቢ ሸበሌ እና በታቻኛው አዋሽ ተፋሰሶች ላይ ደረቅ ሆነው ቆይተዋል (ካርታ 5) ።



ካርታ 5 እ.ኤ.አ ከሴፕቴምበር 11 እስከ 20/2025

ድረስ የነበረው የእርጥበት ሁኔታ



በኢትዮጵያ የሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎርሎጂ ትንበያ፡

ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

2. መግቢያ

ሴፕቴምበር የክረምት የመጨረሻ ወር ከመሆኑ ጋር ተያይዞ የወቅቱ ዝናብ በብዙ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ እየቀነሰ የሚሄድ ሲሆን፤ በአንጻሩ ለረጅም ጊዜ ደረቅ ሆነው የሰነበቱት የደቡብና የደቡብ ምሥራቅ አካባቢዎች ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸውን ማግኘት ይጀምራሉ። በዚህም መሠረት በምዕራብ ኢጋማሽ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ ከ100-300 ሚ.ሜ ይደርሳል። በእነዚህ አካባቢዎች የዝናብ ቀናትም በዚያው መልክ የሚቀንስ በመሆኑ ከ12-23 ለሚደርሱት ቀናት ያህል ዝናብ ይኖራል። በሌላ በኩል በምስራቅ፤ በሰሜን ምስራቅ እና በመካከለኛው ኢትዮጵያ አካባቢዎች ላይም ቢሆን የዝናቡ መጠንና ሥርጭት በሂደት እየቀነሰ የሚሄድ በመሆኑ ከ3-15 ቀናት ያህል ከ20-200 ሚ.ሜ የሚደርስ ዝናብ በአማካይ ያገኛሉ። የደቡብና የደቡብ ምስራቅ ስፍራዎች ላይ ዝናቡ በመጠንም ሆነ በሥርጭት የሚጨምር በመሆኑ 30-100 ሚ.ሜ ከ3-12 ቀናት ይደርሳል።

በመደበኛ ሁኔታ በሴፕቴምበር ሶስተኛው አሥር ቀናት ዝናብ ሰጭ የሚቴዎርሎጂ ገጽታዎች ከሰሜንና ከሰሜን ምሥራቅ ከሁለተኛው ሳምንት ጀምሮ እየተዳከሙ ስለሚመጡ ዝናቡ በመጠንም ሆነ በሥርጭትም ይቀንሳል። በሌላ በኩል የክረምት ዝናብ ድንበር (ITCZ) ወደ ምዕራባዊው ኢጋማሽና ወደ ደቡባዊው የኢትዮጵያ ክፍሎች ስለሚያፈገፍግ ዝናቡ በምዕራብና በደቡብ ምዕራብ ቀጣይነት የሚኖረው ሲሆን፤ በተመሳሳይ ሁኔታም በደቡብ እና በደቡብ ምሥራቅ የሀገሪቱ ሥፍራዎች ሁለተኛውን የዝናብ ወቅታቸውን ቀስ በቀስ ማግኘት ይጀምራሉ።



Ethiopian Meteorology Institute




2.1 እ.ኤ.አ ከሴፕቴምበር 21 እስከ 30/2025 የሚኖረው የአየር

ሁኔታ ትንበያ

በሚቀጥሉት የሴፕቴምበር ሶስተኛው አሥር ቀናት አሁን ከሚታዩትና በቀጣይነትም ከተተነበዩት የትንበያ መረጃዎች መረዳት እንደተቻለው ዝናብ ሰጭ የሚቴዎርሎጂ ገጽታዎች በአብዛኛው የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ ቀጣይነት ይኖራቸዋል፡፡ በመሆኑም በደቡብ ምዕራብ፣ ምዕራብ፣ ሰሜን ምዕራብ፣ እንዲሁም በመካከለኛው የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን ያለው ዝናብ እንደሚኖራቸው አሃዛዊ የትንበያ መረጃዎች ይጠቁማሉ፡፡ በተጨማሪም በፀጋይ ሀይል ታግዞ ከሚጠናከሩ የደመና ክምችቶች ላይ በመነሳት በምዕራብ፣ በመካከለኛው እና ደቡብ ምዕራብ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ አልፎ አልፎ በሚኖሩት ቀናት በ24 ሰዓት ውስጥ ከ30 ሚ.ሜ በላይ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ይኖራቸዋል (ካርታ 6 እና 7)፡፡ በሌላ በኩል በጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው በሆኑት በደቡብና ደቡብ ምስራቅ የሀገሪቱ አካባቢዎች ከቀን ወደ ቀን የደመና ሽፋን እንደሚጨምር ከመጠበቁ ጋር ተያይዞ በአብዛኛዎቹ የበጋ ዝናብ ተጠቃሚ አካባቢዎች ላይ ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን ያለው ዝናብ ያገኛሉ፡፡


: ካርታ 6 እና 7) ::

Total Rainfall (mm) for 21-30 Sep 2025



ካርታ 6 እ.ኤ.አ. ከሴፕቴምበር 21-30, 2025
የሚኖረው የዝናብ መጠን በሚ.ሜ

Exceptional Rainfall for 21-30 Sep 2025



ካርታ 7 እ.ኤ.አ. ከሴፕቴምበር 21-30, 2025
የሚኖረው ከፍተኛ የዝናብ መጠን



በኢትዮጵያ የሚቴዎሮሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎሮሎጂ ትንበያ፡

ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

ሠንጠረዥ 1፡ በሚቀጥሉት አስር ቀናት ዝናብ የሚያገኙ አካባቢዎችና በ24 ሰዓት ውስጥ

የሚኖረው የዝናብ መጠን

ክልል	ዞን	በ 24 ሰዓት ውስጥ የሚኖረው የዝናብ መጠን
አሮሚያ	የቁለም ወሊጋ፣ ምዕራብ ወሊጋ፣ ምስራቅ ወሊጋ፣ ሆሮ ጉድፋ ወሊጋ፣ ኢሉባቦር፣ ቡኖ በደሌ፣ ጅማ፣	ከመካከለኛ እስከ ከባድ መጠን (ከ11 እስከ 30 ሚ.ሜ)
	ምዕራብና ምስራቅ ሐረርጌ ዞኖች፣ አርሲ እና ምዕራብ አርሲ፣ ሁሉም የሸዋ ዞኖች፣ ባሌ እና ምስራቅ ባሌ፣ ጉጂ እና ምዕራብ ጉጂ፣ ቦረና እና ቦረና ምስራቅ ዞኖች	ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን (ከ11-29 ሚ.ሜ)
አማራ	የሰሜን፣ ምዕራብ፣ መካከለኛው እና ደቡብ ጎንደር፣ የባህርዳር ዙሪያ፣ የአዊ፣ የሰሜን፣ ምዕራብ እና ምስራቅ ጎጃም፣	መካከለኛ መጠን (ከ11 እስከ 29 ሚ.ሜ)
	የዋግ ህምራ፣ የሰሜን ሸዋ ዞኖች፣ የሰሜን እና ደቡብ ወሎ ዞኖች	ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን (ከ11 እስከ 29 ሚ.ሜ)
ትግራይ	የምዕራብ፣ የሰሜን ምዕራብ፣ የመካከለኛው፣ የደቡብ ምስራቅ እና የደቡብ ትግራይ ዞኖች	ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን (ከ11 እስከ 29 ሚ.ሜ)
ቤንሻንጉል ጉምዝ	የካማሺ፣ መተከል፣ አሶሳ፣ ማኦ ኮሞ ዞኖች	ከመካከለኛ እስከ ከባድ መጠን (ከ11 እስከ 30 ሚ.ሜ)
ጋምቤላ	የአኝዋክ፣ መሻጥንግ፣ የኑዌር እና የኢታንግ ልዩ ወረዳ	ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን (ከ11 እስከ 29 ሚ.ሜ)
አፋር	የማሂ፣ ሀሪ፣ ቅልበቲ፣ ፈንቲ፣ ሀውሲ እና ጋቢ ዞኖች	ቀላል መጠን (ከ1-10 ሚ.ሜ)
ማዕከላዊ ኢትዮጵያ	ጉራጌ፣ ምስራቅ ጉራጌ፣ ስልጤ፣ ሀዲያ፣ ከምባታ፣ ሀላባ፣ የም፣ ጠምባሮ ልዩ ወረዳ፣ ቀቤና ልዩ ወረዳ፣ ማረቆ ልዩ ወረዳ	ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን (ከ11 እስከ 29 ሚ.ሜ)
ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ	የከፋ፣ ኮንታ፣ ዳውሮ፣ ቤንሻ ሸኮ፣ ሸካ እና ምዕራብ ኦሞ	ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን (ከ11 እስከ 29 ሚ.ሜ)
ደቡብ ኢትዮጵያ	የወላይታ፣ ጎፋ፣ ጋሞ፣ ጌድዮ፣ ባስኬቶ፣ አሪ፣ ኮንሶ፣ ቡርጂ፣ አሌ፣ ጋርዱላ፣ ኮሬ እና ደቡብ ኦሞ ዞኖች	ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን (ከ11 እስከ 29 ሚ.ሜ)

በኢትዮጵያ የሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎርሎጂ ትንበያ፡



ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

ሲዳማ ክልል	ሁሉም የክልሉ ዞኖች	መካከለኛ መጠን (ከ11 እስከ 29 ሚ.ሜ)
አዲስ አበባ፣ ድሬዳዋ እና ሐረሪ		ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን (ከ11 እስከ 29 ሚ.ሜ)
ሶማሌ	ሲቲ እና ፋፈን ዞኖች	ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን (ከ11 እስከ 29 ሚ.ሜ)
	የኤረር፣ ጃረር፣ ነጎብ፣ ቆራሂ እና ዳዋ፣ ዞኖች	ቀላል መጠን (ከ1-10 ሚ.ሜ)

2.2 እ.ኤ.አ ከኦክቶበር 1 እስከ 10/2025 የሚኖረው የአየር ሁኔታ

አዝማሚያ

በመደበኛ ሁኔታ በኦክቶበር የመጀመሪያው አሥር ቀናት የክረምት ድንበር (ITCZ) ወደ ደቡብ አቅጣጫ ከሚያደርገው እንቅስቃሴ ጋር ተያይዞ ዝናብ ሰጭ የሚቴዎርሎጂ ገጽታዎች በደቡብ የሀገሪቱ አጋማሽ ላይ እየተጠናከሩ ይሄዳሉ፡፡ ስለሆነም የደቡብ እና የደቡብ ምሥራቅ ኢትዮጵያ በተጠናከረ ሁኔታ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸውን የሚያገኙ ሲሆን፣ በተመሳሳይ ሁኔታም በምዕራብ እና በደቡብ ምዕራብ ዝናቡ ቀጣይነት ይኖረዋል፡፡

በሚቀጥሉት የኦክቶበር የመጀመሪያው አሥር ቀናት አሁን ከሚታዩትና በቀጣይነትም የተተነበዩት የትንበያ መረጃዎች እንደሚያሳዩት ዝናብ ሰጭ የአየር ሁኔታ ክስተቶች በአብዛኛው በደቡብ፣ ምስራቅ፣ ደቡብ ምዕራብና በምዕራብ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ የተሻለ ገጽታ ይኖራቸዋል፡፡ በመሆኑም በጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው በሆኑት የቦረናና ጉጂ ዞኖች፣ የሲዳማ ክልል ዞኖች፣ የሶማሌ ክልል ደቡባዊ ዞኖች እና የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ደቡባዊ ዞኖች ላይ ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን ያለው ዝናብ እንደሚኖራቸው አሃዛዊ የትንበያ መረጃዎች ይጠቁማሉ፡፡ በተጨማሪም ቀደም ብሎ የጀመረው የክረምት ወቅት ዝናብ በምዕራብ፣ በደቡብ ምዕራብ፣ በመካከለኛው እንዲሁም በምስራቅ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ ቀጣይነት እንደሚኖር አሃዛዊ የትንበያ መረጃዎች ይጠቁማሉ፡፡

2.3 እ.አ.አ ከሴፕቴምበር 21 እስከ 30/2025 የሚኖረው የአየር ሁኔታ በግብርናው ሥራ እንቅስቃሴ ላይ ሊያሳድር የሚችለው ተፅዕኖ

በሚቀጥሉት አሥር ቀናት በደቡብ ምዕራብ፣ በምዕራብ፣ በሰሜን ምዕራብ እንዲሁም በመካከለኛው የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን ያለው እርጥበት ይኖራቸዋል፡፡ ይህም የሚጠበቀው እርጥበት ለወቅቱ የግብርና ስራ እንቅስቃሴ በአመዛኙ አዎንታዊ ሚና የሚኖረው ቢሆንም፤ ተያያዥ ስጋቶችን ለመቀነስና የሚኖሩትን መልካም አጋጣሚዎች በላቀ ሁኔታ ለመጠቀም የቀረቡትን ቦታ ተኮር የግብርና ሚቴዎርሎጂ ምክረ ሀሳቦች በሁሉም ደረጃ በተገቢው ሁኔታ መተግበር ያስፈልጋል፡፡

ሠንጠረዥ 2፡ በሚቀጥሉት አስር ቀናት የሚኖረው የእርጥበት ሁኔታ በግብርናው እንቅስቃሴ ላይ

ዞኖች	የእርጥበት ሁኔታ	አዎንታዊ ተጽዕኖ	አሉታዊ ተጽዕኖ	የተሰጠ ምክረ ሃሳብ
የክረምት እርጥበት ተጠቃሚ የመኸር አምራች ዞኖች				
ቄለም ወለጋ፣ ምዕራብ ወለጋ፣ ምስራቅ ወለጋ፣ ሆሮ ጉድሩ ወለጋ፣ ኢሉባቦር፣ ቡኖ በደሌ፣ ጅማ፣ የካማሺ፣ መተከል፣ አሶሳ፣ ማኦ ኮሞ ዞኖች፣ የሰሜን፣ ምዕራብ፣ መካከለኛው እና ደቡብ ጎንደር፣ የባህርዳር ዙሪያ፣ የአዊ፣ የሰሜን፣ ምዕራብ እና ምስራቅ ጎጃም	ከመካከለኛ እስከ ከባድ መጠን ያለው እርጥበት	• የአፈር ውስጥ እርጥበት መሻሻል • ለረጅምና መካከለኛ ጊዜ ሰብሎች ፍሬ ለማፍራት • ዘግይተው ተዘርተው በተለያዩ የዕድገት ደረጃ ላይ ላሉ ሰብሎች እድገት • ለቋሚ ተክሎችና ለግጦሽ ሳር ዕድገት የመጠጥ ውሃ አቅርቦት መሻሻል	• በሰብሎች ላይ የውሃ መተኛት የፀረ ሰብል ተባይ መከሰት	• የውሃ ማንጣፈፍያ እና የጎርፍ መቀልበሻ ቦቶችን በመጠቀም ትርፍ ውሀን ከማሳ ላይ ማሰገድ - ፀረ-ተባይ ኬሚካሎችን - ከግብርና ባለሙያ ጋር በመመካከር የአየር ሁኔታ ምቹነትን ባገናዘበ

በኢትዮጵያ የሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎርሎጂ ትንበያ፡



ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

				ሁኔታ ተግባራዊ ማድረግ
የዋግ ህምራ፣ የሰሜን ሸዋ ዞኖች፣ የሰሜን እና ደቡብ ወሎ ዞኖች፣ የምዕራብ፣ የሰሜን ምዕራብ፣ የመካከለኛው፣ የደቡብ ምስራቅ እና ደቡብ ትግራይ ዞኖች፣ የአኝዋክ፣ መሻንግ፣ የኑዌር እና የኢታንግ ልዩ ወረዳ፣ የከፋ፣ ኮንታ፣ ዳውሮ፣ ቤንች ሸኮ፣ ሸካ እና ምዕራብ አሞ	ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን ያለው እርጥበት	• የአፈር ውስጥ እርጥበት መሻሻል • ለረጅምና መካከለኛ ጊዜ ሰብሎች ፍሪ ለማፍራት • ለቋሚ ተክሎችና እድገት	• የፀረ ሰብል ተባይ መከሰት	• የሚገኘውን እርጥበት በአግባቡ መጠቀም • ፀረ-ተባይ ኬሚካሎችን ከግብርና ባለሙያ ጋር በመመካከር የአየር ሁኔታ ምቹነትን ባገናዘበ ሁኔታ ተግባራዊ ማድረግ

በልግ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸውና የመኸር አብቃይ የሆኑ ዞኖች

ሁሉም የሸዋ ዞኖች፣ አርሲ እና ምዕራብ አርሲ፣ ምዕራብና ምስራቅ ሐረርጌ፣ ባሌ፣ ጉራጌ፣ ምስራቅ ጉራጌ፣ ስልጤ፣ ሀዲያ፣ ከምባታ፣ ሀላባ፣ የም፣ ጠምባሮ ልዩ ወረዳ፣ ቀቤና ልዩ ወረዳ፣ ማረቆ ልዩ ወረዳ የሲዳማ ሁሉም የክልሉ ዞኖች፣ ሲቲ እና ፋፈን ዞኖች፣ አዲስ አበባ፣ ድሬዳዋ እና ሐረሪ	• ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን ያለው እርጥበት	• ለመካከለኛ ጊዜ ሰብሎች እድገት • ለቋሚ ተክሎችና ለግጦሽ ሳር ዕድገት • ለእንስሳት መኖርና የመጠጥ ውሃ አቅርቦት መሻሻል	• የፀረ ሰብል ተባይ መከሰት	• የሚገኘውን እርጥበት በአግባቡ መጠቀም • ፀረ-አረምና ፀረ-ተባይ ኬሚካሎችን ከግብርና ባለሙያ ጋር በመመካከር መተግበር
---	--	---	--	---

በልግ ዋነኛ የዝናብ ወቅታቸው የሆኑ ዞኖች

ምስራቅ ባሌ፣ ጉጂ እና ምዕራብ ጉጂ፣ ቦረና እና ቦረና ምስራቅ ዞኖች የወላይታ፣ ጎፋ፣ ጋሞ፣ ጌድዮ፣ እና ባስኬቶ፣ የኤረር፣ ጃረር፣ ነጎብ፣ ቆራሂ እና ዳዋ፣ ዞኖች	ቀላል መጠን ያለው እርጥበት	• የዝናብ ውሃ ለማሰባሰብና ለማጠራቀም ለእንስሳት መኖርና የመጠጥ ውሃ አቅርቦት	• ከፍተኛ ትነት መኖር የአፈር ውስጥ እርጥበት መጠነኛ መሆን	የዝናብ ውሃን በማሰባሰብ በደረቅ ሰሞናት ተግባር ላይ ማዋል
---	-------------------	--	--	---------------------------------------

2.4 እ.ኤ.አ ከሴፕቴምበር 21 እስከ 30/2025 የሚኖረው የአየር ሁኔታ

በውሃ ዘርፍ ላይ ሊያሳድር የሚችለው ተፅዕኖ

በቀጣይ የሴፕቴምበር ሁለተኛ አስር ቀናት በአብዛኛዎቹ ተፋሰሶች ላይ ከመጠነኛ እስከ ከፍተኛ መጠን ያለው የገፀ ምድር የውሃ ፍሰት ይጠበቃል። ሆኖም የመስከረም ወር የክረምቱ ወቅት ማብቂያ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ በቀጣይ ወቅት የገፀ ምድር ውሃ ፍሰት በሚቀንስባቸውና ውሃ አጠር በሆኑ ቦታዎች ላይ የሚመለከታቸው የዘርፉ አካላት ሊኖር የሚችለው መልካም ዕድሎችን በላቀ ሁኔታ ጥቅም ላይ ለማዋልም ሆነ ተያያዥ አለታዊ ተጽኖዎችን ለመቀነስ የሚከተሉትን ተፋሰስ ተኮር የውሃ ሚቴዎርሎጂ ምክረ ሀሳቦች በየደረጃው መተግበር ያስፈልጋል፡፡

ሠንጠረዥ 3፡ በሚቀጥሉት አስር ቀናት የሚኖረው የእርጥበት ሁኔታ በውሃ ዘር ላይ

ሊኖር የሚችለው ተጽዕኖ

የውኃ ተፋሰሶች	የገጸ ምድር የውሃ ሽፋን	አዎንታዊ ተጽዕኖ	አሉታዊ ተጽዕኖ	የውኃ ሚቴዎርሎጂ ምክረ ሀሳብ
የአባይ፣ የባሮ አኮቦና የአሞ ጊቤ ተፋሰስ	ከመካከለኛ እስከ ከፍተኛ እርጥበት	- የመጠጥ ውኃ አቅርቦት ሽፋን መጨመር - የመስኖም ሆነ የሃይል ማመንጫ ግድቦች ውኃ መጠን መጨመር - የገፀ ምድር የውሃ ፍሰት መጨመር የክርስ ምድር የውኃ መጠን መሻሻል	- የወንዞች መሙላት - በውሃ መያዣዎች ላይ የደለል ስጋት መጨመር - የፍሳሽ መውረጃዎች በደለል እንዲሁም በጠጣር ቆሻሻ መዘጋት	- የጎርፈ መቀለበሻ ቦቶችን ማዘጋጀት - ፍሳሽ ሊዘጉ የሚችሉ ቆሻሻዎች በተገቢ ሁኔታ ማስወገድ - የጎርፍ መውረጃዎች ቦቶችን ማፅዳት - ወራጅ ውኃን በእግርም ሆነ በቀላል ተሽከርካሪ ለማቋረጥ አለመሞከር የዝናብ ውኃ ማሰባሰብና ማጠራቀም
በአብዛኛው ባሮ አኮቦ፣ ገናሌ ዳዋ፣ ዋቤ ሸበሌ፣ በታችኛው አሞ ጊቤና አዋሽ ተፋሰስ	ከቀላል እስከ መካከለኛ እርጥበት	- የጎርፍ ሆነ የደለል ስጋት መቀነስ - በከፍተኛ ሁኔታ የሙሉ ግድቦች ላይ የነበረው ጫና መቀነስ	- ዝቅተኛ የውሀ ፍሰት - እርጥበት አጠር በሆኑ አካባቢዎች የውሃ አጥረት - ከፍተኛ ትነት	- የሚገኘው መጠነኛ የዝናብ ውሃ ከጣራ እና ከመሬት ወለል በተግቢ ሁኔታ ማሰባሰብ - የውሀ ሀብትን በእግባቡ መጠቀም - የሚገኘውን መጠነኛ የዝናብ ውሀ ከብክነት እና ከብክለት በመከላከል
የዋቤ ሸበሌ ተፋሰስ	ቀላል መጠን	የጎርፍ ስጋት አለመኖር		