



በኢትዮጵያ የሚቴዎሮሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎሮሎጂ ትንበያ፣
ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ



ከሴፕቴምበር 21-30/2025 የነበረው የአየር ሁኔታ ግምገማ
እንዲሁም

ከኦክቶበር 1-10/2025 እና ከኦክቶበር 11-20/2025

የሚኖረው የአየር ሁኔታ ትንበያ እና ምክረ ሃሳብ

ኦክቶበር 2025

አዲስ አበባ


1. እ.ኤ.አ ከሴፕቴምበር 21 እስከ 30/2025 የነበረው የአየር ሁኔታ

ባለፉት የሴፕቴምበር አስር ቀናት በደቡብ ምዕራብ፣ ምዕራብ፣ ሰሜን ምዕራብ፣ መካከለኛው እና ምስራቅ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ የተሻለ የደመና ሽፋን እና ክምችት ነበራቸው፡፡ ከዚህ ጋር ተያይዞ በተለይም በመጀመሪያዎቹ ቀናቶች ላይ በምዕራብ፣ ደቡብ ምዕራብ እና መካከለኛው የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ ከመካከለኛ እስከ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ተመዝግቧል፡፡ በ24 ሰዓት ውስጥ ከ30 ሚ.ሜ በላይ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ከተመዘገበባቸው የሚቴዎርሎጂ ጣቢያዎች መካከል አዲስ አበባ 32.4፣ አርባምንጭ 63.7፣ ባህር ዳር 41፣ ጎሬ 35.7፣ ነቀምት 67፣ አቦምሳ 35.2፣ አደዋ 34፣ አይራ 35.5፣ አማን 30.8፣ አንገር ጉጉን 32.4፣ አሶሳ 36፣ አዋሽ አርባ 30፣ ቡለን 34.2፣ 30.5፣ ቻግኒ 30፣ 31.6፣ 37.6፣ ጭራ 42.4፣ ዳንግላ 31.5፣ ጋምቤላ 30.7፣ ጋቲራ 31.7፣ ጊዳ አያና 32.9፣ ጊምቢ 55.1፣ ጂንካ 41.7፣ ካቺሴ 38፣ 56፣ ምዕራብ አባያ 39፣ ፓዌ 39.4፣ ሽሬ 33.7፣ ወራቤ 33.7፣ ባቱ 33፣ ኦሶ ሞሪንጋ 39.8፣ 45.2፣ አዲስ ዘመን 42፣ አዲ አርቃይ 30.1፣ 30፣ አለታ ወንዶ 30.8፣ አሮርሳ 32.2፣ ቢላም ቢሎ 39.6፣ 37፣ መንደር ሰባት 30.7፣ ዳራ ማሎ 30፣ 30፣ 30.2፣ ሃራ 30፣ 30.4፣ ቅዳሜ ገበያ 56.6፣ ኮበን 43፣ ቁሉቢ 57.7፣ ኩረፋ ጨሌ 31.5፣ ላንጌ 30፣ ሙጊ 33.1፣ አንጋ 33.7፣ 34.8፣ ዪና 36.5፣ ይርጋልም 36.5፣ መንደር 11 35፣ ሲቦ 42፣ እንዲሁም አዳሚ ቱሉ 32፣ 38.2 ሚ.ሜ የሚደርስ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ተመዝግቦባቸዋል፡፡ በአጠቃላይ ባለፉት አስር ቀናት በ47 የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ በ24 ሰዓት ውስጥ ከ30 ሚ.ሜ በላይ የሆነ ከባድ መጠን ያለው የዝናብ መጠን ነበራቸው (ምስል 1)፡፡ በተጨማሪም በአንዳንድ የክረምት ዝናብ ተጠቃሚ በሆኑ የምዕራብ፣ የደቡብ ምዕራብና የምስራቅ የሀገሪቱ አካባቢዎች፣ እንዲሁም በጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው በሆኑት በደቡብ ኢትዮጵያ አካባቢዎች ላይ በ24 ሰዓት ውስጥ 39.6 - 67 ሚ.ሜ የሚደርስ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ተመዝግቧል፡፡ ከ40 ሚ.ሜ በላይ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ከተመዘገበባቸው የሀገሪቱ አካባቢዎች መካከል ነቀምት፣ አርባ ምንጭ፣ ቁሉቢ፣ ቅዳሜ ገበያ፣ ካቺሴ፣ ጊምቢ፣ ኦሶ ሞሪንጋ፣ ኮበን፣ ጭራ፣ አዲስ ዘመን፣ ሲቦ፣ ጂንካ፣ እና ባህር ዳር ይገኙበታል (ምስል 1)፡፡

በኢትዮጵያ የሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎርሎጂ ትንበያ፡




ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ




ምስል:1 ከሴፕቴምበር 21-30 በ24 ሰዓት ውስጥ ከ40 ሚ.ሜ በላይ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ

ባለፉት አስር ቀናት የዘነበው የዝናብ መጠን ከሀገሪቱ ቦታ ሽፋን አንፃር ሲገመገም፤ ከአሮሚያ ክልል የቀለም ወለጋ፣ ምዕራብ ወለጋ፣ ምስራቅ ወለጋ፣ ሆሮ ጉድፋ ወለጋ፣ ኢሉባቦር፣ ቡኖ በደሌ፣ ጅማ፣ ከአማራ ክልል የሰሜን፣ መካከለኛው፣ ምዕራብና ደቡብ ጎንደር ዞኖች፣ ሰሜን፣ ምስራቅና ምዕራብ ጎጃም፣ የባህር ዳር ዙሪያ፣ የአዊ፣ ዞኖች፣ ከቤንሻንጉል ጉምዝ ካማሺ፣ መተከል፣ አሶሳ፣ማኦ ኮሞ ዞኖች፣ ከትግራይ ክልል የምዕራብ፣ የሰሜን እና ምዕራብ ትግራይ ዞኖች፣ ከደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል ኮንታ፣ ዳዉሮ፣ ከፋ፣ ሸካ፣ ቤንሻ ሸኮ ዞኖች፣ ከማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ጉራጌ፣ ምስራቅ ጉራጌ፣ የሀዲያ፣ ስልጤ፣ የከንባታ፣ የሃላባ፣ የም ዞኖች፣ ቀቤና፣ ማረቆ፣ ጠምባሮ ልዩ ወረዳ፣ ከደቡብ ኢትዮጵያ ክልል የጎፋ፣ ጋሞ ወላይታ፣ጊዲዮ ና ባስኬቶ ዞኖች፣ ላይ ከ51-290 ሚ.ሜ የሚደርስ ዝናብ ከ5-10 ቀናት ያህል ዝናብ ነበራቸው (ካርታ 1 እና 2)። በተጨማሪም የሰሜን፣ ምዕራብ፣ መካከለኛና ምስራቅ ሸዋ ዞኖች፣የምዕራብ አርሲ፣ አርሲ፣ ምስራቅ ባሌ፣ ባሌ፣ የምስራቅ ሸዋ፣ ምዕራብ ሀረርጌ ዞኖች፣ የዋግ ህምራ፣ የሰሜንና የደቡብ ወሎ፣ የሰሜን ሸዋ ወሎ፣የመካከለኛውና የደቡብ ምስራቅ ትግራይ ዞኖች፣ ከጋምቤላ ክልል አኝዋክ፣ መሻጥንግ፣ የኑዌር እና የኢታንግ ልዩ ወረዳ፣ ከአፋር ክልል የቀልበቲ፣ ሃሪ፣ የጋቢ_ፋንቲ፣ አዉሲና ማሂ ዞኖች፣ ከሱማሌ ክልል የሲቲ፣ የኤረር፣ ነጎብ፣ አፍዴር፣ እና የሊቦን ዞኖች፣አዲስ አበባ፣ ድሬዳዋ እና ሐረሪ ላይ ከ11-50 ሚ.ሜ የሚደርስ ዝናብ ከ2-6 ቀናት ያህል ዝናብ ነበራቸው (ካርታ 1 እና 2)።



ካርታ 1 እ.ኤ.አ ከሴፕቴምበር 21 እስከ 30/2025 ድረስ የነበረው የዝናብ መጠን በሚ.ሜ




ካርታ 2 እ.ኤ.አ ከሴፕቴምበር 21 እስከ 30/2025 ድረስ ዝናብ የዘነበባቸው ቀናት

በኢትዮጵያ የሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎርሎጂ ትንበያ፡

ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

ባለፉት አስር ቀናት የዘነበዉ የዝናብ መጠን ከመደበኛዉ ጋር ሲነፃፀር ከአሮሚያ ክልል የቁለም ወለጋ፣ ምዕራብ ወለጋ፣ ምስራቅ ወለጋ፣ ሆሮ ጉድፋ ወለጋ፣ ኢሉባቦር፣ ቡኖ በደሌ፣ ጅማ፣ ሰሜን፣ ምዕራብ፣ መካከለኛና ምስራቅ ሸዋ ዞኖች፣ የምዕራብ አርሲ፣ አርሲ፣ ምስራቅ ባሌ፣ ባሌ፣ የምስራቅ ሸዋ፣ ምዕራብ ሀረርጌ ዞኖች፣ ከአማራ ክልል የሰሜን፣ መካከለኛዉ፣ ምዕራብና ደቡብ ጎንደር ዞኖች፣ ሰሜን፣ ምስራቅና ምዕራብ ጎጃም፣ የባህርዳር ዙሪያ፣ የአዊ፣ የዋግ ህምራ፣ የሰሜን ወሎና የደቡብ ወሎ እና የሰሜን ሸዋ ዞኖች፣ ከቤንሻንጉል ጉምዝ ካማሺ፣ መተከል፣ አሶሳጣኦ ኮሞ ዞኖች፣ ከትግራይ ክልል የምዕራብ፣ የሰሜን፣ ምዕራብ የመካከለኛዉ፣ የደቡብ ምስራቅና የደቡብ ትግራይ ዞኖች፣ ከጋምቤላ ክልል አኝዋክ፣ መሻጉንግ፣ የኑዌር እና የኢታንግ ልዩ ወረዳ፣ ከደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል ኮንታ፣ ዳዉሮ፣ ከፋ፣ ሸካ፣ ቤንች ሸኮ ዞኖች፣ ከማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ጉራጌ፣ ምስራቅ ጉራጌ፣ የሀዲያ፣ ስልጤ፣ የከንባታ፣ የሃላባ፣ የም ዞኖች፣ ቀቤና፣ ማረቆ፣ ጠምባሮ ልዩ ወረዳ፣ ከደቡብ ኢትዮጵያ ክልል የጎፋና ባስኬቶ ዞኖች፣ ከአፋር ክልል የቀልበቲ፣ ሃሪ፣ የጋቢ፣ ፋንቲ፣ አዉሲና ማሂ ዞኖች፣ ከሱማሌ ክልል የሲቲ፣ ፋፈን፣ ጃረር፣ የኤረር፣ ነጎብ፣ አፍዴር፣ ዳዋ፣ እና የሊበን ዞኖች፣ አዲስ አበባ፣ ድሬዳዋ እና ሐረሪ ላይ በአብዛኛዉ መደበኛና ከመደበኛዉ በላይ የሆነ የዝናብ መጠን ተመዝግቧል (ካርታ 3) ፡፡




ካርታ 3 እ.ኤ.አ ከሴፕቴምበር 21 እስከ 30/2025 የነበረዉ የዝናብ መጠን ከመደበኛዉ ጋር ሲነፃፀር

1.2 እ.ኤ.አ ከሴፕቴምበር 21 እስከ 30/2025 የነበረው የአየር ሁኔታ

በግብርና ሥራ እንቅስቃሴ ላይ ያሳደረው ተፅዕኖ

ባሳለፍነው አስር ቀናት በምዕራብ አጋማሽ፣ ደቡብ ምዕራብ እና በመካከለኛው የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ የተሻለ የእርጥበት ሁኔታ ነበራቸው፡፡ ይህም ሁኔታ የአፈር ውስጥ እርጥበትን ከማሻሻል ጋር ተያይዞ ቀደም ሲል ተዘርተው በተለያዩ የእድገት ደረጃና ፍሬ በመመላለሱ ላይ ለሚኖሩት እንደ ማሽላና በቆሎ ለመሳሰሉት የረጅም ጊዜ ሰብሎች፣ ፍሬ በማፍራትና በማበብ ላይ ባሉት የመካከለኛና የአጭር ጊዜ ሰብሎች፣ ለቋሚ ተክሎች፣ ለፍራፍሬዎችና ለጓሮ አትክልቶች የውሃ ፍላጎታቸውን ከማሟላት አንጻር ከፍተኛ ጠቀሜታ ነበረው፡፡ በሌላ በኩል እርጥበቱ በዚህ ወቅት ከምስራቅ እና ከሰሜን ምስራቅ አካባቢዎች ላይ በመጠንም ሆነ በስርጭት ረገድ ቀስ በቀስ የሚቀንስበት ጊዜ ቢሆንም በምስራቅ እና አጎራባች በሆኑ የአፋር አካባቢዎች ላይ የተለያዩ መጠን ያለው እርጥበት በማግኘታቸው ለአርብቶ አደርና ከፊል አርብቶ አደር አካባቢዎች የተሻለ የግጦሽ ሳርና የመጠጥ ውሃ አቅርቦት እንዲኖራቸው ያስቻለ ነበረ፡፡ በተመሳሳይ ሁኔታ በጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው በሆኑት ደቡባዊ ክፍል እየተስፋፋ ያለው እርጥበት በአካባቢው ለሚካሄደው የእርሻ ስራ እንቅስቃሴ እና ለአርብቶ አደሮችና ከፊል አርብቶ አደሮች የግጦሽ ሳርና የመጠጥ ውሃ አቅርቦትን ከማሻሻል አንጻር በጎ ሚና ነበረው (ካርታ 4) ፡፡



ካርታ 4 እ.ኤ.አ ከሴፕቴምበር 21 እስከ 30/2025


ድረስ የነበረው የእርጥበት ሁኔታ

በኢትዮጵያ የሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎርሎጂ ትንበያ፤

ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

1.3 እ.ኤ.አ ከሴፕቴምበር 21 እስከ 3/2025 የነበረው የአየር ሁኔታ በውሃው ዘርፍ ላይ ያሳደረው ተፅዕኖ

ባሳለፍነው የሴፕቴምበር ሶስተኛ አስር ቀናት በአባይ፣ በአሞ ጊቤ፣ በባሮ አካባቢ፣ በስምጥ ሸለቆ፣ በአብዛኛው ተከቤ፣ አይሻ፣ መረብ ጋሽ፣ አዋሽ፣ በላይኛውና መካከለኛው ዋቤ ሸበሌ እንዲሁም ገናሌ ዳዋ ተፋሰሶች ላይ ከመጠነኛ እስከ በጣም ከፍተኛ የሆነ የገጸ ምድር የውሀ ፍሰት ነበራቸው። በተጨማሪም በጥቂት የተከቤ፣ የአዋሽ፣ የመካከለኛው ዋቤ ሸበሌና ገናሌ ዳዋ ተፋሰሶች መጠነኛ የሆነ የገጸ ምድር የውሃ ፍሰት እንዲኖራቸው ያስቻለ ነበር። በአጠቃላይ ባለፉት ቀናት የነበረው የገጸ ምድርም ሆነ የክርስ ምድር የውሃ ፍሰት የተሻለ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ወደ ግድቦችና የተለያዩ የውሃ ማጠራቀሚያዎች የገባው የውሃ መጠን ጨምሯል። ስለሆነም ለሀይል ማመንጫነትም ሆነ ለመስኖነት ለሚያገለግሉ ግድቦች የተሻለ የውሃ ግብዓት እንደነበረ የተተነተኑ የውሃ ሚቴዎርሎጂ መረጃዎች ያመለክታሉ (ካርታ 5) ።



ካርታ 5 እ.ኤ.አ ከሴፕቴምበር 21 እስከ 30/2025

ድረስ የነበረው የአርጥበት ሁኔታ

2. መግቢያ

የበጋ ወቅት ከአክቶበር እስከ ጃንዋሪ ያሉትን ወራት የሚያካትት ሲሆን፤ ለደቡብና ደቡብ ምሥራቅ የሀገሪቱ አካባቢዎች ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው ነው። የበጋ ወቅት ከዓመታዊ የዝናብ መጠኑ እስከ 45% የሚደረሰውን የሚሸፍን ሲሆን ከበልግ ቀጥሎ የተሻለ ዝናብ የሚኖርበት ወቅት ነው። በወቅቱ ከሚኖረው የዝናብ መጠን ከፍተኛውን ድርሻ የሚይዘው በአክቶበር እና በመጀመሪያዎቹ በኖቬምበር አስር ቀናት የሚጥለው ዝናብ ነው። በዚህ ወቅት ከፍተኛ መጠን ያለው የዝናብ መጠን የሚኖረው በደቡብ እና በደቡብ ምስራቅ አካባቢዎች ላይ ነው። በመደበኛ ሁኔታ በሀገሪቱ ደቡባዊ አጋማሽ ላይ የበጋ ወቅት ዝናብ ከአክቶበር መጀመሪያዎቹ ቀናቶች ጀምሮ መዝነብ ይጀምራል። በመደበኛ ሁኔታ በአክቶበር የመጀመሪያዉ አሥር ቀናት የክረምት ድንበር (ITCZ) ወደ ደቡብ አቅጣጫ ከሚያደርገው እንቅስቃሴ ጋር ተያይዞ ዝናብ ሰጭ የሚቴዎርሎጂ ገጽታዎች በደቡብ የሀገሪቱ አጋማሽ ላይ እየተጠናከሩ ይሄዳሉ። ስለሆነም የደቡብ እና የደቡብ ምሥራቅ ኢትዮጵያ በተጠናከረ ሁኔታ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸውን የሚያገኙ ሲሆን፤ በተመሳሳይ ሁኔታም በምዕራብ እና በደቡብ ምዕራብ ዝናቡ ቀጣይነት ይኖረዋል።

2.1 እ.ኤ.አ ከአክቶበር 1 እስከ 10/2025 የሚኖረው የአየር ሁኔታ ትንበያ


በመጨረሻ የአክቶበር የመጀመሪያዉ አሥር ቀናት አሁን ከሚታዩትና በቀጣይነትም ከተተነበዩት የትንበያ መረጃዎች እንደሚያሳዩት ዝናብ ሰጭ የአየር ሁኔታ ክስተቶች በደቡብ፣ በምስራቅ፣ በደቡብ ምዕራብና በምዕራብ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ የተሻለ ገጽታ ይኖራቸዋል። በመሆኑም በጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው በሆኑት የጉጂ፣ ምስራቅ ጉጂ፣ ምስራቅ ቦረና ዞኖች፣ የሲዳማ ክልል ዞኖች፣ የሶማሌ ክልል ደቡባዊ ዞኖች እና የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ዞኖች ላይ ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን ያለው ዝናብ እንደሚኖራቸው አሃዛዊ የትንበያ መረጃዎች ይጠቁማሉ (ካርታ 6 እና 7)። በተጨማሪም ቀደም ብሎ የክረምት ወቅት ዝናብ ሲያገኙ የነበሩ የምዕራብ፣ ደቡብ ምዕራብ፣ እንዲሁም ምስራቅ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ ቀጣይነት ይኖረዋል። በተጨማሪም በፀጋይ ሀይል ታግዞ ከሚጠናከሩ የደመና ክምችቶች ላይ በመነሳት በምዕራብ፣ በመካከለኛዉ እና ደቡብ ምዕራብ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ አልፎ አልፎ በሚኖሩት ቀናት በ24 ሰዓት ውስጥ ከ30 ሚ.ሜ በላይ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ይኖረቸዋል (ካርታ 6 እና 7)።

በኢትዮጵያ የሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎርሎጂ ትንበያ፡




ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

Total Rainfall (mm) for 01-11 Oct 2025



Exceptional Rainfall for 01-11 Oct 2025



Heavy Rainfall Very Heavy Rainfall Extremely Heavy Rainfall

ካርታ 6 እ.ኤ.አ. ከኦክቶበር 1-10, 2025 የሚኖረው

የዝናብ መጠን በሚ.ሜ

ካርታ 7 እ.ኤ.አ. ከኦክቶበር 1-10, 2025 የሚኖረው

ከፍተኛ የዝናብ መጠን

ሠንጠረዥ 1፡ በሚቀጥሉት አስር ቀናት ዝናብ የሚያገኙ አካባቢዎችና በ24 ሰዓት ውስጥ የሚኖረው የዝናብ መጠን

በጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው የሆኑ ዞኖች

ክልል	ዞን	በ 24 ሰዓት ውስጥ የሚኖረው የዝናብ መጠን
አሮሚያ	ጉጂ፣ ምዕራብ ጉጂ፣ ቦረና፣ ቦረና ምስራቅ ዞኖች	ቀላል መጠን (ከ1-10 ሚ.ሜ)
ሶማሌ	የፋፈን፣ ኤረር፣ ጃረር፣ ነጎብ፣ ዶሎ እና ቆራሂ ዞኖች	ቀላል መጠን (ከ1-10 ሚ.ሜ)
ደቡብ ኢትዮጵያ	ጋሞ፣ ባስኬቶ፣ አሪ፣ ኮንሶ፣ ቡርጂ፣ አሌ፣ ጋርዳላ፣ ኮሬ እና ደቡብ አሞ ዞኖች	ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን (ከ11-29 ሚ.ሜ)
ሲዳማ ክልል	ሁሉም የክልሉ ዞኖች	መካከለኛ መጠን (ከ11 እስከ 29 ሚ.ሜ)
የክረምት ወቅት ዝናብ ተጠቃሚ ዞኖች		
አሮሚያ	የቄለም ወለጋ፣ ምዕራብ ወለጋ፣ ምስራቅ ወለጋ፣ ሆሮ ጉድሩ ወለጋ፣ ኢሉባቦር፣ ቡኖ በደሌ፣ ጅማ፣	መካከለኛ መጠን (ከ11 እስከ 29 ሚ.ሜ)

በኢትዮጵያ የሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎርሎጂ ትንበያ፡



ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

	ምዕራብና ምስራቅ ሐረርጌ ዞኖች፣ አርሲ እና ምዕራብ አርሲ፣ ሁሉም የሸዋ ዞኖች፣ ባሌ እና ምስራቅ ባሌ፣	ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን (ከ11-29 ሚ.ሜ)
አማራ	የሰሜን፣ ምዕራብ፣ መካከለኛው እና ደቡብ ጎንደር፣ የባህርዳር ዙሪያ፣ የአዊ፣ የሰሜን፣ ምዕራብ እና ምስራቅ ጎጃም፣	መካከለኛ መጠን (ከ11 እስከ 29 ሚ.ሜ)
	የዋግ ህምራ፣ የሰሜን ሸዋ ዞኖች፣ የሰሜን እና ደቡብ ወሎ ዞኖች	ቀላል መጠን (ከ1-10 ሚ.ሜ)
ትግራይ	የምዕራብ፣ የሰሜን ምዕራብ፣ የመካከለኛው፣ የደቡብ ምስራቅ እና የደቡብ ትግራይ ዞኖች	ቀላል መጠን (ከ1-10 ሚ.ሜ)
ቤንሻንጉል ጉምዝ	የካማሺ፣ መተከል፣ አሶሳ፣ ማኦ ኮሞ ዞኖች	መካከለኛ መጠን (ከ11 እስከ 29 ሚ.ሜ)
ጋምቤላ	የአኝዋክ፣ መሻጥንግ፣ የኑዌር እና የኢታንግ ልዩ ወረዳ	ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን (ከ11 እስከ 29 ሚ.ሜ)
አፋር	የማሂ፣ ሀሪ፣ ቅልበቲ፣ ፈንቲ፣ ሀውሲ እና ጋቢ ዞኖች	ቀላል መጠን (ከ1-10 ሚ.ሜ)
ማዕከላዊ ኢትዮጵያ	ጉራጌ፣ ምስራቅ ጉራጌ፣ ስልጤ፣ ሀዲያ፣ ከምባታ፣ ሀላባ፣ የም፣ ጠምባሮ ልዩ ወረዳ፣ ቀቤና ልዩ ወረዳ፣ ማረቆ ልዩ ወረዳ	ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን (ከ11 እስከ 29 ሚ.ሜ)
ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ	የከፋ፣ ኮንታ፣ ዳውሮ፣ ቤንች ሸኮ፣ ሸካ እና ምዕራብ አሞ	ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን (ከ11 እስከ 29 ሚ.ሜ)
ደቡብ ኢትዮጵያ	የወላይታ፣ ጎፋ፣ ጌድዮ፣	መካከለኛ መጠን (ከ11 እስከ 29 ሚ.ሜ)
አዲስ አበባ፣ ድሬዳዋ እና ሐረሪ		ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን (ከ11 እስከ 29 ሚ.ሜ)
ሶማሌ	ሸባሌ፣ አፍዴር፣ ዳዋ፣ ሊባን፣ ሲቲ ዞኖች	ቀላል መጠን (ከ1-10 ሚ.ሜ)

2.2 እ.ኤ.አ ከኦክቶበር 11 እስከ 20/2025 የሚኖረው የአየር ሁኔታ አዝማሚያ

በሚቀጥሉት የኦክቶበር ሁለተኛው አሥር ቀናት አሁን ከሚታዩትና በቀጣይነትም የተተነበዩት የትንበያ መረጃዎች እንደሚያሳዩት ዝናብ ሰጭ የአየር ሁኔታ ክስተቶች በደቡብ፣ ደቡብ ምስራቅ፣ ምስራቅ፣ ደቡብ ምዕራብና ምዕራብ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ የተሻለ ገጽታ ይኖራቸዋል። በመሆኑም በጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው በሆኑት የጉጂ፣ ምስራቅ ጉጂ፣ ምስራቅ ቦረና ዞኖች፣ የሲዳማ ክልል ዞኖች፣ የሶማሌ ክልል ደቡባዊ ዞኖች እና የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ዞኖች ላይ ከሚጠናከሩት የሚቴዎርሎጂ ገጽታዎች ላይ በመነሳት ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን ያለው ዝናብ ይኖራቸዋል። በተጨማሪም ቀደም ብሎ የክረምት ወቅትን ዝናብ እያገኙ በነበሩት በምዕራብ፣ በደቡብ ምዕራብ እንዲሁም በምስራቅ ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን ያለው ዝናብ እንደሚኖራቸው አሃዛዊ የትንበያ መረጃዎች ይጠቁማሉ።

2.3 እ.ኤ.አ ከኦክቶበር 1 እስከ 10/2025 የሚኖረው የአየር ሁኔታ በግብርናው ሥራ እንቅስቃሴ ላይ ሊያሳድር የሚችለው ተፅዕኖ

በሚቀጥሉት አሥር ቀናት በምዕራብ፣ በደቡብ ምዕራብ፣ እንዲሁም በምስራቅ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ የሚኖረው የክረምቱ ቀጣይነት ያለው እርጥበት ለወቅቱ የግብርና ስራ እንቅስቃሴ በአመዛኙ አዎንታዊ ሚና ይኖረዋል። እንዲሁም በጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው በሆኑት የጉጂ፣ ምስራቅ ጉጂ፣ ምስራቅ ቦረና፣ የሲዳማ ክልል ዞኖች፣ የሶማሌ ክልል ደቡባዊ ዞኖች እና የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ዞኖች ላይ የሚጠበቀው ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን ያለው እርጥበት በአካባቢው ለሚጀምረው የግብርና እንቅስቃሴ ከፍተኛ ጠቀሜታ ይኖረዋል። በተጨማሪም ተያያዥ ስጋቶችን ለመቀነስና የሚኖሩትን መልካም አጋጣሚዎች በላቀ ሁኔታ ለመጠቀም የቀረቡትን ቦታ ተኮር የግብርና ሚቴዎርሎጂ ምክረ ሀሳቦች በሁሉም ደረጃ በተገቢው ሁኔታ መተግበር ያስፈልጋል።

በኢትዮጵያ የሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎርሎጂ ትንበያ፡



ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

ሠንጠረዥ 2፡ በሚቀጥሉት አስር ቀናት የሚኖረው የእርጥበት ሁኔታ በግብርናው እንቅስቃሴ ላይ

ዞኖች	የእርጥበት ሁኔታ	አዎንታዊ ተጽዕኖ	አሉታዊ ተጽዕኖ	የተሰጠ ምክረ ሃሳብ
የክረምት እርጥበት ተጠቃሚ የመኸር አምራች ዞኖች				
የቄለም ወለጋ፣ ምዕራብ ወለጋ፣ ምስራቅ ወለጋ፣ ሆሮ ጉድሩ ወለጋ፣ ኢሊባቦር፣ ቡኖ በደሌ፣ ጅማ፣ የሰሜን፣ ምዕራብ፣ መካከለኛው እና ደቡብ ጎንደር፣ የባህርዳር ዙሪያ፣ የአዊ፣ የሰሜን፣ ምዕራብ እና ምስራቅ ጎጃም፣ የምዕራብ፣ የሰሜን ምዕራብ፣ የመካከለኛው፣ ትግራይ ዞኖች የካማሺ፣ መተከል፣ አሶሳ፣ ማኦ ኮሞ ዞኖች የአኝዋክ፣ መሸንግ፣ የኑዌር እና የኢታንግ ልዩ ወረዳ የከፋ፣ ኮንታ፣ ዳውሮ፣ ቤንች ሸኮ፣ ሸካ እና ምዕራብ ኦሞ	ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን ያለው እርጥበት	- የጥራጥሬ ሰብሎችን ለመዝራት - ፍሬ በመሙላት ላይ ላሉ ለረጅምና ጊዜ መካከለኛ ሰብሎች እድገት - ዘግይተው ተዘርተው በተለያዩ የእድገት ደረጃ ላይ ላሉ ሰብሎች እድገት - ለቋሚ ተክሎችና ለግጦሽ ሳር ዕድገት - የመጠጥ ውሃ አቅርቦት መግላት	የፀረ ሰብል ተባይ እና የአረም መከሰት	- የጥራጥሬ ሰብሎችን በጊዜ መዝራት - የማሳ ክትተል ማድረግ - ፀረ-ተባይ ኬሚካሎችን ከግብርና ባለሙያ ጋር በመመካከር በተገቢ ቀንና ሰዓት መጠቀም - አረምን ክትተል በማድረግ ማረም
በልግ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸውና የመኸር አብቃይ የሆኑ ዞኖች				
ምዕራብና ምስራቅ ሐረርጌ ዞኖች፣ አርሲ እና ምዕራብ አርሲ፣ ሁሉም የሸዋ ዞኖች፣ ባሌ የዋግ ህምራ፣ የሰሜን ሸዋ ዞኖች፣ የሰሜን እና ደቡብ ወሎ ዞኖች የደቡብ ምስራቅ እና የደቡብ ትግራይ ዞኖች ጉራጌ፣ ምስራቅ ጉራጌ፣ ስልጤ፣ ሀዲያ፣ ከምባታ፣	ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን ያለው እርጥበት	- ለመካከለኛ ጊዜ ሰብሎች እድገት - ለቋሚ ተክሎችና ለግጦሽ ሳር ዕድገት - ለእንስሳት መኖር የመጠጥ ውሃ አቅርቦት መሻሻል	የፀረ ሰብል ተባይ እና የአረም መከሰት	- የሚገኘውን እርጥበት በአግባቡ መጠቀም - ፀረ-አረምና ፀረ-ተባይ ኬሚካሎችን ከግብርና ባለሙያ

በኢትዮጵያ የሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎርሎጂ ትንበያ፡



ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

ሀሳብ፡ የም፡ ጠምባሮ ልዩ ወረዳ፡ ቀቤና ልዩ ወረዳ፡ ማረቆ ልዩ ወረዳ የሲዳማ ሁሉም የክልሉ ዞኖች ከሱማሌ የፋፈን ሲቲ እና ኤረር ዞኖች አዲስ አበባ፡ ድሬዳዋ እና ሐረሪ				ጋር በመመካከር መተግበር
የማሂ፡ ሀሪ፡ ቅልበቲ፡ ፈንቲ፡ ሀውሲ እና ጋቢ ዞኖች	ቀላል መጠን ያለው እርጥበት	• የእንስሳት መኖርና የመጠጥ ውሃ አቅርቦት በመጠኑ መሻሻል	• የአፈር ዉስጥ እርጥበት መጠነኛ መሆን	• የሚገኘውን እርጥበት በአግባቡ መጠቀም
በጋ ሁለተኛ የዝናብ የዝናብ ወቅታቸው የሆኑ ዞኖች				
ጉጂ እና ምዕራብ ጉጂ፡ ቦረና እና ምስራቅ ቦረና ዞኖች የወላይታ፡ ጎፋ፡ ጋሞ፡ ጌድዮ፡ ባስኬቶ፡ አሪ፡ ኮንሶ፡ ቡርጂ፡ አሌ፡ ጋርዳላ፡ ኮሬ እና ደቡብ ኦሞ ዞኖች ከሱማሌ ጃረር፡ ነጎብ፡ ዶሎ ሸበሌ፡ አፍዴር፡ ዳዋ፡ ሊቦን፡ እና ቆራሂ ዞኖች	ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን ያለው እርጥበት	• የዝናብ ውሃ ለማሰባሰብና ለማጠራቀም • ለእንስሳት መኖርና የመጠጥ ውሃ አቅርቦት መሻሻል	• ከፍተኛ ትነት መኖር • የአፈር ዉስጥ እርጥበት መጠነኛ መሆን	• የዝናብ ውሀን በማሰባሰብ በደረቅ ሰሞናት ተግባር ላይ ማዋል

በኢትዮጵያ የሚቲዎሮሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቲዎሮሎጂ ትንበያ፡



ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

2.4 እ.ኤ.አ ከኦክቶበር 1 እስከ 10/2025 የሚኖረው የአየር ሁኔታ

በውሃ ዘርፍ ላይ ሊያሳድር የሚችለው ተፅዕኖ

በመጭው የኦክቶበር የመጀመሪያው አስር ቀናት በባሮ አኮቦ፣ የአባይ እና የኦሞ ጊቤ እንዲሁም የስምጥ ሸለቆ ተፋሰሶች ላይ ከመጠነኛ እስከ መካከለኛ መጠን ያለው የገፀ ምድር የውሃ ፍሰት ያገኛሉ፡፡ በጋ እርጥበት ተጠቃሚ የሆኑት የዋቤ ሸበሌ፣ የኦጋዴንና ጥቂት የገናሌ ዳዋ ተፋሰሶች ላይ ከመጠነኛ እስከ መካከለኛ መጠን ያለው የገፀ ምድር የውሃ ፍሰት እንደሚኖራቸው ይጠበቃል፡፡ ተያያዥ ስጋቶችን ለመቀነስና የሚኖሩትን መልካም አጋጣሚዎች በላቀ ሁኔታ ለመጠቀም የቀረቡትን ተፋሰስ ተኮር የውሃ ሚቲዎሮሎጂ ምክረ ሀሳቦች በሁሉም ደረጃ በተገቢው ሁኔታ መተግበር ያስፈልጋል፡፡

ሠንጠረዥ 3፡ በሚቀጥሉት አስር ቀናት የሚኖረው የእርጥበት ሁኔታ በወሃዉ ዘር ላይ ሊኖር የሚችለው ተጽዕኖ

የውኃ ተፋሰሶች	የገጸ ምድር የውሃ ሽፋን	አዎንታዊ ተጽዕኖ	አሉታዊ ተጽዕኖ	የውሀ ሚቲዎሮሎጂ ምክረ ሃሳብ
በአብዛኛው አባይ፣ ባሮ አኮቦ፣ ኦሞ ጊቤ፣ አብዛኛው ስምጥ ሸለቆ፣ ዋቤ ሸበሌ እና ኦጋዴንና ጥቂት ገናሌ ዳዋ	መካከለኛ	- የመስኖም ሆነ የሃይል ማመንጫ ግድቦች የውኃ መጠን ይጨምራል - የገፀ ምድር የውሃ ፍሰት ይጨምራል - የበመጠኑም ቢሆን ለከርሰ ምድር የውኃ ይዘትን ያሻሽላል - የመጠጥ ውኃ አቅርቦት ሽፋን ይጨምራል	በውሃ መያዣዎች ላይ የደለል ስጋት ሊኖር ይችላል	የጎርፍ ትንበያዎችንና ሀሳቦችን በየጊዜው መከታተል ተፅዕኖ ምክረ
በአብዛኛው አባይ፣ ተከሌ፣ አዋሽ እና የታችኛው ገናሌ ዳዋ፣ እንዲሁም የዋቤ ሸበሌ ተፋሰሶች	መጠነኛ	- ግድቦች የጎርፍም ሆነ የደለል ስጋት አይኖርም - የመጠጥ ውሃ አቅርቦት ይኖራል - ለገጸ ምድር የውሃ ይዘት ጠቀሜታ ይኖረዋል	- ዝቅተኛ የውሀ ፍሰት መኖር - እርጥበት አጠር በሆኑ አካባቢዎች የውሃ እጥረት መከሰት - ከፍተኛ ትነት መጨመር	- የሚገኘው መጠነኛ የዝናብ ውሃ ከጣራ እና ከመሬት ወለል በተገቢ ሁኔታ ማሰባሰብ - የውሀ ሀብትን በአግባቡ መጠቀም

በኢትዮጵያ የሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎርሎጂ ትንበያ፡



ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

የታችኛው ስምጥ ሸለቆ፡ የታችኛው ገናሌ ዳዋ እና ዋቤ ሸበሌ እንዲሁም የአፋር ደናክልና አዋሽ ተፋሰሶች	ደረቅ	• የጎርፍ ስጋት አለመኖር	• የውሃ መያዣዎች የውሃ መጠን መቀነስ	• አልፎ አልፎ በሚኖር ዝናብ የጣራ ላይ ውሃን ማጠራቀምና ጥቅም ላይ ማዋል
--	-----	------------------	--------------------------	---

