



በኢትዮጵያ የሚቴዎሮሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎሮሎጂ ትንበያ፣
ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ



ከኦክቶበር 1-10/2025 የነበረው የአየር ሁኔታ ግምገማ
እንዲሁም ከኦክቶበር 11-20 እና ከኦክቶበር 21-31/2025
የሚኖረው የአየር ሁኔታ ትንበያ እና ምክረ ሃሳብ

ኦክቶበር 2025

አዲስ አበባ


1. እ.ኤ.አ ከኦክቶበር 1 እስከ 10/2025 የነበረው የአየር ሁኔታ

ባለፉት አስር ቀናት ለዝናብ መፈጠር ምቹ የሆኑ የሚቴዎርሎጂ ገጽታዎች ከቀን ወደ ቀን እየተስፋፉ ከመምጣታቸው ጋር ተያይዞ፤ በተለይም በጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው በሁኑት የደቡብ አጋማሽ የሀገሪቱ ስፍራዎች ላይ እንዲሁም በክረምት ወቅት ዝናብ ሲያገኙ የነበሩት የሀገሪቱ አካባቢዎች በመጨረሻዎቹ ቀናቶች ላይ የተሻላ ገጽታ ነበራቸው። በመሆኑም፤ በዚህ ወቅት በመደበኛ ሁኔታ ዝናብ የሚያገኙት የደቡብ አሮሚያ፣ የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ደቡባዊ ዞኖች፣ የደቡብ ሶማሌ ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን ያለው ዝናብ የተመዘገበ ሲሆን፤ አልፎ አልፎ ጠንከር ያለ የደመና ክምችት ተስተውሎባቸዋል። በተጨማሪም የዝናቡ ሥርጭት ወደ ሰሜን ምዕራብ፣ ምዕራብ፣ መካከለኛው፣ ሰሜን ምሥራቅና ምሥራቅ ኢትዮጵያ ከመስፋፋቱም ባሻገር አንዳንድ አካባቢዎችም በፀሀይ ኃይል ታግዞ ከተፈጠረው ጠንካራና ዝናብ ሰጪ ደመናዎች በአንዳንድ ቦታዎች ላይ በ24 ሰዓት ውስጥ ከመካከለኛ እስከ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ተመዝግቧል። በተጨማሪም በ24 ሰዓት ውስጥ ከ20 ሚ.ሜ በላይ መካከለኛ መጠን ያለው ዝናብ ከተመዘገበባቸው የሚቴዎርሎጂ ጣቢያዎች መካከል አርባ ምንጭ 23.4፣ ባህር ዳር 35.2፣ 46.2፣ 33.8፣ ጎሬ 29.2፣ ነገሌ 13.6፣ 22.3፣ ነቀምት 25.4፣ አዲስ አበባ ጥቁር አንበሳ 23.4፣ አዲግራት 20.8፣ አይራ 22.2፣ አልጌ 25፣ 23.5፣ 35፣ አንገር ጉትን 20፣ አርጆ 24.6፣ 28.8፣ አሶሳ 34.7፣ በደሌ 20.2፣ ቦሬ 36፣ ቡለን 27፣ 20.2፣ 38.4፣ 20፣ 20.8፣ ቡራ 28.1፣ 28.8፣ 60.5፣ ቡርጂ 27.6፣ ቻግኒ 25.4፣ 30.5፣ ጨዋቃ 22፣ 28፣ ዳንግላ 20.4፣ ደምቢ ዶሎ 23.8፣ ዶሎመና 20.7፣ 20.4፣ 20.3፣ ኢጃጂ 47.7፣ ጋቲራ 20.2፣ ጊዳ አያና 21.6፣ ጊምቢ 25.5፣ ጎሎልቻ 20፣ ቡሌ ሆራ 26፣ 21፣ 25.2፣ ጃራ 20፣ ላሬ 31.4፣ ሊሙገነት 57.5፣ ነጆ 34.4፣ ሻምቡ 35.8፣ ሽሬ 29.5፣ 38.4፣ ሲሪንቃ 26.2፣ ቴፒ 54.8፣ አቦ ሞሪንጋ 29.2፣ 22.2፣ አጋሮ 22.5፣ 22፣ አገጋጫ 24.5፣ 23.5፣ አታንጎ 25፣ 28.7፣ 49፣ በቆጂ 22.3፣ ቢላምቢሎ 23.4፣ 23.3፣ 22.7፣ 33፣ ቦርቃ 24.6፣ ቡሬ 22፣ ጉባይሬ 75.6፣ ጉብቲ 22.7፣ 34.7፣ 33.9፣ ሃሮ 30.2፣ ቅዳሜ ገበያ 26.8፣ 27.6፣ 48.8፣ 22.4፣ 37.6፣ 58.6፣ 59.8፣ ኮበን 33፣ ኩሚ 21.1፣ መካነ ኢየሱስ 23.8፣ አንጋ 43.3፣ 26.5፣ 42.6፣ 28.3፣ ሸቤ 20.5፣ ተርቆዲ 23.7፣ 36.8፣ ትንሹ ሜጢ 31.3፣ መንደር አስራ ሶስት 20.2፣ 20.4፣ መንደር አስራ አንድ 46፣ 53.5፣ ያንፋ 40.3፣ 30.3፣ 37.8፣ 30.3፣ 28.2፣ 37.8፣ ያዮ 21.7፣ 24.6፣ 42.5፣ እንዲሁም ይርጋለም 28.6 ሚ.ሜ የሚደርስ ከመካከለኛ እስከ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ተመዝግቦባቸዋል።

በኢትዮጵያ የሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎርሎጂ ትንበያ፡

ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

በአጠቃላይ ባለፉት አስር ቀናት በሃያ ሰዓት (27) የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ በ24 ሠዓት ውስጥ ከ30 ሚ.ሜ በላይ የሆነ ከባድ መጠን ያለው የዝናብ መጠን ነበራቸው (ምስል 1)፡፡ በተጨማሪም በጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታች በሁኑት የደቡብ አጋማሽ የሀገሪቱ አካባቢዎች እንዲሁም በአንዳንድ የክረምት ዝናብ ተጠቃሚ በሆኑ የምዕራብና የደቡብ ምዕራብ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ በ24 ሰዓት ውስጥ 40.3 - 75.6 ሚ.ሜ የሚደርስ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ተመዝግቧል፡፡ ከ40 ሚ.ሜ በላይ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ከተመዘገበባቸው የሀገሪቱ አካባቢዎች መካከል ጉበይሬ፣ ቡሬ፣ ቅዳሜ ገበያ፣ ሊሙ ገነት፣ ተፒ፣ መንደር አስራ አንድ፣ አታንጎ፣ ኢጃጂ፣ ባህር ዳር፣ ኦንጋ፣ ያዮ እና ያንፋ ይገኙበታል (ምስል 1)፡፡




ምስል:1 ከአፕሪል 1-10 በ24 ሰዓት ውስጥ ከ35 ሚ.ሜ በላይ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ

በኢትዮጵያ የሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎርሎጂ ትንበያ፡




ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

ባለፉት አስር ቀናት በጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው በሆኑት አካባቢዎች የዘነበው የዝናብ መጠን ከቦታ ሽፋን አንፃር ሲገመገም፤ ከአሮሚያ ክልል የቦረና፣ የምስራቅ ቦረና፣ የጉጂ እና ምዕራብ ጉጂ ዞኖች፤ ከደቡብ ኢትዮጵያ ክልል የጋሞ፣ ባስኬቶ፣ አሪ፣ ኮንሶ፣ ቡርጂ፣ አሌ፣ ጋርዳላ፣ ኮሬ እና ደቡብ አሞ ዞኖች፣ ከሱማሌ ዳዋ፣ ሊባን፣ አፍዴር ዞኖች ላይ ከ21-100 ሚ.ሜ የሚደርስ ዝናብ ከ3-6 ቀናት ያህል ዝናብ ነበራቸው (ካርታ 1 እና 2)። በተመሳሳይ ቀደም ብሎ የክረምት ወቅት ዝናብ እያገኙ የነበሩት ከአሮሚያ ክልል የቄለም ወለጋ፣ ምዕራብ ወለጋ፣ ምስራቅ ወለጋ፣ ሆሮ ጉድፋ ወለጋ፣ ኢሉባቦር፣ ቡኖ በደሌ፣ ጅማ፣ ምዕራብ፣ ደቡብ ምዕራብ፣ ምስራቅ ባሌ፣ ባሌ፣ ምዕራብ ሐረርጌ ዞኖች፣ ከአማራ ክልል ምዕራብና ደቡብ ጎንደር፣ ሰሜን፣ ምስራቅና ምዕራብ ጎጃም፣ የአዊ፣ የባህርዳር ዙሪያ ዞኖች፣ የዋግ ህምራ፣ የደቡብ እና የሰሜን ወሎ፣ የሰሜን ሸዋ ዞኖች፣ ከጋምቤላ ክልል አኝዋክ፣ መሻርንግ፣ የኑዌር እና የኢታንግ ልዩ ወረዳ፣ ከቤንሻንጉል ጉምዝ ካማሺ፣ መተከል፣ አሶሳ፣ ማኦ ኮሞ ዞኖች፣ ከደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል ኮንታ፣ ዳዉሮ፣ ከፋ፣ ሸካ፣ ቤንች ሸኮ ዞኖች ላይ ከ41-281 ሚ.ሜ የሚደርስ ዝናብ ከ3-10 ቀናት ያህል ዝናብ ነበራቸው (ካርታ 1 እና 2)። በተጨማሪም ከትግራይ ክልል የምዕራብ፣ ሰሜን ምዕራብ፣ መካከለኛው፣ ደቡብ ምስራቅና ደቡብ ትግራይ ዞኖች፣ ከማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ጉራጌ፣ ምስራቅ ጉራጌ፣ የሀዲያ፣ ስልጤ፣ የከንባታ፣ አዲስ አበባ፣ ድሬዳዋ እና ሐረሪ የሃላባ፣ የም ዞኖች፣ ቀቤና፣ ማረቆ፣ ጠምባሮ ልዩ ወረዳ፣ ከደቡብ ኢትዮጵያ ክልል የጎፋ፣ የወላይታ እና ጌዲዮ ዞኖች፣ ከአፋር ክልል የጋቢ፣ ፋንቲ፣ አዉሲና ማሂ ዞኖች፣ ከሱማሌ ክልል የሲቲ እና የኤረር ዞኖች ላይ ከ11-40 ሚ.ሜ የሚደርስ ዝናብ ከ2-4 ቀናት ያህል ዝናብ ነበራቸው (ካርታ 1 እና 2) ።



ካርታ 1 እ.ኤ.አ ከኦክቶበር 1 እስከ 10/2025 ድረስ የነበረው የዝናብ መጠን በሚ.ሜ




ካርታ 2 እ.ኤ.አ ከኦክቶበር 1 እስከ 10/2025 ድረስ ዝናብ የዘነበባቸው ቀናት

በኢትዮጵያ የሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎርሎጂ ትንበያ፡



ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

ባለፉት አስር ቀናት የዘነበዉ የዝናብ መጠን ከመደበኛዉ ጋር ሲነፃፀር በጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸዉ ከሆኑት አከባቢዎች ከኦሮሚያ ክልል የቦረና፣ የምስራቅ ቦረና፣ የጉጂ እና ምዕራብ ጉጂ ዞኖች፣ ከደቡብ ኢትዮጵያ ክልል የጋሞ፣ ባስኬቶ፣ አሪ፣ ኮንሶ፣ ቡርጂ፣ አሌ፣ ጋርዱላ፣ ኮሬ እና ደቡብ ኦሞ ዞኖች፣ ከሱማሌ ዳዋ፣ ሊበን፣ አፍዴር ዞኖች ላይ በአብዛኛዉ መደበኛና ከመደበኛዉ በላይ የሆነ የዝናብ መጠን ተመዝግቧል (ካርታ 3)። በተመሳሳይ ቀደም ብሎ የክረምት ወቅት ዝናብ እያገኘ የነበሩት ከኦሮሚያ ክልል የቄለም ወለጋ፣ ምዕራብ ወለጋ፣ ምስራቅ ወለጋ፣ ሆሮ ጉድሩ ወለጋ፣ ኢሉባቦር፣ ቡኖ በደሌ፣ ጅማ፣ ምዕራብ፣ ደቡብ ምዕራብ፣ ምስራቅ ባሌ፣ ባሌ፣ ምዕራብ ሀረርጌ ዞኖች፣ ከአማራ ክልል ምዕራብና ደቡብ ጎንደር፣ ሰሜን፣ ምስራቅና ምዕራብ ጎጃም፣ የአዊ፣ የባህርዳር ዙሪያ ዞኖች፣ የዋግ ህምራ፣ የደቡብ እና የሰሜን ወሎ፣ የሰሜን ሸዋ ዞኖች፣ ከጋምቤላ ክልል አኝዋክ፣ መሻርንግ፣ የኑዌር እና የኢታንግ ልዩ ወረዳ፣ ከቤንሻንጉል ጉምዝ ካማሺ፣ መተከል፣ አሶሳ፣ ማኦ ኮሞ ዞኖች፣ ከደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል ኮንታ፣ ዳዉሮ፣ ከፋ፣ ሸካ፣ ቤንች ሸኮ፣ ከትግራይ ክልል የምዕራብ፣ ሰሜን ምዕራብ፣ መካከለኛዉ፣ ደቡብ ምስራቅና ደቡብ ትግራይ ዞኖች፣ ከማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ጉራጌ፣ ምስራቅ ጉራጌ፣ የሀዲያ፣ ስልጤ፣ የከንባታ፣ አዲስ አበባ፣ ድሬዳዋ እና ሐረሪ የሃላባ፣ የም ዞኖች፣ ቀቤና፣ ማረቆ፣ ጠምባሮ ልዩ ወረዳ፣ ከደቡብ ኢትዮጵያ ክልል የጎፋ፣ የወላይታ እና ጌዲዮ ዞኖች፣ ከአፋር ክልል የጋቢ፣ ፋንቲ፣ አዉሲና ማሂ ዞኖች፣ ከሱማሌ ክልል የሲቲ እና የኤረር ዞኖች ላይ በአብዛኛዉ መደበኛና ከመደበኛዉ በላይ የሆነ የዝናብ መጠን ተመዝግቧል (ካርታ 3) ።




ካርታ 3 እ.ኤ.አ ከኦክቶበር 1 እስከ 10/2025 የነበረዉ የዝናብ መጠን ከመደበኛዉ ጋር ሲነፃፀር



1.2 እ.ኤ.አ ከኦክቶበር 1 እስከ 10/2025 የነበረው የአየር ሁኔታ

በግብርና ሥራ እንቅስቃሴ ላይ ያሳደረው ተፅዕኖ

ባለፉት አስር ቀናት በተለይም በመጨረሻዎቹ ቀናቶች በደቡብ፣ በሰሜን ምዕራብ፣ በምዕራብ፣ በመካከለኛው፣ በሰሜን ምሥራቅና በምሥራቅ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ የተገኘው በመጠንም ሆነ በስርጭት የተስፋፋ ዝናብ የአፈር ውስጥ እርጥበትን አሻሽሏል፡፡ ከዚህ ጋር በተያያዘም ቀደም ሲል ተዘርተው ፍሬ በመሙላት እና በማበብ ላይ ለሚኙት እንደ ማሽላና በቆሎ ላሉት የረጅም ጊዜ ሰብሎችም ሆነ ለሌሎች የመካከለኛና የአጭር ጊዜ ሰብሎች፣ ለቋሚ ተክሎች፣ ለፍሬፍሬዎችና ለጓሮ አትክልቶች የውሃ ፍላጎታቸውን ከማሟላት አንጻር ከፍተኛ ጠቀሜታ ነበረው፡፡ በተለይም በጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው በሆኑት በደቡብ አጋማሽ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ የተገኘው እርጥበት ጥምር ግብርና ለሚያከናውኑ አካባቢዎች የማሳ ዝግጅት ለማከናወንም ሆነ ዘር ለመዝራት ምቹ ሁኔታ የፈጠረ ነበረ፡፡ እንዲሁም በደቡብ እና በደቡብ ምስራቅ ቆላማው አካባቢ ለሚኖሩ አርብቶ አደሮችና ከፊል አርብቶ አደሮች በቂ የግጦሽ ሣርና የመጠጥ ውኃ አቅርቦት እንዲኖር ከማስቻል አንጻር አዎንታዊ ሚና ነበረው (ካርታ 4) ፡፡



ካርታ 4 እ.ኤ.አ ከኦክቶበር 1 እስከ 10/2025


ድረስ የነበረው የእርጥበት ሁኔታ

በኢትዮጵያ የሚታወቁ ኢንስቲትዩት የሚታወቁ ትንበያ፡

ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

1.3 እ.ኤ.አ ከኦክቶበር 1 እስከ 10/2025 የነበረው የአየር ሁኔታ በውሃው ዘርፍ ላይ ያሳደረው ተፅዕኖ

ባለፉት አስር ቀናት በአብዛኛው አሞ ጊዜ፣ ባሮ አካባቢ፣ ስምጥ ሸለቆ፣ መካከለኛው እና ታችኛው ተከቤ፣ አባይ፣ አይሻ፣ መረብ ጋሽ፣ በጥቂት የላይኛው አዋሽ፣ በላይኛውና መካከለኛው ዋቤ ሸበሌ እንዲሁም ገናሌ ዳዋ ተፋሰሶች ላይ ከመጠነኛ እስከ በጣም ከፍተኛ የሆነ የገጸ ምድር የውሃ ፍሰት ነበራቸው፡፡ በተጨማሪም በመካከለኛው ተከቤ፣ በጥቂት የላይኛው አዋሽ፣ በታችኛው ዋቤ ሸበሌና ገናሌ ዳዋ ተፋሰሶች ላይ መጠነኛ የሆነ የገጸ ምድር የውሃ ፍሰት ነበር፡፡ በአጠቃላይ ባለፉት ቀናት የነበረው እርጥበት የገጸ ምድርም ሆነ የከርሰ ምድር የውሃ ሀብት እንዲሻሻል በማድረግ ወደ ግድቦችና የተለያዩ የውሃ ማጠራቀሚያዎች የገባው የውሃ መጠን እንዲጨምር ከማድረግ አንጻር አዎንታዊ ሚና ነበረው፡፡ ይህም ሁኔታ ለመጠጥ ውሃ አቅርቦት፣ ለሃይል ማመንጫነት እንዲሁም ለመስኖ ግድቦች የተሻለ የውሃ ግብዓት እንዲኖር ያስቻለ እንደነበረ የተተነተኑ የውሃ ሚቲዎሮሎጂ መረጃዎች ያመለክታሉ (ካርታ 5) ።



ካርታ 5 እ.ኤ.አ ከኦክቶበር 1 እስከ 10/2025

ድረስ የነበረው የእርጥበት ሁኔታ

2. መግቢያ

የበጋ ወቅት ከአክቶብር እስከ ጃንዋሪ ያሉትን ወራት የሚያካትት ሲሆን፤ ለደቡብና ደቡብ ምሥራቅ የሀገሪቱ አካባቢዎች ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው ነው። የበጋ ወቅት ከዓመታዊ የዝናብ መጠኑ እስከ 45% የሚደረሰውን የሚሸፍን ሲሆን ከበልግ ቀጥሎ የተሻለ ዝናብ የሚኖርበት ወቅት ነው። በወቅቱ ከሚኖረው የዝናብ መጠን ከፍተኛውን ድርሻ የሚይዘው በአክቶብር እና በመጀመሪያዎቹ በኖቬምበር አስር ቀናት የሚጥለው ዝናብ ነው። በዚህ ወቅት ከፍተኛ መጠን ያለው የዝናብ መጠን የሚኖረው በደቡብ እና በደቡብ ምስራቅ አካባቢዎች ላይ ነው። በመደበኛ ሁኔታ በሀገሪቱ ደቡባዊ አጋማሽ ላይ የበጋ ወቅት ዝናብ ከአክቶብር መጀመሪያዎቹ ቀናቶች ጀምሮ መዝነብ ይጀምራል። በመደበኛ ሁኔታ በአክቶብር የሁለተኛው አሥር ቀናት የክረምት ድንበር (ITCZ) ወደ ደቡብ አቅጣጫ ከሚያደርገው እንቅስቃሴ ጋር ተያይዞ ዝናብ ሰጭ የሚቴዎርሎጂ ገጽታዎች በደቡብ የሀገሪቱ አጋማሽ ላይ እየተጠናከሩ ይሄዳሉ። ስለሆነም የደቡብ እና የደቡብ ምሥራቅ ኢትዮጵያ በተጠናከረ ሁኔታ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸውን ያገኛሉ።


2.1 እ.ኤ.አ ከአክቶብር 11 እስከ 20/2025 የሚኖረው የአየር ሁኔታ ትንበያ

በሚቀጥሉት የአክቶብር ሁለተኛው አሥር ቀናት አሁን ከሚታዩትና በቀጣይነትም የተተነበዩት የትንበያ መረጃዎች እንደሚያሳዩት ዝናብ ሰጭ የአየር ሁኔታ ክስተቶች በደቡብ፣ ምስራቅ፣ ደቡብ ምዕራብና ምዕራብ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ የተሻለ ገጽታ ይኖራቸዋል። በመሆኑም በጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው በሆኑት የምስራቅ ቦረና፣ የምዕራብ ጉጂ፣ ጉጂ ዞኖች፣ የሲዳማ ክልል ዞኖች፣ የሶማሌ ክልል ደቡባዊ ዞኖች እና የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ዞኖች ላይ ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን ያለው ዝናብ እንደሚኖራቸው አሃዛዊ የትንበያ መረጃዎች ይጠቁማሉ (ካርታ 6 እና 7)። በተጨማሪም ቀደም ብሎ የክረምት ወቅት ዝናብ እያገኙ የነበሩት የምዕራብ፣ ደቡብ ምዕራብ፣ እንዲሁም የሰሜን ምስራቅ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ ቀጣይነት ይኖረዋል። በተጨማሪም በፀሀይ ሀይል ታግዘው ከሚጠናከሩት የደመና ክምችቶች ላይ በመነሳት በምዕራብ፣ በመካከለኛው እና ደቡብ ምዕራብ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ አልፎ አልፎ በሚኖሩት ቀናት በ24 ሰዓት ውስጥ ከ11 እስከ 30 ሚ.ሜ የሚደተርስ መካከለኛ መጠን ያለው ዝናብ ይኖረዋል (ካርታ 6 እና 4)።


በኢትዮጵያ የሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎርሎጂ ትንበያ፡ ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ



Total Rainfall (mm) for 11-21 Oct 2025



Exceptional Rainfall for 11-21 Oct 2025



ካርታ 6 እ.ኤ.አ. ከኦክቶበር 11-20, 2025 የሚኖረው የዝናብ መጠን በሚ.ሜ

ካርታ 7 እ.ኤ.አ. ከኦክቶበር 11-20, 2025 የሚኖረው ከፍተኛ የዝናብ መጠን

ሠንጠረዥ 1፡ በሚቀጥሉት አስር ቀናት ዝናብ የሚያገኙ አካባቢዎችና በ24 ሰዓት ውስጥ የሚኖረው የዝናብ መጠን

በጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው የሆኑ ዞኖች

ክልል	ዞን	በ 24 ሰዓት ውስጥ የሚኖረው የዝናብ መጠን
አሮሚያ	ምስራቅ ቦረና፣ ጉጂ፣ ምዕራብ ጉጂ፣ ዞኖች	ቀላል መጠን (ከ1-10 ሚ.ሜ)
ሶማሌ	ጃራር፣ ነጎብ፣ ዶሎ፣ ቆራሂ፣ ሸበሌ፣ አፍዴር፣ ሊበን እና ዳዋ ዞኖች	ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን (ከ11-29 ሚ.ሜ)
ደቡብ ኢትዮጵያ	ጋሞ፣ ባስኬቶ፣ አሪ፣ ኮንሶ፣ ቡርጂ፣ አሌ፣ ጋርዳ፣ ኮሬ እና ደቡብ አሞ ዞኖች	ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን (ከ11-29 ሚ.ሜ)
ሲዳማ ክልል	ሁሉም የክልሉ ዞኖች	መካከለኛ መጠን (ከ11 እስከ 29 ሚ.ሜ)

የከረምት ወቅት ዝናብ ተጠቃሚ ዞኖች

በኢትዮጵያ የሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎርሎጂ ትንበያ፡



ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

አሮሚያ	የቁለም ወለጋ፣ ምዕራብ ወለጋ፣ ምስራቅ ወለጋ፣ ሆሮ ጉድፋ ወለጋ፣ ኢሉባቦር፣ ቡኖ በደሌ፣ ጅማ ዞኖች	መካከለኛ መጠን (ከ11 እስከ 29 ሚ.ሜ)
	ምዕራብና ምስራቅ ሐረርጌ ዞኖች፣ አርሲ እና ምዕራብ አርሲ፣ የሰሜን እና የምዕራብ የሸዋ ዞኖች፣ ባሌ እና ምስራቅ ባሌ፣	ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን (ከ11-29 ሚ.ሜ)
አማራ	የሰሜን፣ ምዕራብ፣ መካከለኛው እና ደቡብ ጎንደር፣ የባህርዳር ዙሪያ፣ የአዊ፣ የሰሜን፣ ምዕራብ እና ምስራቅ ጎጃም፣	ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን (ከ11-29 ሚ.ሜ)
	የዋግ ህምራ፣ የሰሜን ሸዋ ዞኖች፣ የሰሜን እና ደቡብ ወሎ ዞኖች	ቀላል መጠን (ከ1-10 ሚ.ሜ)
ትግራይ	የምዕራብ፣ የሰሜን ምዕራብ፣ የመካከለኛው፣ የደቡብ ምስራቅ እና የደቡብ ትግራይ ዞኖች	ቀላል መጠን (ከ1-10 ሚ.ሜ)
ቤንሻንጉል ጉምዝ	የካማሺ፣ መተከል፣ አሶሳ፣ ማኦ ኮሞ ዞኖች	ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን (ከ11-29 ሚ.ሜ)
ጋምቤላ	የአኝዋክ፣ መሻርንግ፣ የኑዌር እና የኢታንግ ልዩ ወረዳ	ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን (ከ11 እስከ 29 ሚ.ሜ)
አፋር	የማሂ፣ ሀሪ፣ ቅልበቲ፣ ፈንቲ እና ጋቢ ዞኖች	ቀላል መጠን (ከ1-10 ሚ.ሜ)
ማዕከላዊ ኢትዮጵያ	ጉራጌ፣ ምስራቅ ጉራጌ፣ ስልጤ፣ ሀዲያ፣ ከምባታ፣ ሀላባ፣ የም፣ ጠምባሮ ልዩ ወረዳ፣ ቀቤና ልዩ ወረዳ፣ ማረቆ ልዩ ወረዳ	ቀላል መጠን (ከ1-10 ሚ.ሜ)
ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ	የከፋ፣ ኮንታ፣ ዳውሮ፣ ቤንሻ ሸኮ፣ ሸካ እና ምዕራብ ኦሞ	ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን (ከ11 እስከ 29 ሚ.ሜ)
ደቡብ ኢትዮጵያ	የወላይታ፣ ጎፋ፣ ጌድዮ፣	ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን (ከ11 እስከ 29 ሚ.ሜ)
አዲስ አበባ፣ ድሬዳዋ እና ሐረሪ		ቀላል መጠን (ከ1-10 ሚ.ሜ)
ሶማሌ	ሲቲ፣ ፋፈን እና ኤረር ዞኖች	ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን (ከ11 እስከ 29 ሚ.ሜ)

በኢትዮጵያ የሚቲዎሮሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቲዎሮሎጂ ትንበያ፣ ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ



2.2 እ.ኤ.አ ከኦክቶበር 21 እስከ 31/2025 የሚኖረው የአየር ሁኔታ አዝማሚያ

በመጨረሻ የኦክቶበር ሶስተኛው አሥራ አንድ ቀናት አሁን ከሚታዩትና በቀጣይነትም የተተነበዩት የትንበያ መረጃዎች እንደሚሳየው ዝናብ ሰጭ የአየር ሁኔታ ክስተቶች በደቡብ፣ ደቡብ ምስራቅ፣ ምስራቅ፣ ደቡብ ምዕራብና ምዕራብ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ የተሻለ ገጽታ ይኖራቸዋል። በመሆኑም በጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው በሆኑት የጉጂ፣ ምዕራብ ጉጂ፣ ቦረና እና ምስራቅ ቦረና ዞኖች፣ የሲዳማ ክልል ዞኖች፣ የሶማሌ ክልል ደቡባዊ ዞኖች እና የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ዞኖች ላይ ከሚጠናከሩት የሚቲዎሮሎጂ ገጽታዎች ላይ በመነሳት ቀላል መጠን ያለው ዝናብ ይኖራቸዋል። በተጨማሪም ቀደም ብሎ የክረምት ወቅትን ዝናብ እያገኙ በነበሩት በምዕራብ፣ በደቡብ ምዕራብ እንዲሁም በምስራቅ ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን ያለው ዝናብ እንደሚኖራቸው አሃዛዊ የትንበያ መረጃዎች ይጠቁማሉ።

2.3 እ.ኤ.አ ከኦክቶበር 11 እስከ 20/2025 የሚኖረው የአየር ሁኔታ በግብርናው ሥራ እንቅስቃሴ ላይ ሊያሳድር የሚችለው ተፅዕኖ

በሚቀጥሉት አሥር ቀናት በምዕራብ፣ ደቡብ ምዕራብ፣ እንዲሁም በምስራቅ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ የሚኖረው የክረምቱ ቀጣይነት ያለው እርጥበት ለወቅቱ የግብርና ስራ እንቅስቃሴ በአመዛኙ አዎንታዊ ሚና ይኖረዋል። እንዲሁም በጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው በሆኑት የጉጂ፣ ምዕራብ ጉጂ፣ ምስራቅ ቦረና፣ የሲዳማ ክልል ዞኖች፣ የሶማሌ ክልል ደቡባዊ ዞኖች እና የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ዞኖች ላይ የሚጠበቀው ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን ያለው እርጥበት በአካባቢው ለሚጀምረው የግብርና እንቅስቃሴ ከፍተኛ ጠቀሜታ ይኖረዋል። በተጨማሪም ተያያዥ ስጋቶችን ለመቀነስና የሚኖሩትን መልካም አጋጣሚዎች በላቀ ሁኔታ ለመጠቀም የቀረቡትን ቦታ ተኮር የግብርና ሚቲዎሮሎጂ ምክረ ሀሳቦች በሁሉም ደረጃ በተገቢው ሁኔታ መተግበር ያስፈልጋል።

በኢትዮጵያ የሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎርሎጂ ትንበያ፡



ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

ሠንጠረዥ ሠንጠረዥ 2፡ በሚቀጥሉት አስር ቀናት የሚኖረው የእርጥበት ሁኔታ በግብርናው እንቅስቃሴ ላይ

ዞኖች	የእርጥበት ሁኔታ	አዎንታዊ ተጽዕኖ	አሉታዊ ተጽዕኖ	የተሰጠ ምክረ ሃሳብ
የክረምት እርጥበት ተጠቃሚ የመኸር አምራች ዞኖች				
የቄለም ወለጋ፣ ምዕራብ ወለጋ፣ ምስራቅ ወለጋ፣ ሆሮ ጉድፍ ወለጋ፣ ኢሉባቦር፣ ቡኖ በደሌ፣ ጅማ፣ የሰሜን፣ ምዕራብ፣ መካከለኛው እና ደቡብ ጎንደር፣ የባህርዳር ዙሪያ፣ የአዊ፣ የሰሜን፣ ምዕራብ እና ምስራቅ ጎጃም፣ የምዕራብ፣ የሰሜን ምዕራብ፣ የመካከለኛው፣ ትግራይ ዞኖች፣ የካማሽ፣ መተከል፣ አሶሳ፣ ማኦ ኮሞ፣ የአኝዋክ፣ መሻንግ፣ የኑዌር እና የኢታንግ ልዩ ወረዳ፣ የከፋ፣ ኮንታ፣ ዳውሮ፣ ቤንች ሸኮ፣ ሸካ እና ምዕራብ አሞ	ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን ያለው እርጥበት	• እንደ ሽንብራና ጓያ የመሳሰሉ የጥራጥሬ ሰብሎችን ለመዝራት • ዘግይተው ተዘርተው ፍሬ በመሙላት ላይ ላሉ ለረጅምና ጊዜ መካከለኛ ሰብሎች እድገት • ለቋሚ ተክሎችና ለግጦሽ ሳር ዕድገት • የመጠጥ ውሃ አቅርቦት መሟላት	• እንደ ዋግ የመሳሰሉ የሰብለ በሽታ መከሰት • የአረም መከሰት	• የደረሱ ሰብሎችን በጊዜ መሰብሰብ • የጥራጥሬ ሰብሎችን በጊዜ መዝራት • የማሳ ጉብኝት በተከታታይ ማከናወን • ፀረ-ተባይ ኬሚካሎችን ከግብርና ባለሙያ ጋር በመመካከር የአየር ሁኔታ ምቹነትን ባገናዘበ ሁኔታ ተግባራዊ ማድረግ • አረምን በወቅቱ መከታተል እና ማረም
በልግ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸውና የመኸር አብቃይ የሆኑ ዞኖች				
ምዕራብና ምስራቅ ሐረርጌ ዞኖች፣ አርሲ እና ምዕራብ አርሲ፣ የሰሜን እና የምዕራብ የሸዋ ዞኖች፣ ባሌ፣ ምስራቅ ባሌ፣ የዋግ ህምራ፣ የሰሜን ሸዋ ዞኖች፣ የሰሜን እና ደቡብ ወሎ ዞኖች፣ ወላይታ፣ ጎፋ፣ ጌድዮ፣ የፋፈን ሲቲ እና ኤረር ዞኖች	ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን ያለው እርጥበት	• እንደ ሽንብራና ጓያ የመሳሰሉ የጥራጥሬ ሰብሎችን ለመዝራት • ዘግይተው ተዘርተው ፍሬ በመሙላት ላይ ላሉ ሰብሎች እድገት • ለቋሚ ተክሎችና ለግጦሽ ሳር ዕድገት • የመጠጥ ውሃ አቅርቦት መሻሻል	• የደረሱ ሰብሎችን ለመሰብሰብ አስቸጋሪ ሁኔታ መኖር • እንደ ዋግ የመሳሰሉ የሰብለ በሽታ መከሰት • የአረም መከሰት	• የደረሱ ሰብሎችን በጊዜ መሰብሰብ • የጥራጥሬ ሰብሎችን በጊዜ መዝራት • ፀረ-ተባይ ኬሚካሎችን ከግብርና ባለሙያ ጋር በመመካከር የአየር ሁኔታ ምቹነትን ባገናዘበ ሁኔታ ተግባራዊ ማድረግ • አረምን በወቅቱ መከታተል እና ማረም
ጉራጌ፣ ምስራቅ ጉራጌ፣ ስልጤ፣ ሀዲያ፣ ከምባታ፣ ሀላባ፣ የም፣ ጠምባሮ ልዩ ወረዳ፣ ቀቤና ልዩ ወረዳ፣ ማረቆ ልዩ ወረዳ አዲስ አበባ፣ ድሬዳዋ እና ሐረሪ የማሂ፣ ሀሪ፣ ቅልበቲ፣ ፈንቲ እና ጋቢ ዞኖች የደቡብ ምስራቅ እና የደቡብ ትግራይ ዞኖች፣	ቀላል መጠን ያለው እርጥበት	• የእንስሳት መኖርና የመጠጥ ውሃ አቅርቦት በመጠኑ መሻሻል	• የአፈር ዉስጥ እርጥበት መጠነኛ መሆን	• የደረሱ ሰብሎችን በጊዜ መሰብሰብ • የጥራጥሬ ሰብሎችን (ሽንብራ እና ጓያ) መዝራት

በኢትዮጵያ የሚቲዎሮሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቲዎሮሎጂ ትንበያ፡



ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

በጋ ሁለተኛ የዝናብ የዝናብ ወቅታቸው የሆኑ ዞኖች				
ጃራር፣ ነጎብ፣ ዶሎ፣ ቆራሂ፣ ሸበሌ፣ አፍዴር፣ ሊበን፣ ዳዋ፣ ጋሞ፣ ባስኬቶ፣ አሪ፣ ኮንሶ፣ ቡርጂ፣ አሌ፣ ጋርዱላ፣ ኮሬ፣ ደቡብ አሞ፣ ምስራቅ ቦረና፣ ጉጂ፣ ምዕራብ ጉጂ እና ሁሉም ሲዳማ የክልሉ ዞኖች	ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን ያለው እርጥበት	• የዝናብ ውሃ ለማሰባሰብና ለማጠራቀም • ለደጋማ አካባቢዎች ዘር ለመዝራት • ለእንስሳት መኖርና የመጠጥ ውሃ አቅርቦት መሻሻል	• የአፈር ውስጥ እርጥበት መጠነኛ መሆን	• የዝናብ ውሃን በማሰባሰብ በደረቅ ሰሞናት ተግባር ላይ ማዋል • ደጋማ አካባቢዎች ላይ ዘር መዝራት

2.4 እ.ኤ.አ ከኦክቶበር 11 እስከ 20/2025 የሚኖረው የአየር ሁኔታ በውሃ

ዘርፍ ላይ ሊያሳድር የሚችለው ተፅዕኖ

በቀጣይ የኦክቶበር ሁለተኛ አሥር ቀናት በአሞ ጊዜ፣ በአባይ፣ በባሮ አኮቦ፣ በኦጋዴን፣ በስምጥ ሸለቆ፣ በላይኛው እና መካከለኛው አዋሽ፣ በገናሌ ዳዋ፣ በዋቤ ሸበሌ እንዲሁም በመካከለኛው እና ታችኛው ተከቤ ተፋሰሶች ላይ ከመጠነኛ እስከ መካከለኛ መጠን ያለው የገፀ ምድር የውሃ ፍሰት ይጠበቃል። በመሆኑም የሚመለከታቸው የዘርፉ አካላት ሊኖር የሚችለው መልካም ዕድሎችን ለመጠቀም የሚከተሉትን ተፋሰስ ተኮር የውሃ ሚቲዎሮሎጂ ምክረ ሀሳቦች በሚቀጥለው ሰንጠረዥ ይመለከቱ።

ሠንጠረዥ 3፡ በሚቀጥሉት አስር ቀናት የሚኖረው የእርጥበት ሁኔታ በዉሃዉ ዘር ላይ

ሊኖር የሚችለው ተጽዕኖ

የውሀ ተፋሰሶች	የገጸ ምድር የውሃ ሽፋን	አዎንታዊ ተጽዕኖ	አሉታዊ ተጽዕኖ	የውሀ ሚቲዎሮሎጂ ምክረ ሃሳብ
በአብዛኛው አሞ ጊዜ፣ አባይ፣ ባሮ አኮቦ፣ ኦጋዴን፣ ስምጥ ሸለቆ፣ በላይኛው እና መካከለኛው አዋሽ፣ ገናሌ ዳዋ፣ ዋቤ ሸበ	መካከለኛ እርጥበት	• የመጠጥ ውሃ አቅርቦት ሽፋን መሻሻል • የመስኖም ሆነ የሃይል ማመንጫ ግድቦች ውሃ መጠን መጨመር	የፍሳሽ መውረጃዎች በጠጣር ቆሻሻ መዘጋት	• ፍሳሽ ሊዘጉ የሚችሉ ቆሻሻዎች በተገቢ ሁኔታ ማስወገድ - የዝናብ ውሀ ማሰባሰብና ማጠራቀም

በኢትዮጵያ የሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎርሎጂ ትንበያ፡



ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

እና በመካከለኛው እና ታችኛው ተከቤ		የገፀ ምድርም ሆነ የክርስ ምድር የውሃ ሀብት መጨመር		
በአብዛኛው አፋር ደናክል፣ አይሻ፣ መረብ ጋሽ፣ በመካከለኛው እና ታችኛው ገናሌ ዳዋ፣ ዋቤ ሸበሌ፣ በታችኛው አሞ ጊቤ፣ ስምጥ ሸለቆና ላይኛው አባይ	ከመጠነኛ እስከ ደረቅ ሁኔታ	• የጎርፍም ሆነ የደለል ስጋት አለ መኖር • የሚገኘው መጠነኛ እርጥበት የመጠጥ ውሃ አቅርቦት መሻሻል	• ዝቅተኛ የውኃ ፍሰት • በቆላማ አካባቢዎች በትነት ምክንያት የውሃ መጠን መቀነስ	• የሚገኘው መጠነኛ የዝናብ ውሃ ከጣራ እና ከመሬት ወለል በተግባሩ ሁኔታ ማሰባሰብ • የውሀ ሀብትን በአግባቡ መጠቀም • የሚገኘውን መጠነኛ የዝናብ ውሀ ከብክነት እና ከብክለት መከላከል

