

**የአየር ጠባይ ትንበያ
አገልግሎት ለተለያዩ**

አፅህፎት



ለግብርና

**ለአደጋ
መከላከል**

**ለዉሃ ሃብት
አስተዳደር**

**ለአካባቢ
ጥበቃ**

ለትራንስፖርት

ለኮንስትራክሽን


የክረምት ወቅት ከጁን እስከ ሴፕቴምበር ያሉትን ወራት የሚያጠቃልል ሲሆን፤ ለአብዛኛው የሀገራችን አካባቢዎች ዋነኛ የዝናብ ወቅት ነው። ስለሆነም የዘንድሮው ክረምት በአጀማመር ረገድ በደቡብ ምዕራብ፣ ምዕራብና መካከለኛው አካባቢዎች ላይ ቀደም ብሎ የጀመረ ሲሆን፤ በሌሎች የክረምት ዝናብ ተጠቃሚ አካባቢዎች ላይ ደግሞ መደበኛ ፈሩን ተከትሎ የወቅቱ ዝናብ ጀምሯል። በዘንድሮው ክረምት 2025 በክረምት ዝናብ ተጠቃሚ አካባቢዎች ላይ ለተለያዩ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ስራዎችን ለማከናወን በጣም ምቹ እንደነበር ከተለያዩ የሚቲዎርሎጂ ጣቢያዎች የሰበሰቡ መረጃዎች ያመለክታሉ። በተጨማሪም በሀምሌና በነሃሴ ወራቶች ቅፅበታዊ ጎርፍ በአንዳንድ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ ተስተዋል።

በአጠቃላይ የዘንድሮ የክረምት ዝናብ በበርካታ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ የተስፋፋ ዝናብ የነበረ ሲሆን፤ በአወጣጥ ረገድ በአንዳንድ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ ዘግይቷል።

በመሆኑም የነበረው የእርጥበት ይዘት በአብዛኛዎቹ መኸር አብቃይ ክፍሎች ላይ የሰብሎችን የውሃ ፍላጎት ያሟላና ለግብርናው እንቅስቃሴ፣ ለመጠጥና ለሀይል አቅርቦት አዎንታዊ ገጽታ እንደነበረው የተተነተኑ መረጃዎች ያመለክታሉ።

በአሁኑ ጊዜ በከባቢ አየርና በውቅያኖሶች ላይ በመታየት ላይ የሚገኙትና ለቀጣዮቹ ወራት በተተነበዩት መረጃዎች ላይ መሰረት ተደርጎ እ.ኤ.አ የ2020/21 እና 2017/18 ዓመታት በቅደም ተከተል ከዘንድሮው የበጋ ወቅት ጋር ተመሳሳይነት እንደሚኖራቸው (Analogue Years) ግንዛቤ ተወስዷል። በዚህም መሠረት በበጋ 2025/26 ወቅት ከመደበኛ ጋር የተቀራረበ የውቅያኖስ ሙቀት (ENSO-NEUTRAL) እና (IOD-NEUTRAL) ሁኔታ እንደሚሆን የትንበያ መረጃዎች ያሳያሉ። ስለሆነም በጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው በሆኑት በጉጂ፣ በቦረና፣ በሲዳማ እና ደቡብ ኢትዮጵያ አካባቢዎች ከመደበኛው ጋር የተቀራረበ የዝናብ ሁኔታ፣ እንዲሁም የሶማሌ ክልል ደቡባዊ ክፍል ከመደበኛ በታች ዝናብ ይኖራቸዋል። በተጨማሪም የምዕራብና የደቡብ ምዕራብ የሀገራችን አካባቢዎች ከመደበኛ በላይ ዝናብ ያገኛሉ። በሌላ በኩል አልፎ አልፎ ከሚጠናከሩት የአየር ሁኔታ ክስተቶች ላይ በመነሳት በሰሜን፣ በመካከለኛው እና በምስራቅ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ ወቅቱን ያልጠበቀ ዝናብ እንደሚኖራቸው አሃዛዊ የትንበያ መረጃዎች ይጠቁማሉ።

የበጋ 2025/26 ትንበያ




<https://www.ethiomet.gov>

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ

የኢትዮጵያ ሚቴዎሮሎጂ ኢንስቲትዩት

ወቅታዊ የአየር ጠባይ ትንበያ መጽሔት

የበጋ ወቅት አህጉራዊና ዓለም አቀፍ የሚቴዎሮሎጂ ገጽታዎች



እ.ኤ.አ 2025 የክረምት ወቅት የአየር ጠባይ ግምገማና

የ2025/26 የበጋ ወቅት የአየር ጠባይ አዝማሚያ

አድራሻ:- ስልክ: 0115538394 ፋክስ: 0115517066/6625292 ፖ.ሳ.ቁ:1090 አዲስ አበባ

ኢሜይል: emi@ethiomet.gov.et ድህረገጽ: www.ethiomet.gov.et



ይዘት

2025 የክረምት ወቅት የአየር ጠባይ ግምገማና የ2025/26 የበጋ ወቅት የአየር ጠባይ አዝማሚያ..	1
አፅህፎት (Executive Summary)	1
ምዕራፍ አንድ	3
1. የ2025 የክረምት ወቅት የአየር ጠባይ ግምገማ	3
1.1 መግቢያ	3
1.2 የ2025 የክረምት ወቅት የአየር ጠባይ ግምገማ	3
1.3 በ2025 በክረምት ወቅት የነበረው የአየር ጠባይ ከተተነበየው ጋር ሲነጻጸር	4
ምዕራፍ ሁለት	5
2. የ2025/26 በበጋ ወቅት የአየር ጠባይ አዝማሚያ	5
2.1 መግቢያ	5
2.2 የበጋ ወቅት የዝናብ አማካይ ገጽታ	5
2.3 የበጋ ወቅት የዝናብ ድርሻ	7
2.4 2025 የበጋ ወቅት የአየር ጠባይ ትንበያ	8
2.5 እ.ኤ.አ የ2025/26 የበጋ ወቅት በክልሎች የሚጠበቀው የአየር ጠባይ	9
.....	14
ምዕራፍ ሶስት	18
3.1 2025 የክረምት ወቅት የነበረው የአየር ጠባይ በግብርና ስራ እንቅስቃሴ ላይ ያሳደረው ተፅዕኖ	18
3.2 በ2025 የክረምት ወቅት የነበረው የአየር ጠባይ በውሃው ዘርፍ ላይ ያሳደረው ተፅዕኖ	19
3.3 በ2025 የክረምት ወቅት የአየር ጠባይ በጤናው ዘርፍ ላይ ያሳደረው ተፅዕኖ	20
ምዕራፍ አራት	23
4.1 በበጋ 2025/26 ወቅት የሚኖረው የአየር ጠባይ በግብርናው እንቅስቃሴ ላይ ሊያሳድር የሚችለው ተፅዕኖ	23
4.2 በበጋ 2025/26 ወቅት የሚጠበቀው የአየር ጠባይ በውሃው ዘርፍ እንቅስቃሴ ላይ ሊያሳድር የሚችለው ተፅዕኖ	25
4.3 በበጋ 2025 ወቅት የሚኖረው የአየር ጠባይ በጤናው ዘርፍ ላይ ሊያሳድር የሚችለው ተፅዕኖ	27



እ.ኤ.አ የ2025/26 የበጋ ወቅት የአየር ጠባይ አዝማሚያ

2025 የክረምት ወቅት የአየር ጠባይ ግምገማና የ2025/26 የበጋ ወቅት

የአየር ጠባይ አዝማሚያ

አፅህፍት (Executive Summary)

በዚህ ጽሁፍ ውስጥ የ2025 በክረምት የአየር ጠባይ ግምገማና የ2025/26 የበጋ ወቅት የአየር ጠባይ አዝማሚያ በጥልቀትና በዝርዝር ቀርቧል። ስለሆነም በጽሁፍ ውስጥ የተጠቀሱት ዓመታት እ.ኤ.አ ናቸው፡፡

የኢትዮጵያ ሚቴዎሮሎጂ ኢንስቲትዩት በዓመት ሶስት ጊዜ የወቅት ትንበያዎችን በማዘጋጀት ለተለያዩ ባለድርሻ አካላትና ተጠቃሚዎች የትንበያ መረጃዎችን ይሰጣል፡፡

በዚህ መሠረትም ለክረምት 2025 የወቅታዊ ትንበያ ሰጥቶ እንደነበር የሚታወስ ሲሆን፤ በዚያን ጊዜ በተሰጠው ትንበያ መሠረት የክረምት ዝናብ በአብዛኛዎቹ የወቅቱ ዝናብ ተጠቃሚ በሆኑት የመካከለኛውና የደቡብ ትግራይ፣ አፋር፣ ምስራቅ አማራ፣ የሰሜን ሱማሌ እንዲሁም የድሬዳዋና የሀረሪ አካባቢዎች እንዲሁም የምዕራብ ትግራይ፣ የምዕራብ አማራ፣ ቤኒሻንጉል ጉምዝ፣ የምዕራብ ኦሮሚያ፣ ጋምቤላ እና ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ላይ ከመደበኛ በላይ እንደሚሆን፤ በተጨማሪም የመካከለኛውና ምስራቅ ኦሮሚያ፣ የደቡብ ኢትዮጵያ፣ የማዕከላዊ ኢትዮጵያ፣ የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ እና የሲዳማ አካባቢዎች ላይ ዝናቡ መደበኛ እና እና በጥቂት ቦታዎች ላይ ዝናቡ ከመደበኛ በላይ እንደሚሆን ትንበያ ተሰጥቶ ነበር፡፡

በዚህም መሠረት በመጀመሪያዎቹ የክረምት ወራት በአብዛኛዎቹ የክረምት ዝናብ ተጠቃሚ አካባቢዎች ላይ በተለይም ከጁን ወር አጋማሽ ጀምሮ ዝናብ የተስተዋለ እንደነበር ከተሰበሰቡት መረጃዎች ለመረዳት ተችሏል። ይሁንና በአጀማመሩም ከመደበኛው ፊር በተወሰነ ቀናት በደቡብ ምዕራብ ቀድሞ የገባ ሲሆን፤ በአብዛኛው የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ መደበኛ ፈሩን ተክትሎ ጀምሯል። በአጠቃላይ ባለፈው የክረምት ወቅት በሁሉም የክረምት ዝናብ ተጠቃሚ በሆኑት የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ ከመደበኛ በላይ ዝናብ ተመዝግቧል፡፡

በተጨማሪም በመደበኛ ሁኔታ ከፍተኛ የዝናብ መጠንና ሥርጭት በሚጠበቅባቸው የጁላይና የኦገስት ወራቶች ከመደበኛ በላይ ዝናብ የነበረ ሲሆንና፤ በአንዳንድ አካባቢዎች ላይም ቅፅበታዊ ጎርፍ ያስከተለ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ተስተውሏል፡፡ በአጠቃላይ ባለፈው የክረምት ወቅት ዝናብ በበርካታ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ ጥሩ ገጽታ የነበረው ሲሆን፤ በአወጣጥ ረገድ ከአብዛኛው የክረምት ዝናብ ተጠቃሚዎች ላይ ዘግይቶ ይወጣል፡፡ በመሆኑም

እ.ኤ.አ የ2025/26 የበጋ ወቅት የአየር ጠባይ አዝማሚያ

የነበረው የእርጥበት ይዘት በአብዛኛዎቹ መኸር አብቃይ ክፍሎች ላይ የሰብሎችን የውሃ ፍላጎት ያሟላና ለግብርናው እንቅስቃሴ፣ ለመጠጥና ለሀይል አቅርቦት አዎንታዊ ገጽታ እንደነበረው የተሰበሰበው የተተነተኑ መረጃዎች ያመለክታሉ።

በአሁኑ ጊዜ በከባቢ አየርና በውቅያኖሶች ላይ በመታየት ላይ የሚገኙትና ለቀጣዮቹ ወራት በተተነበዩት መረጃዎች ላይ መሰረት ተደርጎ እ.ኤ.አ የ2020/21 እና 2017/18 ዓመታት በቅደም ተከተል ከዘንድሮው የበጋ ወቅት ጋር ተመሳሳይነት እንደሚኖራቸው (Analogue Years) ግንዛቤ ተወስዷል። በዚህም መሰረት በመጨረሻው የበጋ ወራት የምስራቅና የመካከለኛው ፓሲፊክ ውቅያኖስ የላይኛው የወሃ አካላት ከመደበኛ በታች መቀዝቀዝ (ENSO-La Nina) ክስተት ተጽዕኖ ሥር ሆኖ እንደሚቀጥል የትንበያ መረጃዎች ያመለክታሉ። በተጨማሪም የህንድ ውቅያኖስ ከመደበኛው ጋር የተቀራረበ መሞቅ ጋር ተያይዞ የዘንድሮ የበጋው ወቅት (IOD-Neutral) ስር ሊሆን እንደሚችል የትንበያ መረጃዎች ይጠቁማሉ። በተጨማሪም በአትላንቲክ ውቅያኖስ ሰሜናዊ ክፍል እንዲሁም በሜዲትራኒያን ባህር ላይ መደበኛና ከመደበኛው በላይ የባህር ወለል መሞቅ ይታያል። በመጨረሻው በጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው በሆኑት የጉጂ፣ የቦረና፣ የሲዳማ እና የደቡብ ኢትዮጵያ አካባቢዎች መደበኛ፣ የሶማሌ ክልል ደቡባዊ ክፍል ከመደበኛ በታች የዝናብ ሁኔታ እንደሚኖራቸው እንዲሁም በደቡብ ምዕራብ ከመደበኛ በላይ ዝናብ ያገኛሉ። በሌላ በኩል ዝናብ የማይጠበቅባቸው የሰሜን ኢጋማሽ፣ የመካከለኛውና የምስራቅ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ ወቅቱን ያልጠበቀ ዝናብ እንደሚኖር ትንበያ ተሰጥቷል። በተጨማሪም በሰሜን ምስራቅ፣ በምስራቅና በደቡብ ክፍተኛ ቦታዎች ላይ የቀኑ ዝቅተኛ የሙቀት መጠን ከ 5 ዲግሪ ሴልሺየስ በታች እንደሚሆን የሚጠበቅ ሲሆን፣ ከዚሁ ጋር ተያይዞ የውርጭ ክስተት በሚዘወተርባቸው በሰሜን ምስራቅ በመካከለኛው እና በምስራቅ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ ውርጭ የመከሰት ዕድሉ ከፍተኛ እንደሚሆን የትንበያ መረጃዎች ይጠቁማሉ።

ምዕራፍ አንድ

1. የ2025 የክረምት ወቅት የአየር ጠባይ ግምገማ

1.1 መግቢያ

የክረምት ወቅት ከጁን እስከ ሴፕቴምበር ድረስ ያሉትን ወራት የሚያካትት ሲሆን፤ ከደቡብና ደቡብ ምሥራቅ የሀገሪቱ ክፍሎች በስተቀር ለአብዛኛው አካባቢዎች ላይ ዋነኛ የዝናብ ወቅት ነው። በመደበኛ ሁኔታ የክረምት ዝናብ በደቡብ ምዕራብና በምዕራብ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ ከበልግ ወራት ጀምሮ ያለማቋረጥ ዝናብ የሚያገኙ ሲሆንና የሰሜን ምሥራቅ፣ የምሥራቅና የስምጥ ሸለቆ አካባቢዎች ላይ ደግሞ ዘግይቶ በጁላይ መጀመሪያ ሳምንት ይጀምርና ከሴፕቴምበር አጋማሽ በፊት ያቋርጣል። በመሆኑም የክረምት ዝናብ በመጠንና በሥርጭት እንዲሁም በቦታና በጊዜ አንፃር የሚለያይ ሲሆን፤ በጁንና በመስከረም ወራት በተለይም በሰሜን ምስራቅ፣ በምስራቅና በስምጥ ሸለቆ አካባቢዎች ላይ ተለዋዋጭነቱ የካላ ነው። በዚህ ጽሁፍ ውስጥ እ.ኤ.አ በ2025 የክረምት ወቅት በሀገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች ላይ የታየው የዝናብ መጠን በጊዜና በቦታ ሥርጭት አንፃር ተገምግሞ የቀረበ ሲሆን፤ በተለያዩ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴዎች ላይ ያሳደረው አዎንታዊና አሉታዊ ተፅዕኖን በተመለከተም ጠቅለል ባለ መልኩ ሳይንሳዊ ትንታኔ ተደርጓል። ከዚህ በተጨማሪም በክረምት መግቢያ ላይ ለወቅቱ የተሰጠው የአየር ጠባይ አዝማሚያ ትክክለኛነት ከመገምገም ጎን ለጎን በወቅቱ ከመደበኛው ወጣ ባለ መልኩ በተከሰቱት የሚቲዎሮሎጂ ክስተቶች ላይ ዳሰሳ ተደርጓል።

1.2 የ2025 የክረምት ወቅት የአየር ጠባይ ግምገማ

የ2025 ክረምት ወቅት ትንበያ በሚዘጋጅበት ወቅት በዋናነት ታሳቢ የተደረጉት የባህር ወለል ሙቀት (Sea surface temperature) የጥንካሬ መጠንና ሥርጭት ከመደበኛው ጋር ሲነጻጸር ከሚያሳየው ልዩነት (anomaly) እንዲሁም ከዚሁ ጋር ተያይዞ የሚከሰቱትን የከባቢ አየር ክስተቶች (Atmospheric conditions) ከግንዛቤ ውስጥ በማስገባት ነበር። በመሆኑም ባላፉት የክረምት ወራት የትሮፒካል ፓስፊክ ውቅያኖስ የባህር ወለል ከመደበኛው ጋር የተቀራረበ (ENSO- Neutral) እንዲሁም የሰሜን ህንድ ውቅያኖስ ከመደበኛው ጋር የተቀራረበ (ENSO- IOD) የተስተዋለበት ሲሆን፤ ይህም ክስተት ለክረምቱ ዝናብ መጠናከር አዎንታዊ አስተዋጽኦ እንደነበረው ግንዛቤ ተወስዷል። በተጨማሪም የክረምት ወቅት እንደተጠበቀው በደቡብ ምዕራብና በምዕራብ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ በተወሰኑ ቀናት ቀደም



እ.ኤ.አ የ2025 የክረምት ወቅት የአየር ጠባይ ግምገማ

ብል የጀመረ ሲሆን፤ በአብዛኛው የክረምት ዝናብ ተጠቃሚ አካባቢዎች ላይ መደበኛ ፈሩን ተከትሎ ጀምሯል። በተጨማሪም ለክረምት ወቅት በተሰጠው ትንበያ መሰረት በአብዛኛው የሀገሪቱ የክረምት ዝናብ ተጠቃሚ አካባቢዎች ላይ ዝናቡ በመስፋፋትና በመጠናከር የተሻለ ገጽታ ሊኖረው እንደሚችል ከመገለጹም በላይ በተለያዩ ቦታዎች ላይ ከባድ ዝናብ ሊያጋጥም እንደሚችል መጠቀሙ ይታወቃል።

በአወጣጥ ረገድ ግን ከምዕራብ፣ ከመካከለኛው፣ ከምሥራቅና ከሰሜን ምስራቅ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ መዘግየት አሳይቷል።

1.3 በ2025 በክረምት ወቅት የነበረው የአየር ጠባይ ከተተነበየው ጋር ሲነጻጸር

ለ2025 የክረምት ወቅት በተሰጠው ትንበያ በተለይም የክረምት ዝናብ በአብዛኛዎቹ የወቅቱ ዝናብ ተጠቃሚ በሆኑት የመካከለኛውና የደቡብ ትግራይ፣ አፋር፣ ምስራቅ አማራ፣ የሰሜን ሱማሌ እንዲሁም የድሬዳዋና የሀረሪ አካባቢዎች እንዲሁም የምዕራብ ትግራይ፣ የምዕራብ አማራ፣ ቤኒሻንጉል ጉምዝ፣ የምዕራብ ኦሮሚያ፣ ጋምቤላ እና ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ላይ ከመደበኛ በላይ እንደሚሆን፤ በተጨማሪም የመካከለኛውና ምስራቅ ኦሮሚያ፣ የደቡብ ኢትዮጵያ የማዕከላዊ ኢትዮጵያ የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ እና የሲዳማ አካባቢዎች ላይ ዝናቡ መደበኛ እና እና በጥቂት ቦታዎች ላይ ዝናቡ ከመደበኛ በላይ የዝናብ መጠን እንደሚያገኙ የክረምት ወቅት ከመጀመሩ በፊት መገለጹ የሚታወስ ነው።

በዚህም መሰረት ክረምት ዋነኛ የዝናብ ወቅታቸው በሆኑት በደቡብ ምዕራብ በመካከለኛው፣ በሰሜን ምስራቅ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ ከመደበኛ በላይ ዝናብ ያገኙ ሲሆን፤ የምዕራብ እና ምስራቅ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ ከመደበኛ ጋር የተቀራረበ ዝናብ አግኝተዋል። ባለፈው የክርምት ወቅት በ521 ጣቢያዎች ላይ በቀን ውስጥ ከ30 እስከ 185 ሚ ሜ የሚደርስ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ የተመዘገበ ሲሆን፤ በ22 ጣቢያዎች ላይ አዲስ የዝናብ መጠን ተመዝግቧል። በተጨማሪም በአብዛኛው አካባቢዎች ላይ ተከታታይነት ያለው ከባድ መጠን ያለው ዝናብ የተመዘገበ ሲሆን ይህም ሁኔታ ለቅጽበታዊ ኅርፍ እና መሬት መንሸራተት አስከትሏል። ይህም ሁኔታ በግብርናው፣ በሰው ህይወት እና በተለያዩ መሰረተ ልማቶች ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ እንዳደረሰ የተሰበሰቡ መረጃዎች ያመለክታሉ። በአጠቃላይ ለክረምት 2025 ወቅቱ የተሰጠው ትንበያ 79.7 ከመቶ ትክክል መሆኑን በተሰበሰቡት መረጃዎች ላይ ሳይንሳዊ ትንታኔ በማድረግ ለመገንዘብ ተችሏል (ካርታ 1ሐ)

::



እ.ኤ.አ የ2025/26 የበጋ ወቅት የአየር ጠባይ አዝማሚያ

ምዕራፍ ሁለት

2. የ2025/26 በበጋ ወቅት የአየር ጠባይ አዝማሚያ

2.1 መግቢያ

የበጋ ወቅት ከአክቶብር እስከ ጃንዋሪ ያሉትን ወራት የሚያካትት ሲሆን፤ ለደቡብና ደቡብ ምሥራቅ የሀገሪቱ አካባቢዎች ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው ነው። በበጋ ወቅት ከዓመታዊ የዝናብ መጠኑ እስከ 45% የሚደረሰውን የሚሸፍን ሲሆን ከበልግ ቀጥሎ የተሻለ ዝናብ የሚኖርበት ወቅት ነው። በወቅቱ ከሚኖረው የዝናብ መጠን ከፍተኛውን ድርሻ የሚይዘው በአክቶብር እና በመጀመሪያዎቹ በኖቬምበር አስር ቀናት የሚጥለው ዝናብ ነው። በዚህ ወቅት ከፍተኛ መጠን ያለው የዝናብ መጠን የሚኖረው በደቡብ እና በደቡብ ምስራቅ አካባቢዎች ላይ ነው። በተጨማሪ በሀገሪቱ ምዕራባዊ ክፍሎች ላይ በአክቶብርና በኖቬምበር ወራት ዝናብ የሚያገኙበት ወቅት ነው። በመደበኛ ሁኔታ በሀገሪቱ ደቡባዊ አጋማሽ ላይ የበጋ ወቅት ዝናብ ከአክቶብር መጀመሪያዎቹ ቀናቶች ጀምሮ መዝነብ የሚጀምር ሲሆን፤ በአወጣጥ ረገድ ደግሞ ከኖቬምበር አጋማሽ በኋላ ነው። ጠቅለል ባለ መልኩ ሲታይ በበጋ ወቅት ደረቅ፣ ፀሀያማ፣ ጠንካራ ነፋስና ቀዝቃዛ ሌሊት የሚስተዋልበት ጊዜ ሲሆን፤ በተለይም በሰሜን፣ ሰሜን ምሥራቅ፣ ምሥራቅ፣ መካከለኛው፣ ደቡብ ደጋማ ስፍራዎችና በስምጥ ሸለቆ ውስጥ በሚገኙ ቦታዎች ላይ የሌሊትና የማለዳ ቅዝቃዜ የሚዘወተር ሲሆን፤ የቀኑ ዝቅተኛ የሙቀት መጠንም አልፎ አልፎ ከ 5 ዲግሪ ሴልሲየስ በታች ሆኖ ይመዘገባል። በአንጻሩ ደግሞ በአንዳንድ ዓመታት ዝናብ ሰጪ ክስተቶች በህዳርና በታህሣሥ ወራት ወቅታዊ ያልሆነ ዝናብ እንዲኖር አስተዋጽኦ ስለሚያደርጉ በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ በሰብል ስብሰባ ወቅት አሉታዊ ተፅዕኖ ያሳድራል።

2.2 የበጋ ወቅት የዝናብ አማካይ ገጽታ

የበጋ ወቅት ከአክቶብር እስከ ጃንዋሪ ያሉትን አራት ወራት የሚያጠቃልል ቢሆንም፤ ከወቅቱ አጠቃላይ የዝናብ መጠን ከፍተኛ ድርሻ የሚይዘው በአክቶብር እና በኖቬምበር የሚዘንበው ዝናብ ነው (ካርታ 3 ሀ እና ለ) ።

በአክቶብር የዝናቡ መጠንና ሥርጭት የበጋውን ዝናብ በመደበኛነት የሚያገኙትን የደቡብና የደቡብ ምሥራቅ አካባቢዎችን ጨምሮ በደቡብ ምዕራብ፣ በመካከለኛው፣ በምሥራቅና በምዕራብ ኢትዮጵያ ላይ ከቀሪዎቹ የበጋ ወራት በተሻለ መልኩ ዝናብ ይኖራል

እ.ኤ.አ የ2025/26 የቦጋ ወቅት የአየር ጠባይ አዝማሚያ

(ካርታ 2 ሀ)። በዝናብ ቀናት ረገድም የአማራ ምዕራባዊ አጋማሽና የቤንሻንጉል-ጉሙዝ አካባቢዎች ከ10-15 ቀናት ያህል ዝናብ የሚያገኙ ሲሆን፤ በመጠን 100-150 ሚ.ሜ ዝናብ የሚያገኙ ሲሆን፤ የምዕራብ ኦሮሚያ፣ የአርሲ፣ የባሌ፣ የጉጂ ዞኖችና የቦረና ዞኖች፤ የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል ዞኖች፤ የሲዳማ ክልል ዞኖች፤ ደግሞ ከ15-25 ቀናት ያህል ዝናብ ያገኛሉ። በመጠንም ረገድ 100-200 ሚ.ሜ ዝናብ የሚያገኙ ሲሆን፤ የማዕከላዊና የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ዞኖች ከ50-150 ሚ.ሜ ዝናብ ያገኛሉ። በተጨማሪም ምስራቅ አማራ፣ ደቡብ ሶማሌ ከ5-10 ቀናት ያህል ዝናብ የሚኖራቸው ሲሆን በመጠን 50-100 ሚ.ሜ ዝናብ የሚያገኙ ሲሆን፤ አብዛኛው ትግራይ፣ መካከለኛው ኢትዮጵያ፣ ምስራቅ ኦሮሚያና አፋር፣ የሶማሌ ሰሜናዊ ክፍልና የምሥራቅ ሸዋ አካባቢዎች እስከ 5 ቀናት ያህል ዝናብ የሚያገኙ ሲሆን በመጠን 3-25 ሚ.ሜ ዝናብ ያገኛሉ። በደቡብና በደቡብ ምሥራቅ ስፍራዎች ላይ የሚዘንበው ዝናብ ከሀገሪቱ ደቡብ ምዕራብ ክፍል ጋር ሲነጻጸር አነስተኛ ቢሆንም፤ ለአካባቢው ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ይኖረዋል።

በኖቬምበር የቦጋው ዝናብ በአብዛኛው በደቡብና ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ላይ የሚወሰን በመሆኑ (ካርታ 2 ለ) የደቡብ ኦሮሚያ፣ የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል ዞኖች፣ የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ዞኖች፣ የሲዳማ ዞኖች ከ5-10 ቀናት ዝናብ የሚኖራቸው ሲሆን በመጠን ከ 50-100 ሚ.ሜ የሚደርስ ዝናብ ያገኛሉ። በተጨማሪም የሶማሌ ደቡባዊ ክፍል ከ5-10 ቀናት ዝናብ የሚያገኝ ሲሆን፤ የተቀሩት የሰሜን ምሥራቅ እና የምዕራብ ቆላማ አካባቢዎች ከ2 ለማይበልጡ ቀናት አነስተኛ ዝናብ የሚያገኙ ሲሆን፤ በመጠን 3-25 ሚ.ሜ ዝናብ ያገኛሉ።

የዲሴምበር ወር ደረቅ የአየር ሁኔታ የሚያመዝነበት ቢሆንም፤ አልፎ አልፎ ከሚጠናከሩት የአየር ሁኔታ ክስተቶች ላይ በመነሳት ለጥቂት ቀናት መጠነኛ ዝናብ ይስተዋልበታል (ካርታ 2 ሐ)። በዚህም መሠረት በወሩ ውስጥ የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል ዞኖች፣ የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ዞኖች፣ የሲዳማ ዞኖች በአብዛኛው ቦታዎች ላይ ከ5-10 ቀናት ያህል የሚዘንብ እና በመጠን 26-100 ሚ.ሜ ዝናብ የሚያገኙ ሲሆን፤ የተቀሩት አብዛኞቹ የሀገሪቱ አካባቢዎች ግን በአብዛኛው ደረቃማ የአየር ሁኔታ ይዘወተርባቸዋል።

በጃንዋሪ የበልግ ዝናብ ሰጪ ክስተቶች መፈጠርና መጠናከር ጋር በተያያዘ በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል ዞኖች፣ በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ዞኖች፣ በሲዳማ ዞኖች እና በደቡብ ኦሮሚያ ደቡባዊ ክፍል ላይ መጠነኛ ዝናብ መጣል ይጀምራል (ካርታ 3 መ) የዝናብ መጠኑም ከ26-50 ሚ.ሜ ዝናብ ያገኛሉ (ካርታ 2 መ)። እንዲሁም በየአካባቢዎቹ የሚኖረው

እ.ኤ.አ የ2025/26 የበጋ ወቅት የአየር ጠባይ አዝማሚያ

የዝናብ መጠን ሥርዓት ከ5-10 ቀናት ያህል ሲሆን፤ በሰሜን ምሥራቅ የአማራ ክልል የበልግ አብቃይ አካባቢዎች ላይ እስከ 5 ቀናት ያህል ያገኛሉ፡፡

በአጠቃላይ በመደበኛ ሁኔታ በበጋው ወቅት ከ300-500 ሚ.ሜ የዝናብ መጠን የሚጥለው በደቡብና ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ እንዲሁም በደቡብ ምሥራቅ አካባቢዎች ደግሞ ከ100-200ሚ.ሜ ዝናብ ያገኛሉ፡፡ በሌላ በኩል በአንጻሩ የሀገሪቱ ሰሜናዊ ክፍልን ጨምሮ የመካከለኛውና የምሥራቅ ኢትዮጵያ አካባቢዎች በአብዛኛው ከ21-100 ሚ.ሜ የሚደርስ ዝናብ ይኖራቸዋል (ካርታ 2 ሠ) ።

ከላይ በዝርዝር የተገለጹት አማካይ የዝናብ መጠን በቦታና በጊዜ አንጻር ያላቸው ሥርዓት ቢሆንም፤ በበጋ ወቅት ከሚታየው ከፍተኛ የዝናብ ሁኔታ ተለዋዋጭነት አንጻር ብዙውን ጊዜ ከእርጥበታማው የአየር ጠባይ ይልቅ ደረቅ ሁኔታ ያመዘነ ይሆናል፡፡ ከዚህም ሌላ በበጋው ወቅት በመደበኛ ሁኔታ ደረቅ፣ ፀሃያማና ነፋሻማ የአየር ጠባይ የሚስተዋል ሲሆን፤ የሌሊትና የማለዳው ቅዝቃዜም በተለይም በሰሜናዊ አጋማሽ፣ በምስራቅና በደቡብ ደጋማ አካባቢዎች ላይ ያይላል፡፡

2.3 የበጋ ወቅት የዝናብ ድርሻ

የበጋ ወቅት ከአክቶበር እስከ ጃንዋሪ ያሉትን አራት ወራት የሚያጠቃልል ቢሆንም ከወቅቱ አጠቃላይ ዝናብ ከፍተኛ ድርሻ የሚኖረው በአክቶበር እና በኖቬምበር የሚዘንበው ዝናብ ነው፡፡

በአክቶበር ወር የሚኖረው የዝናብ መጠን ከበጋው ወቅት ዝናብ ድርሻ አኳያ በምዕራብ ኢትዮጵያ ላይ ከ40 እስከ 50% የሚደርስ የዝናብ ድርሻ የሚያገኙ ሲሆን በተጨማሪም በአንጻንድ ቦታዎች ላይ ከ50% በላይ ዝናብ ያገኛሉ፡፡ በሌላ በኩል ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው በሆኑት የደቡብ ምሥራቅ አካባቢዎች ከ30% እስከ 40% እንዲሁም የደቡብና፣ የመካከለኛው፣ በምሥራቅ የሀገሪቱ ክፍሎች እስከ 30% የሚሆነውን የዝናብ ድርሻ ያገኛሉ (ካርታ 3ሀ)፡፡

በኖቬምበር የሚኖረው የዝናብ መጠን ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው በሆኑት የደቡብና የደቡብ ምሥራቅ አካባቢዎች ከበጋው ወቅት ዝናብ ድርሻ እስከ 40% የሚያገኙ ሲሆን የመካከለኛውና የምሥራቅ የሀገሪቱ ክፍሎች ደግሞ እስከ 20% የሚሆነውን የዝናብ ድርሻ ያገኛሉ (ካርታ 3ለ) ።

የዲሴምበር ወር በደረቅ የአየር ጠባይ የሚዘወተር ቢሆንም፤ አልፎ አልፎ ከሚፈጠሩት የአየር ሁኔታ ክስተቶች ላይ በመነሳት ለጥቂት ቀናት መጠነኛ ዝናብ የሚስተዋልበት ከመሆኑ

ጋር ተያይዞ ከበጋው ወቅት ዝናብ ድርሻ አኳያ በአብዛኛው የደቡብና የምስራቅ የሀገሪቱ ክፍሎች ከ20% እስከ 30% የሚደርስ የዝናብ ድርሻ ያገኛሉ (ካርታ 3ሐ)። በተመሳሳይ በጃንዋሪ የመካከለኛውና የምስራቅ የሀገሪቱ ክፍሎች እስከ 30% የሚሆነውን የወቅቱን የዝናብ ድርሻ ያገኛሉ (ካርታ 3መ)።

በአጠቃላይ በመደበኛ ሁኔታ የበጋው ወቅት የዝናብ ድርሻ ከዓመታዊ የዝናብ ድርሻ ከ30% እስከ 40% የሚደርስ በደቡባዊ የሀገሪቱ አጋማሽ የሚያገኙ ሲሆን፤ በጥቂት የደቡብ ሶማሌ አካባቢዎች ደግሞ ከ40% እስከ 55% ድረስ የሚያገኙ ሲሆን በአንጻሩ ደግሞ በምዕራብና በምስራቅ ኢትዮጵያ ከ10% እስከ 20% የሚደርስ ዝናብ ያገኛሉ (ካርታ 3ሠ) ።

2.4 2025 የበጋ ወቅት የአየር ጠባይ ትንበያ

ለዘንድሮ የበጋ ወቅት የአየር ጠባይ ትንበያ ከመስጠቱ አስቀድሞ በትሮፒካል ፓስፊክ ውቅያኖስ ምሥራቃዊ ክፍል ላይ ቀደም ባሉት ወራት የነበረውና በመጨረሻ የበጋ ወቅት የሚኖረው የባህር ወለል ሙቀት ሂደት ላይ ሳይንሳዊ ትንታኔና ጥናት ተደርጓል። በመጨረሻ የበጋ ወራት የምስራቅና የመካከለኛው ፓስፊክ ውቅያኖስ የላይኛው የወሃ አካላት ከመደበኛ በታች መቀዝቀዝ (ENSO-La Nina) ክስተት ተጽዕኖ ሥር ሆኖ እንደሚቀጥል የትንበያ መረጃዎች ያመለክታሉ። በተጨማሪም የህንድ ውቅያኖስ ከመደበኛው ጋር የተቀራረበ መሞቅ ጋር ተያይዞ የዘንድሮ የበጋው ወቅት (IOD- Neutral) ስር ሊሆን እንደሚችል የትንበያ መረጃዎች ይጠቁማሉ። በተጨማሪም በአትላንቲክ ውቅያኖስ ሰሜናዊ ክፍል እንዲሁም በሜዲትራኒያን ባህር ላይ መደበኛና ከመደበኛው በላይ የባህር ወለል መሞቅ ይታያል።

ከዚህ ጋር ተያይዞም በመጨረሻ በጋ በሀገሪቱ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው በሆኑት የቦረናና ጉጂ ዞኖች፤ ሲዳማ እና ደቡብ ኢትዮጵያ መደበኛ ዝናብ የሚኖራቸው ሲሆን፤ የሶማሌ ክልል ደቡባዊ ክፍል ደግሞ ከመደበኛ በታች የሆነ የዝናብ መጠንና ስርጭት ይኖራቸዋል። በሌላ በኩል የምዕራብና ደቡብ ምዕራብ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ መደበኛና ከመደበኛ በላይ ዝናብ ያገኛሉ። በተጨማሪም በአሁኑ ወቅት እየተስተዋለ ከሚገኙት የአየር ሁኔታ ክስተቶች ላይ በመነሳት በሰሜን፤ በመካከለኛው፤ በምስራቅና በሰሜን ምዕራብ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ ወቅቱን ያልጠበቀ ዝናብ ይኖራል (ካርታ 4)። በሌላ በኩል የቀኑ ዝቅተኛ የሙቀት መጠን በሰሜን ምስራቅ፤ መካከለኛውና በምስራቅ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ አልፎ አልፎ ከ5 ዲግሪ ሴልሽየስ በታች እንደሚሆንና ይህም ሁኔታ ውርጭ እንደሚያስከትል በትንበያው ተመላክቷል።

እ.ኤ.አ የ2025/26 የቦጋ ወቅት የአየር ጠባይ አዝማሚያ

በመጨረሻው ቦጋ የአየር ጠባይ ትንበያ አሰጣጥ ይረዳ ዘንድ በአሁኑ ጊዜ እየታዩ ያሉትና ወደፊት ሊታዩ የሚችሉት የሚቲዎሮሎጂ ክስተቶችን ቀደም ሲል ከታዩት ክስተቶች ጋር በማነጻጸር ተመሳሳይ ዓመታት (Analogue Years) መረጣ ተደርጓል። በዚህም መሠረት መጨረሻው የቦጋ ወቅት እ.ኤ.አ ከ2020/21 እና ከ2017/18 ዓመታት ጋር በቅደም ተከተል ተቀራራቢነት እንደሚኖረው ከመረጃዎች መረዳት ተችሏል።

በመሆኑም የመጨረሻው የቦጋ ወቅት የቤንሻንጉል-ጉሙዝ፣ የምዕራብ ኦሮሚያ፣ የጋምቤላ እና የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ አካባቢዎች መደበኛና ከመደበኛ በላይ ዝናብ የሚያገኙ ሲሆን፣ የአማራ፣ የትግራይ፣ የአፋር ክልል፣ የሱማሌ ክልል፣ የማዕከላዊ ኢትዮጵያ፣ እንዲሁም የመካከለኛውና የምስራቅ ኦሮሚያ ዞኖች ወቅቱን አልፎ አልፎ በሚኖሩት ቀናት ወቅቱን ያልጠበቀ ዝናብ በደረሱ ሰብሎች ላይ ተጽዕኖ እንዳይደርስ በወቅቱ መሰብሰብ ያስፈልጋል። በተጨማሪም የቦጋ ወቅት የዝናብ አጀማመር በደቡብ ኢጋማሽ አካባቢዎች ላይ መደበኛ ፈሩን ተከትሎ የሚጀምር ሲሆን በአወጣጥ ረገድ ግን ቀድሞ ይወጣል።

በሚቀጥለው የቦጋ ወቅት የሚጠበቀውን የአየር ጠባይ ትንበያን ከግንዛቤ ውስጥ በማስገባትና የሚገኘውን የዝናብ መጠንና ስርጭት በአግባቡ በመጠቀም ለግጥሽ ሳርና ለመጠጥ ውሃ እንዲሁም ለማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ሥራዎችን ከባለሙያዎች ጋር በመመካከር ማከናወን ያስፈልጋል።

2.5. እ.ኤ.አ የ2025/26 የቦጋ ወቅት በክልሎች የሚጠበቀው የአየር ጠባይ

2.5.1. አፋር

በመደበኛ ሁኔታ ቦጋ በአፋር አብዛኛው ክፍል ላይ ደረቅና ሞቃታማ የአየር ሁኔታ የሚያመዝንበት ወቅት ነው። ነገር ግን አልፎ አልፎ ወቅታዊ ያልሆነ ዝናብ ለጥቂት ቀናት ይስተዋልበታል።

በመጨረሻው የቦጋ ወቅት በክልሉ ሁሉም የክልሉ ዞኖች ላይ ደረቅ፣ ሞቃታማና ነፋሻማ የአየር ሁኔታ በአንፃራዊነት እንደሚጨምር ይጠበቃል። በሌላ በኩል ከሚጠናከሩት የሚቲዎሮሎጂ ክስተቶች ጋር ተያይዞ አልፎ አልፎ በኖቬምበር እና በዲሴምበር ወር በሚኖሩት ቀናቶች ወቅቱን ያልጠበቀ ዝናብ ይኖራል (ካርታ 4)።

2.5.2. ትግራይ

በትግራይ ክልል በመደበኛ ሁኔታ የበጋው ደረቅ የአየር ሁኔታ የሚያመዝንበት ወቅት ቢሆንም በክልሉ ምዕራባዊ አጋማሽ ላይ ዝናቡ እስከ ሴፕቴምበር መጨረሻ ድረስ በተዳከመ ሁኔታ ይቀጥላል። ከዚህም ሌላ በበጋ ወቅት ወቅታዊ ያልሆነ ዝናብ በኖቬምበርና በዲሴምበር ወራት ለተወሰኑ ቀናት ይታይበታል።

በመጨረሻው የበጋ ወቅት በክልሉ በአብዛኛው ክፍሎች ላይ የበጋው ደረቅ አየር ጠባይ በአንፃራዊነት እንደሚጨመር ይጠበቃል። በሌላ በኩል ከሚኖረው የሚቲዎሮሎጂ ክስተቶች መጠናከር ጋር ተያይዞ ወቅቱን ያልጠበቀ ዝናብ በኖቬምበር እና በዲሴምበር ወራቶች አልፎ አልፎ በሚኖሩት ቀናቶች ወቅቱን ያልጠበቀ ዝናብ እንደሚኖር የተተነተኑ የሚቲዎሮሎጂ መረጃዎች ያሳያሉ (ካርታ 4)።

2.5.3 አማራ

በመደበኛ ሁኔታ በክልሉ ምዕራባዊ አጋማሽ የክረምቱ ዝናብ እስከ ኦክቶበር አጋማሽ ድረስ በተዳከመ ሁኔታ የሚቀጥል ሲሆን፤ በክልሉ ምሥራቃዊ አጋማሽ ላይ ግን በአብዛኛው ደረቅ የአየር ሁኔታ አመዝኖ ይቆያል። ይሁንና በበጋ ወቅት አልፎ አልፎ ወቅታዊ ያልሆነ ዝናብ በክልሉ በተለያዩ አካባቢዎች ላይ ይኖራል። በአጠቃላይ በክልሉ በመደበኛ ሁኔታ በበጋ ደረቅ፣ ፀሃያማና ነፋሻማ የአየር ጠባይ የሚያመዝንበት እንዲሁም ሌሊትና ማለዳ ላይ ቅዝቃዜ የሚዘወተርበት ወቅት ነው። ስለሆነም በአንዳንድ ደጋማ ቦታዎች ላይ የውርጭ ክስተትም ይስተዋላል።

በመጨረሻው የበጋ ወቅት በምሥራቅ አማራ በሚገኙት የሰሜን ሸዋ፣ የዋግህምራ፣ የሰሜንና የደቡብ ወሎ ዞኖች የኦሮሚያ ልዩ ዞንን ጨምሮ የቀኑ ዝቅተኛ የሙቀት መጠን አልፎ አልፎ ከ5 ዲግሪ ሴልሺየስ በታች እንደሚሆንና ይህም ሁኔታ ለውርጭ መከሰት አስተዋጾ እንደሚያደርግ የትንበያ መረጃ ያመላክታል። በሌላ በኩል በክልሉ ዞኖች አልፎ አልፎ ከሚጠናከሩት የአየር ሁኔታ ክስተቶች ላይ በመነሳት ከኖቬምበር አጋማሽ በዋላ አልፎ አልፎ በሚኖሩት ቀናተ ወቅቱን ያልጠበቀ ዝናብ እንደሚኖራቸው ይጠበቃል (ካርታ 4)።

2.5.4. ቤንሻንጉል ጉሙዝ

በመደበኛ ሁኔታ የክረምቱ ዝናብ እስከ ኦክቶበር መጨረሻ ቀናት ድረስ ስለሚቆይ የክልሉ አብዛኛው ክፍል በመደበኛነት ዝናብ የሚኖራቸው ሲሆን፤ በቀሪዎቹ የበጋ ወራት ደግሞ በአመዛኙ ደረቅና ሞቃታማ የአየር ሁኔታ አመዝኖባቸው ይቆያል።

በዘንድሮው የበጋ ወቅት ክልሉ በአብዛኛው መደበኛና ከመደበኛ በላይ የሆነ ዝናብ መጠን እንደሚያገኙ ይጠበቃል (ካርታ 4)።

2.5.5 ጋምቤላ

የክልሉ አብዛኞቹ አካባቢዎች በአክቶበር በመደበኛው ሁኔታ ዝናብ የሚያገኙ ሲሆን፤ በቀሪዎቹ የበጋ ወራት በአብዛኛው ደረቅና ሞቃታማ የአየር ሁኔታ ያመዝንባቸዋል። ከዚህም ሌላ በክልሉ አብዛኛውን ጊዜ በዲሴምበርና በጃንዋሪ ደረቅ ሁኔታ የሚያመዝንበት በመሆኑ የቀኑና የሌሊቱ የሙቀት መጠን በጎሳ መልኩ ይጨምራል።

በመጨረሻው የበጋ ወቅት በጋምቤላ የሚገኙት ሁሉም የክልሉ ዞኖች በአብዛኛው መደበኛና ከመደበኛ በላይ የዝናብ መጠን እንደሚያገኙ ይጠበቃል (ካርታ 4)።

2.5.6 አሮሚያ

በመደበኛ ሁኔታ የአሮሚያ ክልል ምዕራባዊ አጋማሽ ምንም እንኳን ከፍተኛ መጠን ያለው ዝናብ የሚያገኘው በክረምት ወቅት ቢሆንም፤ በአክቶበርና በኖቬምበር ወራትም ቀጣይነት ያለው ዝናብ ያገኛሉ። የመካከለኛውና የምሥራቅ የክልሉ አካባቢዎችም በአክቶበር አልፎ አልፎ ለተወሰኑ ቀናት መጠነኛ ዝናብ የሚኖራቸው ቢሆንም፤ በቀሪዎቹ ወራት በአመዛኙ ደረቅ ሆነው ይቆያሉ። በአንጻሩ የክልሉ ደቡባዊ ክፍል ማለትም የባሌ፣ የጉጂና የቦረና ዞኖች ከሴፕቴምበር አጋማሽ በኋላ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው በመሆኑ በመደበኛ ሁኔታ ዝናብ ያገኛሉ። በዚህ ወቅት የሚኖረው የዝናብ መጠንና ሥርጭት በተለይም ለባሌ ደቡባዊ ክፍል፣ ለጉጂና ለቦረና ዞኖች የሚኖረው ዝናብ ጠቀሜታው እጅግ የጎሳ ነው። በሌላ በኩል ደግሞ በበጋው ወቅት በአካባቢው ደጋማ ሥፍራዎች ከሚዘወተሩት የአየር ሁኔታዎች መካከል የሌሊትና ማለዳ ቅዝቃዜ ሲሆን፤ በተለይም በምስራቅ፣ በመካከለኛውና በደቡብ ደጋማ ስፍራዎች ላይ የሚኖረው ቅዝቃዜ ውርጭ ያስከትላል።

በመጨረሻው የበጋ ወቅት የወቅቱን ዝናብ በመደበኛነት የሚያገኙት የባሌ፣ የጉጂና የቦረና አካባቢዎች ከመደበኛ ጋር የተቀራረበ እና በጥቂት ቦታዎች ላይ ከመደበኛ በታች ዝናብ እንደሚኖራቸው ይጠበቃል። በተጨማሪም የክልሉ ምዕራባዊ ክፍል መደበኛና ከመደበኛ በላይ ዝናብ ያገኛሉ። በሌላ በኩል የክልሉ መካከለኛውና ምሥራቃዊ ዞኖች ከሚጠናከሩት የሚቲዎሮሎጂ ክስተቶች ጋር ተያያዘ አልፎ አልፎ በሚኖሩት ቀናት ወቅቱን ያልጠበቅ ዝናብ ያገኛሉ (ካርታ 4)።

2.5.7. ደቡብ ኢትዮጵያ ክልል

በጋ ከበልግ ቀጥሎ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው ሲሆን፤ በወቅቱ በመደበኛ ሁኔታ ከሚጠበቀው የዝናብ መጠንና ሥርጭት አክቶበር ከፍተኛውን ድርሻ ሲይዝ ዝናቡ እስከ ኖቬምበር መጨረሻ ድረስ በተዳከመ መልኩ ይቀጥላል። በመጨረሻው የበጋ ወቅት የክልሉ አብዛኛው ክፍል ከመደበኛው ጋር የተቀራረበ ዝናብ ያገኛል (ካርታ 4)።

2.5.8. ማዕከላዊ ኢትዮጵያ

የክልሉ አብዛኛው ክፍል እስከ ሴፕቴምበር መጨረሻ ሳምንት ድረስ ዝናብ የሚያገኙ ሲሆን፤ በበጋው ወራት አልፎ አልፎ ከመደበኛው ሁኔታ ወጣ ባለ መልኩ ከሚኖረው ወቅታዊ ያልሆነ ዝናብ በስተቀር ብዙውን ጊዜ ደረቅ፣ ፀሃያማና ነፋሻማ የአየር ጠባይ ያመዝንባቸዋል።

በመጨረሻው የበጋ ወቅት አብዛኛው የክልሉ ዞኖች ደረቅ፣ ፀሃያማና ነፋሻማ የአየር ጠባይ ይጠበቃል። በሌላ በኩል ከሚኖረው የሚቲዎሮሎጂ ክስተቶች መጠናከር ጋር ተያይዞ ወቅቱን ያልጠበቀ አልፎ አልፎ በሚኖሩት ቀናት ዝናብ እንደሚኖር የተተነተኑ የሚቲዎሮሎጂ መረጃዎች ያሳያሉ (ካርታ 4)።

2.5.9. የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ

የክልሉ አብዛኞቹ አካባቢዎች በመደበኛ ሁኔታ የክረምቱ ዝናብ እስከ ኖቬምበር መጨረሻ ቀናት ድረስ በመደበኛው ሁኔታ ዝናብ የሚያገኙ ሲሆን፤ በቀሪዎቹ የበጋ ወራት በአብዛኛው ደረቅና ሞቃታማ የአየር ሁኔታ ያመዝንባቸዋል።

በመጨረሻው በጋ ወቅት የክልሉ ምዕራባዊ አጋማሽ የሚገኙት ዞኖች በአብዛኛው መደበኛ ከመደበኛ በላይ ዝናብ ያገኛሉ (ካርታ 4)።

2.5.10. ሲዳማ

ክልሉ በበጋ በመጀመሪያዎቹ ሁለት ወራት በመደበኛ ሁኔታ ዝናብ የሚኖረው ሲሆን፤ በተለይም የክልሉ ደቡባዊ ክፍል የበጋውን ዝናብ በዋነኛነት ያገኛል። በሌላ በኩል ደግሞ የክረምቱን ዝናብ እስከ ሴፕቴምበር መጨረሻ ሳምንት ድረስ ያገኛል።

በመጨረሻው የበጋ ወቅት የክልሉ አብዛኛው ክፍል ከመደበኛው ጋር የተቀራረበ ዝናብ እንደሚያገኝ ይጠበቃል (ካርታ 4)።

2.5.11. ሶማሌ

በጋ ለሶማሌ ደቡባዊ አጋማሽ ከበልግ ቀጥሎ ሁለተኛ የዝናብ ወቅት ሲሆን፤ በወቅቱ በመደበኛ ሁኔታ ከሚጠበቀው የዝናብ መጠንና ሥርጭት አክቶበር ከፍተኛውን ድርሻ ሲይዝ

ዝናቡ እስከ ኖቬምበር አጋማሽ ድረስ በተዳከመ መልኩ ይቀጥላል። ስለሆነም በበጋ ወቅት በክልሉ የሚጠበቀው ዝናብ ለግጦሽና ለውሃ አቅርቦት ከፍተኛ ጠቀሜታ አለው።

በመጨረሻም የበጋ ወቅት የክልሉ አብዛኛው የደቡብና የደቡብ ምዕራቅ ዞኖች ከመደበኛው በታች የሆነ የዝናብ መጠን እንደሚኖር ይጠበቃል። በሌላ በኩል የክልሉ ደቡብ ምዕራብ ዞኖች ከመደበኛው ጋር የተቀራረበ ዝናብ እንደሚያገኝ ይጠበቃል (ካርታ 4)።

2.5.12 አዲስ አበባ

የአዲስ አበባ ከተማ በመደበኛ ሁኔታ እስከ ሴፕቴምበር መጨረሻ ሳምንት ድረስ ዝናብ የሚያገኝ ሲሆን፣ በበጋው ወራት አልፎ አልፎ ከመደበኛው ሁኔታ ወጣ ባለ መልኩ ከሚኖረው ወቅታዊ ያልሆነ ዝናብ በስተቀር ብዙውን ጊዜ ደረቅ፣ ፀሃያማና ነፋሻማ እንዲሁም የሌሊትና ማለዳው ቀዝቃዛ የአየር ጠባይ ይስተዋላል።

በመጨረሻም የበጋ ወቅት በአብዛኛው ደረቅ፣ ፀሃያማና ነፋሻማ የአየር ጠባይ ይጠበቃል። በሌላ በኩል ከሚኖረው የሚቲዎሮሎጂ ክስተቶች መጠናከር ጋር ተያይዞ ወቅቱን ያልጠበቀ ዝናብ አልፎ አልፎ በሚኖሩት ቀናት ይኖራል (ካርታ 4)።

2.5.13 ድሬዳዋ



በድሬዳዋ በበጋ ወቅት በመደበኛነት ደረቅ የአየር ሁኔታ ያመዝናል። ይሁን እንጂ በአካባቢው ከሌሎች ወራት ጋር ሲነጻጸር የተሻለ ዝናብ የሚስተዋልበት ሲሆን፣ በቀሪዎቹ የበጋ ወራት አልፎ አልፎ አነስተኛ ዝናብ ከመኖሩ በስተቀር ከሞላ ጎደል ደረቅ፣ ሞቃታማና ነፋሻማ የአየር ሁኔታ ይዘወተርበታል።

በመጨረሻም የበጋ ወቅት በድሬዳዋ ከተማ ደረቅ፣ ፀሃያማና ነፋሻማ የአየር ጠባይ ይጠበቃል። በሌላ በኩል ከሚኖረው የሚቲዎሮሎጂ ክስተቶች መጠናከር ጋር ተያይዞ ወቅቱን ያልጠበቀ ዝናብ አልፎ አልፎ በሚኖሩት ቀናት እንደሚኖር የተተነተኑ የሚቲዎሮሎጂ መረጃዎች ያሳያሉ (ካርታ 4)።



2.6.14. ሐረሪ

በሐረሪ ክልል በበጋ ወቅት ደረቅ፣ ነፋሻማና ቀዝቃዛ የአየር ሁኔታ ያመዝናል። በሌላ በኩል በአንዳንድ የበጋ ወራት ወቅታዊ ያልሆነ ዝናብ አልፎ አልፎ ይኖራል። በመጨረሻም የበጋ ወራት በሐረሪ የበጋው ደረቅ የአየር ጠባይ ይጠበቃል። በሌላ በኩል ከሚኖረው የሚቲዎሮሎጂ ክስተቶች መጠናከር ጋር ተያይዞ ወቅቱን ያልጠበቀ አልፎ አልፎ በሚኖሩት ቀናት ዝናብ እንደሚኖር የተተነተኑ የሚቲዎሮሎጂ መረጃዎች ያሳያሉ (ካርታ 4)።

እ.ኤ.አ የ2025 የክረምት ወቅት የአየር ጠባይ ግምገማ




ካርታ 10. እ.ኤ.አ 2025 በክረምት ወቅት የነበረው የዝናብ መጠን በሚ.ሜ ካርታ 11. እ.ኤ.አ 2025 በክረምት ወቅት ዝናብ የዘነበባቸው ቀናት ብዛት




ካርታ10. እ.ኤ.አ 2025 በክረምት ወቅት የነበረው የዝናብ መጠን ከመደበኛው ጋር በመቶኛ ሲነፃፀር

ካርታ11. እ.ኤ.አ 2025 በክረምት ወቅት የነበረው የእርጥበት ሁኔታ

የቦጋ ወቅት የረጅም ጊዜ አማካይ የዝናብ መጠን





ካርታ 20 የአክቶበር አማካይ የዝናብ መጠን (በሚ.ሜ)




ካርታ 21 የኖቬምበር አማካይ የዝናብ መጠን (በሚ.ሜ)


የቦጋ ወቅት የረጅም ጊዜ
አማካይ የዝናብ መጠን (በሚ.ሜ)



ካርታ 21 የዲሴምበር አማካይ የዝናብ መጠን (በሚ.ሜ)




ካርታ 22 የጃንዋሪ አማካይ የዝናብ መጠን (በሚ.ሜ)




ካርታ 22 የቦጋ ወቅት የረጅም ጊዜ አማካይ የዝናብ መጠን


የቦጋ ወቅት የረጅም ጊዜ አማካይ የዝናብ ድርሻ




ካርታ 30 የአክቶበር ወቅት የረጅም ጊዜ አማካይ የዝናብ ድርሻ በ %




ካርታ 31 የኖቬምበር ወቅት የረጅም ጊዜ አማካይ የዝናብ ድርሻ በ %




ካርታ 32 የዲሴምበር ወቅት የረጅም ጊዜ አማካይ የዝናብ ድርሻ በ %



ካርታ 33 የጃንዋሪ ወቅት የረጅም ጊዜ አማካይ የዝናብ ድርሻ በ %



ካርታ 34 የቦጋ ወቅት የረጅም ጊዜ አማካይ የዝናብ ድርሻ በ %



ካርታ 4 እ.ኤ.አ በ2025/26 በባጋ ወቅት በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ የሚጠበቀው የዝናብ መጠን በመደበኛ ሁኔታ ከሚኖረው የዝናብ መጠን ጋር በማነፃፀር የመኖር ዕድሉ በመቆኛ



ምዕራፍ ሶስት

3.1 2025 የክረምት ወቅት የነበረው የአየር ጠባይ በግብርና ስራ

እንቅስቃሴ ላይ ያሳደረው ተፅዕኖ

በመደበኛ ሁኔታ የክረምት ወቅት ከደቡብና ደቡብ ምስራቅ የሀገራችን ክፍሎች በስተቀር ለአብዛኛው የመኸር ወቅት የግብርና ስራ እንቅስቃሴ ከፍተኛ ፋይዳ ያለው ወቅት ነው። ባሳለፍነው የክረምት ወቅት የነበረው የእርጥበት ሁኔታ የመኸር ሰብል አምራች ለሆኑትና የክረምት እርጥበትን በመጠቀም ለሚከናወኑት የግብርና፣ የውሃ፣ የአካባቢ ጥበቃ እና ሌሎች ማህበራዊ እና ኢኮኖሚያዊ ስራዎችን ለማከናወን አዎንታዊ ሚና እንደነበረው የተተነተኑ የግብርና ሚኒስቴሮች መረጃዎች ያመለክታሉ (ካርታ 5)። በአንጻሩ ከጁላይ ወር ጀምሮ በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ የተስተዋለው ከባድ እና ተከታታይነት የነበረው ዝናብ በማሳ ዝግጅት፣ በሰብሎች እድገት እና በእንስሳት ልማት ስራዎች ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ የነበረው ሲሆን፣ በተጨማሪም በጥቂት የሰሜን ምዕራብ፣ የሰሜን፣ የሰሜን ምስራቅ፣ የምስራቅ እና የመካከለኛው የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ በአጀማመሩ ረገድ የነበረው የእርጥበት መቆራረጥ እና ተከታታይ ደረቅ ሰሞናት በሰብል ዕድገት ላይ አሉታዊ ጎን እንደነበረው የመስክ ዳሰሳ መረጃዎች ያመለክታሉ። ባጠቃላይ ባሳለፍነው የክረምት ወቅት የነበረው የአየር ጠባይ ካሳደረው አዎንታዊና አሉታዊ ተፅዕኖ መካከል የሚከተሉት ይገኙበታል (ካርታ 5)።

➤ አዎንታዊ ተፅዕኖ

ከሚያዝያና ግንቦት ወራት ጀምሮ ለተዘሩት እንደ በቆሎና ማሽላ ለመሳሰሉ የረጅም ጊዜ የመኸር ሰብሎች የውሃ ፍላጎት እንዲሟላና ዕድገታቸው እንዲቀጥል አዎንታዊ ጎን ነበረው።

❖ ከጁን ወር ጀምሮ ለሚዘሩ ሰብሎች የማሳ ዝግጅት ለማድረግ የሚያስችል በቂ የአፈር ውስጥ እርጥበት እንዲኖር በማስቻል እንደ ስንዴ፣ ገብስ፣ አጃ እና ጤፍ የመሳሰሉትን የብዕር ሰብሎች እንዲሁም የጓሮ አትክሎቶች፣ የጥራጥሬና የቅባት ሰብሎችን ወቅቱን ጠብቆ ለመዝራት ጠቀሜታ ነበረው።

❖ ከክረምቱ አጋማሽ ጀምሮ በሀገራችን በአርንጓዴ አሻራ መርሐ ግብር ለተተከሉ የተለያዩ የዛፍ ችግኞችና ለቋሚ ተክሎች የተሟላ እድግት አዎንታዊ ጎን ነበረው።

❖ የክረምት ዝናብ ተጠቃሚ በሆኑት የምስራቅና የሰሜን ምስራቅ አርብቶ አደርና ከፊል አርብቶ አደር አካባቢዎች ለግጦሽ ሳር፣ ለመጠጥ ውሃ አቅርቦትና ለመኖ ልማት ስራዎች ጠቀሜታ ነበረው።

❖ ከነበረው የተሻለ የግጦሽ ሳር እና የመጠጥ ውሃ አቅርቦት ጋር ተያይዞ የእንስሳት የሰውነት ሁኔታ እንዲጨምርና ጤናማ ቁመና እንዲኖራቸው እና የእንስሳት ተዋፅኦ ምርት እንዲጨምር አስችሏል።

❖ ከአካባቢ ጥበቃ አንፃር የብዝሃ-ሕይወትን በማሻሻል የእፅዋት፣ የአእዋፋት እና የዱር እንስሳት መስተጋብር እንዲሻሻል የጎላ ጠቀሜታ ነበረው።

➤ አሉታዊ ተፅዕኖ

✚ በምዕራብ፣ በደቡብ ምዕራብ፣ በሰሜን ምስራቅና በመካከለኛው የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ የአፈር መሸርሸር፣ የተዘሩ ሰብሎች በጎርፍ መጠረግ፣ በሰብል ማሳዎች ላይ የውሃ መተኛት በማስከተል በሰብል እና በእንስሳት ላይ ጉዳት አድርጓል።

✚ በአሪ ዞን ደቡብ አሪ ወረዳ ከመር ቀበሌ፣ በከምባታ ዞን በአንጋጫ ወረዳ በዞቤሾ ቀበሌ እና በጌዴኦ ዞን በራጴ ወረዳ በጨራቃ ቀበሌ፣ የመሬት መንሸራተት፣ መሰንጠቅና ናዳ ተከስቷል።

✚ በሰሜን ሸዋ በቅንብቢት፣ በመሃል ሜዳ ኤፍራታና ግድም ወረዳ፣ በዋግህምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ጋዝጊብላ ወረዳ፣ በሽሬ እና ቢሾፍቱ አካባቢ፣ በምሁር አክሊል ወረዳ መገራን ቀበሌ፣ በጋምቤላ እና በገዋኔ ወረዳ ቅጽበታዊ ጎርፍና የወንዞች ሙላት በሰብሎች፣ በእንስሳት፣ በንብረትና በሰው ህይወት ላይ ጉዳት አድርጓል።

✚ በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ አልፎ አልፎ የተከሰተው የበረዶ፣ የመብረቅ እና ከባድ ንፋስ በሰብሎች፣ በእንስሳት በንብረት እና በመሰረተ ልማት ላይ ጉዳት አስከትሏል።

3.2 በ2025 የክረምት ወቅት የነበረው የአየር ጠባይ በውሃዉ ዘርፍ ላይ ያሳደረዉ

ተፅዕኖ
Ethiopian Meteorology Institute

ባለፉት የክረምት ወራት በአብዛኛው የዝናብ ተጠቃሚ በሆኑት የአዋሽ፣ የኦሞ ጊቤ፣ የስምጥ ሸለቆ፣ ባሮ አኮቦ፣ አባይ፣ የላይኛው ገናሌ ዳዋ፣ የላይኛውና የመካከለኛው ዋቤ ሸበሌ እንዲሁም የአፋር ደናክል ተፋሰሶች ላይ ከመጠነኛ እስከ ከፍተኛ እርጥበት የነበራቸው የተተነተኑ የውሃ ሚቲዎሮሎጂ መረጃዎች ያመለክታሉ። ይህም ሁኔታ የገፀ ምድርም ሆነ የክርስ ምድር የውሃ ሀብትን ከማማሻሻል አንጻር አዎንታዊ ጎን የነበረው ሲሆን ከዚህም ጋር ተያይዞ አብዛኛዎቹ ግድቦች ከረጅም ጊዜ አማካይ አንጻር ሲታይ ከሚጠበቀው በላይ እና ከሚጠበቀው ጋር የተቀራረበ የውሃ ይዘት እንዲኖራቸው ያስቻለ ነበር። በሌላ በኩል በተለይም ከጁላይ ወር ጀምሮ የተስተዋለው ከባድና ተከታታይነት የነበረው ዝናብ በአባይ፣

በአዋሽ፣ በአዋ ጊቤ፣ በባሮ አኮቦ እና በተከዜ ተፋሰሶች ላይ የገጸ ምድር የውሃ ፍሰት እንዲጨምር በማድረግ ቅፅበታዊ ጎረፍ፣ የወንዞች ሙላትና መጥለቅለቅ፣ የግድቦች ከመጠን በላይ መሙላት በማስከተል በታችኛው የተፋሰሱ አካባቢዎች ላይ በመሰረተ ልማት በንብረት እና በሰው ህይወት ላይ ጉዳት እንዳደረሰ ከመስክ የተሰበሰቡ መረጃዎች ያመለክታሉ (ካርታ 6)። በአጠቃላይ ባሳለፍነው የክረምት ወቅት የነበረው የአየር ጠባይ በተለያዩ ተፋሰሶች ላይ ካሳደረው አዎንታዊና አሉታዊ ተፅዕኖ መሀከል የሚከተሉት ይገኙበታል።

➤ አዎንታዊ ተፅዕኖ

- ❖ የኃይል ማመንጫና የመስኖ ግድቦች በቂ የውሃ መጠን እንዲኖራቸው ያስቻለ ነበር
- ❖ ወንዞች ሀይቆችና የተለያዩ የተፈጥሮም ሆኑ ሰው ሰራሽ የውሃ ማጠራቀሚያዎች የተሻለ የውሃ ይዘት እንዲኖራቸው አስችሏል።
- ❖ ለኃይል አቅርቦትና ስርጭት እንዲሻሻል ያስቻለ ነበረ።
- ❖ የክርሰ ምድር የውሃ መጠን እንዲሻሻል ያደረገ ነበር።
- ❖ የንጹህ የመጠጠጥ ውሃ አቅርቦት ሽፋን እንዲኖር የጎላ ጠቀሜታ ነበረው።
- ❖ ውሃ አጠር በሆኑ አካባቢዎች ከገጸ ምድር እና ከጣራ ላይ የውሃ ማሰባሰብ ተግባራትን ለማከናወን የጎላ ጠቀሜታ ነበረው።

❖ አሉታዊ ተጽዕኖ

- ቅጽበታዊ ጎርፍና የወንዞች ከገደብ በላይ መሙላት በታችኛው የተፋሰሱ አካባቢዎች ላይ በመሰረተ ልማት፣ በንብረት እና በማህበረሰቡ ላይ የመፈናቀል አደጋ አስከትሏል።
- የአፈር መሸርሸር በግድቦች፣ በመስኖ ቦዮችና የውሃ ማጠራቀሚያዎች በደለል ክምችት እንዲሞሉ አድርጓል።
- የነበረው ከባድ ዝናብ በተወሰኑ የመስኖ መሠረተ ልማት ላይ ጉዳት አድርጓል።

3.3 በ2025 የክረምት ወቅት የአየር ጠባይ በጤናው ዘርፍ ላይ ያሳድረው ተጽዕኖ


ባሳለፍነው የክረምት 2025 ወቅት የነበረው የአየር ጠባይ ከጁን እስከ ሴፕቴምበር ወር በአብዛኛው የሀገራችን ክፍል ለወባ መራባትና ስርጭት ከፍተኛ አስተዋፅኦ ነበረው። ይህም ሁኔታ በምዕራብ፣ በመካከለኛው እና በምሥራቅ ኦሮሚያ ዞኖች፣ በጋምቤላ፣ በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ፣ በደቡብ ኢትዮጵያ፣ በመካከለኛው ኢትዮጵያ፣ በሲዳማ፣ በቤንሻንጉል ጉምዝ፣ በምዕራብና ምሥራቅ አማራ፣ በትግራይ፣ በአፋር፣ በሰሜን ሱማሌ እና በድሬ ዳዋ ከተማ አስተዳደር አካባቢዎች ላይ ለወባ ትንኝ መራባትና ስርጭት ከዝቅተኛ እስከ ከፍተኛ ደረጃ




የግብርና፣ ወሃ፣ ጤና ዘርፍ የክረምት 2025 ዓ.ም ወቅት እንቅስቃሴ ግምገማ

የሚመደብ ምቹ የአየር ጠባይ ነበራቸው (ካርታ 7 ሀ)፡፡ በሌላ በኩል የሰሜን ምዕራብ፣ የምዕራብና የመካከለኛ የሀገሪቱ አካባቢዎች ከወባ በሽታ ተጋላጭነት አንጻር ከፍተኛ ስጋት የነበረባቸው አካባቢዎች እንደነበሩ የወባ በሽታ ስጋት አመላካች (Malaria Risk Map) ያመለክታል (ካርታ 7 ለ)፡፡ በሌላ በኩል ባሳለፈው የክረምት ወቅት የነበረው የሙቀት ሁኔታ ለሰውም ሆነ ለእንስሳት ተስማሚ እንደነበረ የተተነተኑ የጤና ሚኒስቴር ሚኒስትሮች ያመለክታሉ፡፡ ሆኖም ግን በጥቂት የጋምቤላ፣ የአፋር፣ እንዲሁም የደቡብ እና የሰሜን ሱማሌ ዝቅተኛ ቦታዎች ላይ የነበረው አስጨናቂ የሙቀት ሁኔታ በሰዎች በተለይም ነባር የመተንፈሻ አካላትና የልብ ህመም ችግር ባላቸው እንዲሁም በእድሜ በገፉ፣ በነፍሰጡር እናቶችና በህጻናት እንዲሁም በእንስሳት ጤንነትና ተዋጽዖ ላይ አሉታዊ ጎን ነበረው (ካርታ 8 ሀ እና ለ)፡፡







ካርታ 5 እ.ኤ.አ ከጁን እስከ ሴፕቴምበር 2025 የነበረው እርጥበት ሁኔታ




ካርታ6 እ.ኤ.አ ከጁን እስከ ሴፕቴምበር 2025 የገጸ ምደር የውኃ ፍሰት ሁኔታ




ካርታ 7 ሀ ፡ ከጁን እስከ ሴፕቴምበር 2025 ለወባ በሽታ መፈጠርና መስፋፋት ምቹ የነበሩ አካባቢዎች



ካርታ7 ለ ፡ ከጁን እስከ ሴፕቴምበር 2025 የነበረው የወባ በሽታ የስጋት ደረጃ /Malaria Risk Map



ካርታ 8 ሀ፡ የክረምት ወቅት ለሰዎች የምቹት ሁኔታ



ካርታ 8 ለ፡ የክረምት ወቅት ለእንስሳት የምቹት ሁኔታ





ምዕራፍ አራት

4.1 በበጋ 2025/26 ወቅት የሚኖረው የአየር ጠባይ በግብርናው እንቅስቃሴ ላይ ሊያሳድር የሚችለው ተፅዕኖ

በመጨረሻው የበጋ 2025/26 ወቅት ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው በሆኑት የቦረና፣ የጉጂ፣ የሲዳማ እና የደቡብ ጥቂት የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ የሚጠበቀው መደበኛና ከመደበኛ በታች የሆነ እርጥበት የግጦሽ ሣርና የመጠጥ ውሃ አቅርቦትን በጥቂቱ ከማሻሻል አንጻር አዎንታዊ ጎን ቢኖረውም አካባቢዎቹ ካላቸው ቆላማነትና የእርጥበት እጥረት ተጋላጭነት ጋር ተዳምሮ የሚጠበቀው እርጥበት በቂ እንደማይሆን ይጠበቃል። በአንጻሩ ግን ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው በሆኑት አብዛኛዎቹ የደቡብ ሶማሌ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ የሚጠበቀው ከመደበኛ በታች የሆነ እርጥበት በመጠጥ ውሃ እና በግጦሽ ሳር አቅርቦት ላይ አሉታዊ ጎን ይኖረዋል።

በሌላ በኩል በጥቅምት እና ህዳር ወር የመኸር ሰብል አብቃይ በሆኑት የሶሜን ኢጋማሽ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ ሊኖር የሚችለው ወቅቱን ያልጠበቀ ዝናብ በሰብል ስብሰባና በድህረ ሰብል ስብሰባ ተግባራት ላይ አሉታዊ ተፅዕኖ ይኖረዋል። በአንፃሩ የቤንሻንጉል-ጉሙዝ፣ የምዕራብ ኦሮሚያ፣ የጋምቤላ እና የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ አካባቢዎች የሚኖረው ከመደበኛ በላይ የሆነ ዝናብ እድገታቸውን ላልጨረሱ ሰብሎች፣ ለቋሚ ተክሎች፣ ለእንስሳት የግጦሽ ሣርና የመጠጥ ውሃ አቅርቦት አዎንታዊ አስተዋጽኦ ቢኖረውም በቆላማና ሰብሎች ቀድመው በሚደርስባቸው አካባቢዎች በሰብል ስብሰባና ድህረ ሰብል ስብሰባ ላይ አሉታዊ ተፅዕኖ ያሳድራል። በሌላ በኩል ከሚኖረው የማለዳውና የሌሊቱ ዝቅተኛ የሙቀት መጠንና ቅዝቃዜ ጋር ተያይዞ ለውርጭ ክስተት ተጋላጭ በሆኑ የሶሜን ምስራቅ፣ መካከለኛው፣ ምስራቅ እና የደቡብ ደጋማ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ የውርጭ መከሰት እንደሚኖር ይጠበቃል።

በመጨረሻው በጋ ወቅት የሚኖረው የአየር ጠባይ ሊያሳድር የሚችለው አዎንታዊም ሆነ አሉታዊ ተጽዕኖ እና የግብርና ሚቲዎሮሎጂ ምክረ ሀሳብ እንደሚከተለው ቀርቧል።

➤ አዎንታዊ ተፅዕኖ

- ✚ የመኸር ሰብል አብቃ በሆኑ የሶሜን ኢጋማሽ አካባቢዎች የሚጠበቀው ደረቃማ እና ፀሐያማ የበጋ የአየር ጠባይ ለሰብል ስብሰባና ድህረ ሰብል ስብሰባ ተግባራት አዎንታዊ ሚና ይኖረዋል።
- ✚ የታጨደ እና የተወቃ ሰብል ከማሳ እና ከአውድማ ለማንጓዝም ሆነ የገበያ ትስስር ለመፍጠር ምቹ ሁኔታን ይፈጥራል፤



- ✚ አሁን ያለው የአፈር ውስጥ እርጥበት ከመኸር ሰብል ስብሰባ በኋላ ለሚዘፋ እንደ ንያ እና ሽንብራ የመሳሰሉ እህሎችን ለመዝራት አዎንታዊ ሚና ይኖረዋል።
- ✚ የበጋ እርጥበት ተጠቃሚ የሆኑ የደቡብ ኦሮሚያ አርሶ አደሮች እና ከፊል አርብቶ አደሮች ማሳ ለማዘጋጀትና ዘር ለመዝራት አዎንታዊ ሚና ይኖረዋል።
- ✚ በደቡብ እና በደቡብ ምዕራብ አርብቶ አደር አካባቢዎች የእንስሳት መኖሩ ልማት እና የመጠጥ ውኃ አቅርቦት እንዲኖር አዎንታዊ ሚና ይኖረዋል።
- ✚ የበጋው እርጥበት መደበኛ እና ከመደበኛ በላይ በሚጠበቅባቸው አካባቢዎች የሌሊት እና የማለዳውን ቅዝቃዜም ሆነ የውርጭ ክስተትን ስለሚቀንስ ለቋሚ ተክሎችም ሆነ በመስኖ ለሚለሙ ሰብሎች አዎንታዊ ሚና ይኖረዋል።
- ✚ በጃንዋሪ ወር የሚጠበቀው መጠነኛ እርጥበት በተለይም የበልግ ወቅት ሰብል አምራች በሆኑ አካባቢዎች አስቀድመው የማሳ ዝግጅት ለማድረግ አዎንታዊ ሚና ይኖረዋል።
 - አሉታዊ ተፅዕኖ
 - ✚ የቆላማ ጸባይ ባላቸው አካባቢዎች ላይ የሚጠበቀው ዝቅተኛ እርጥበት በተለይም በበጋ ወቅት ለሚበቅሉ ሰብሎች የእርጥበት እጥረት ሊከሰት ይችላል።
 - ✚ በሶማሌ ክልል ደቡባዊ ክፍል የሚጠበቀው ከመደበኛ በታች የሆነ እርጥበት የእንስሳት መኖሩ እና የመጠጥ ውሀ አቅርቦት ላይ አሉታዊ ጎን ይኖረዋል
 - ✚ በሰሜን ምዕራብ፣ በሰሜን፣ በሰሜን ምስራቅ፣ በምስራቅና በመካከለኛው የሀገሪቱ አካባቢዎች ወቅቱን ያልጠበቀ ዝናብ በሰብል ስብሰባ እና በድህረ ሰብል ስብሰባ ተግባራት ላይ አሉታዊ ጎን ሊኖረው ይችላል።
 - ✚ ለውርጭ ክስተት ተጋላጭ በሆኑ የሰሜን ምስራቅ፣ መካከለኛው እና ምስራቅ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ በተለይም ከኖቬምበር ጀምሮ የሌሊት እና የማለዳ ቅዝቃዜ በተለያዩ ሰብሎችም ሆነ በቋሚ ተክሎች ዕድገት እና ምርታማነት ላይ መጠነኛ አሉታዊ ተፅዕኖ ሊያሳድር ይችላል።
- የግብርና ሚቲዎሮሎጂ ምክረ ሀሳብ፡-
- ✚ አልፎ አልፎ በሚኖረው እርጥበታማ የአየር ሁኔታ እና ወቅቱን ያልጠበቀ ዝናብ በደረሱ ሰብሎች ላይ ጉዳት እንዳያደርስ በሚኖሩት ደረቅ ሰሞናት የደረሱ ሰብሎችን ከስር ከስር ለማንሳት የሚያስችል ቅድመ ዝግጅት አስቀድሞ ማድረግ፤
- ✚ የተሰበሰበውን ምርት እርጥበት በማያገኘው ሁኔታ በማሰባሰብ እና በማከማቸት ከተባይ ጉዳትም ሆነ ከምርት ብክነት ለመጠበቅ የሚያስችል ቅድመ ዝግጅት ከወዲሁ ማድረግ፤



የግብርና፣ ዉሃ፣ ጤና ዘርፍ የበጋ 2025/26 ዓ.ም ወቅት እንቅስቃሴ አዝማሚያ

- ✚ በመስኖ የሚለሙ ሰብሎች የውሃ እጥረት እንዳይገጥም በበጋ የመጀመሪያ ወራት የሚኖረውን እርጥበት በአግባቡ ማሰባሰብ እና ማከማቸት ይመከራል
- ✚ የውርጭ ክስተት በሚጠበቅባቸው የሀገሪቱ አካባቢዎች በሰብሎችና በመስኖ በሚበቅሉ አዝዕሮቶች እና የፍራፍሬ ተክሎች ላይ ጉዳት ለመቀነስ የሚያስችሉ አካባቢዎችን በማለዳ እና በምሽት ማሞቅ (ጭስ በማጨስ) የጓሮ አትክልቶችን መሸፈን፣ ደጋፊ መስኖ መጠቀም የመሳሰሉትን ተግባራት እንዲያከናውኑ ይመከራል።
- ✚ ከህዳር ወር ጀምሮ የሚኖረው ደረቃማ እና ነፋሻማ የአየር ሁኔታ የውሀ ትነትን ስለሚጨምር የደጋፊ መስኖ አጠቃቀም ውሀን ቆጣቢ በሆነ መልኩ መጠቀም ይገባል።
- ✚ በእንስሳት የመኖ እና የመጠጥ ውሀ አቅርቦት ላይ እጥረት እንዳይከሰት አስቀድሞ ቅድመ ዝግጅት ማድረግ ያስፈልጋል።

4.2 በበጋ 2025/26 ወቅት የሚጠበቀው የአየር ጠባይ በውሃው ዘርፍ እንቅስቃሴ ላይ ሊያሳድር የሚችለው ተፅዕኖ

በዘንድሮ በጋ 2025/26 ወቅት የሚጠበቀው የገፀ ምድር የውሃ ፍሰት በተለይም በመጀመሪያዎቹ ሁለት ወራት በአብዛኛው የባሮ አከቦ እና የታችኛው አባይ ተፋሰሶች ላይ ከመደበኛ በላይ የሆነ የገፀ ምድር የውሃ ፍሰት ያገኛሉ። በተጨማሪም የመካከለኛው እና የታችኛው አሞ ጊቤ እና ስምጥ ሸለቆ ተፋሰሶች ላይ ከመደበኛው ጋር የተቀራረበ የገፀ ምድር የውሃ ፍሰት ያገኛሉ። በአንጻሩ ግን በመደበኛ ሁኔታ የበጋ የገፀ ምድር የውሃ ፍሰት ተጠቃሚ የሆኑት በአብዛኛው ዋቤ ሸበሌ፣ ገናሌ ዳዋ እና ኦጋዴን ተፋሰሶች ከመደበኛ በታች የሆኑ የገፀ ምድር የውሃ ፍሰት ይኖራቸዋል። በአጠቃላይ በበጋው ወቅት የሚጠበቀው የአየር ጠባይ በውሀው ዘርፍ ላይ ሊያሳድር የሚችለው አዎንታዊ እና አሉታዊ የተፅዕኖ እንዲሁም ሊወሰዱ የሚገባቸው የውሀ ሚቲዎሮሎጂ ምክረ ሀሳብ እንደሚከተለው ቀርቧል።

➤ አዎንታዊ ተፅዕኖ

- ✚ በበጋ ወቅት ከመደበኛው በላይ ዝናብ የሚያገኙ የምዕራብ እና የደቡብ ምዕራብ ተፋሰሶች የተሻለ የገጸ ምድር እና የከርሰ ምድር የውኃ አቅርቦት እንዲኖር ያግዛል፤
- ✚ በመጀመሪያዎቹ ሁለት ወራት የሚገኘው እርጥበት በቀሪ ደረቅ የበጋ ወራት ለሰውም ሆነ ለእንስሳት የመጠጥ ውኃ አቅርቦትን ያሻሽላል፤
- ✚ አልፎ አልፎ የሚጠበቀው ወቅቱን ያልጠበቀ ዝናብ ለበጋ የመስኖ ስራ በቂ የውሀ አቅርቦት እንዲኖር ያስችላል፤

➤ አሉታዊ ተፅዕኖ

- ✚ ለሰዎችም ሆነ ለእንስሳት የመጠጥ ውሀ እቅርቦት እጥረት በተለይም በታችኛው የተፋሰሱ አካባቢዎች እንዲከሰት ያደርጋል፤
- ✚ የገጸ ምድር ውሃ (የወንዝ፣ የሀይቆች፣ የውሃ ማጠራቀሚያዎች እና ኩሬዎች) እና የከርሰ ምድር ውሃ በተለይም ጥልቀት የሌላቸው ጉድጓዶች) ሊቀንሱ ይችላሉ።
- ✚ በደቡብ ሶማሌ፣ ደቡብ ምስራቅ ኦሮሚያ እና ደቡብ ኦሞ ዞን ባሉ አካባቢዎች የንጹ መጠጥ ውሃ እጥረት ሊያጋጥም ይችላል።
- ✚ በሰዎች (በተለይ ሴቶች እና ህጻናት) ውሃ ለማግኘት ረጅም ርቀት እንዲጓዙ ይገደዳሉ።
- ✚ በውሃ እጥረት ምክንያት ከላይ እና ከታች በተፋሰሱ የውሃ ተጠቃሚዎች መካከል ከውሃ ጋር የተያያዙ ግጭቶች ሊፈጠሩ ይችላሉ።

➤ የውሃ ሚቲዎሮሎጂ ምክረ ሀሳብ

- ✚ በውሀ ማጠራቀሚያዎች የሚገኘውን ውሀ በቁጠባ እና ብክነትን በቀነሰ መንገድ መጠቀም ይመከራል፤
- ✚ በበጋ ወቅቱ የመጀመሪያ ወራት የሚገኘውን እርጥበት ለማሰባሰብ እና ለማጠራቀም የሚያስችል ቅድመ ዝግጅት ማድረግ ያስፈልጋል፤
- ✚ በውሃ ማጠራቀሚያዎች ውስጥ የሚገኝ ውሃ በትነት ምክንያት እንዳይባክን መከላከል ያስፈልጋል፤
- ✚ ለሀይል ማመንጫ እና ለመስኖ እርሻ የሚውሉ ግድቦች ውሃን አመጣጥኖ መጠቀም ይመከራል፤
- ✚ በደረቅ ወራት የውሃ አጠቃቀምን ከታችኛው የተፋሰስ ውሃ ፍላጎት ጋር ለማመጣጠን የውሃ ማጠራቀሚያዎችን እና ግድቦችን አስተዳደርን ማቀናጀት ያስፈልጋል፤
- ✚ በውሃ ሀብት ላይ ያለውን ጫና ለመቀነስ የአካባቢውን ማህበረሰቦች በውሃ ጥበቃ ተግባራት ላይ ማሳተፍና ግንዛቤ ማስጨበጥ ያስፈልጋል።
- ✚ ተገቢውን እርምጃ አስቀድሞ ለመወሰን የውሃ ሃብት እና የባለድርሻ አካላት በቅርበትና በቅንጅት መስራት ያስፈልጋል።
- ✚ የከርሰ ምድር ውሃ ሀብትን ለማሻሻል የውሃ ስርገትን ሊያቀላጥፉ የሚችሉ ተግባራትን ማህበረሰቡን በማሳተፍ ማከናወን ይመከራል፤
- ✚ የውሃ አጠቃቀምን ውጤታማነት ለማሻሻል በቴክኖሎጂ የታገዘ አጠቃቀም (ውሃን መልሶ ጥቅም ላይ የማዋል ቴክኖሎጂን) ማስተዋወቅ ያስፈልጋል።

4.3 በበጋ 2025 ወቅት የሚኖረው የአየር ጠባይ በጤናው ዘርፍ ላይ ሊያሳድር የሚችለው የተፅዕኖ


በመጨረሻው በጋ ወቅት የሚጠበቀው የአየር ጠባይ በምዕራብ እና በደቡብ ኦሮሚያ፣ በደቡብ እና ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ፣ በሲዳማ፣ በመካከለኛው ኢትዮጵያ፣ በጋምቤላ፣ በቤንሻንጉል ጉሙዝ፣ እንዲሁም በደቡብ ሶማሌ ክልል ለወባ ትንኝ መራባትና ስርጭት ምቹ ሁኔታ እንደሚኖር ይጠበቃል። በሌላ በኩል በክረምት ወቅት የነበረው ምቹ የአየር ጠባይ በቀጣይ የበጋ ወቅት በተለይም ለወባ ተጋላጭ በሆኑ አካባቢዎች ላይ ለወባ በሽታ ስርጭትና ወረርሽኝ ሊከሰት የሚችልበት እድል ሊኖር ስለሚችል የሚመለከታቸው አካላትም ሆኑ ማህበረሰቡ ተጋላጭነትን የሚቀንሱ እና የመከላከያ መንገዶችን መጠቀም ያስፈልጋል። በተለይም በቀጣይ በጋ ከፍተኛ የወባ በሽታ ስጋት ያለባቸው አካባቢዎች ላይ ልዩ ትኩረት በመስጠት የቅድመ ጥንቃቄ ስራዎችን ማከናወን ያስፈልጋል (ካርታ 9)።

በሌላ በኩል በመጨረሻው የበጋ ወቅት የሚኖረውን የአየር ጠባይ ሁኔታ በሰው ልጅ የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴ እና በእስካት ተዋጽኦ ላይ ሊያሳድር የሚችለውን ተጽዕኖ ፣ በተለይም ከሴፕቴምበር እስከ ጃንዋሪ የቅዝቃዜው ሁኔታ ከወረ ወር እየጨመረ የሙቀት ሁኔታው ደግሞ እየቀነሰ የሚሄድበት ወቅት ነው። በመሆኑም በሀገሪቱ የመካከለኛው፣ የሰሜን፣ የደቡብ እና የምዕራብ ከፍተኛ ቦታዎች ላይ የጠዋቱና የማታው የቅዝቃዜ ሁኔታ እየጨመረ ስለሚሄድ ማህበረሰቡም ሆነ የሚመለከተው አካል ይህን ቅዝቃዜ በሰዎች ላይ ጉዳት እንዳያስከትል ቅድመ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል። በሌላ በኩል በቆላማ አካባቢዎች ላይ ለሰዎችም ሆነ ለእንስሳት ምንም አይነት አስጨናቂ የሆነ የሙቀት ሁኔታ እንደማይኖር መረጃዎች ያሳያሉ።

✚ የጤና ሚኒስቴር ምክረ ሀሳብ

- ✓ ለወባ ትንኝ መራቢያነት የሚመቹ ሁኔታዎችን ማስወገድና ማፅዳት፤
- ✓ በኬሚካል የተነከሩ አጎበሮችን በአግባቡ መጠቀም፤
- ✓ ባለሙያዎች በሚሠጡት ሙያዊ ትምህርት መሠረት ፀረ ትንኝ ኬሚካሎችን መርጨት፤
- ✓ የወባ ተጋላጭ በሆኑ አካባቢዎች ለማህበረሰቡ መረጃውን ተደራሽ በማድረግ የግንዛቤ ማጨበጥ፤

- ✓ የቅዝቃዜን ተጽዕኖ (Cold stress) በሚኖራቸው አካባቢዎች ላይ ሙቀት የሚሰጡ አለባበስን መምረጥ ይመከራል፤
- ✓ በየጊዜው የሚወጡ የሚቲዎሮሎጂ መረጃዎችን መረጃዎችን መከታተል ያስፈልጋል፤



ካርታ 9: በበጋ የሚኖረው የወባ በሽታ የስጋት ደረጃ

/Malaria Risk Map/



Ethiopian Meteorology Institute





የኢንስቲትዩቱ ዓላማ፤ ራዕይ፤ ተልዕኮ እና እሴቶች

የኢንስቲትዩቱ ራዕይ

ለኢትዮጵያ ማህበራዊና ዘላቂ ኢኮኖሚያዊ ልማት እና ከአየር ሁኔታና ጸባይ ጋር የተያያዙ አደጋዎችን ለመከላከል ጉልህ አስተዋፅኦ የሚያደረግ ዓለም-አቀፍ ደረጃን የጠበቀ የሚወጥሱ አገልግሎት የሚሰጥ ተቋም ሆኖ ማየት፤

የኢንስቲትዩቱ ተልዕኮ

የከባቢ አየር መረጃዎችን በማሰባሰብ፣ በማደራጀት፣ በመተንተንና በማጥናት ለአገሪቱ የልማት እንቅስቃሴዎች ለእርሻ፣ ለውሃ፣ ለትራንስፖርት፣ ለዲዛይን፣ ኮንስትራክሽን እና ለህይወትና ንብረት መጠበቅ እገዛ የሚያደርግ የሚቲዎሮሎጂ አገልግሎት መስጠት፤

የኢንስቲትዩቱ ዕሴቶች

- ✚ ጥራት ያለው ወቅታዊና አስተማማኝ የሆነ የሚቲዎሮሎጂ መረጃ የአገልግሎታችን መለያ ነው፡፡
- ✚ በቡድን መስራትና ለሙያዊነት ታማኝ መሆን መመሪያችን ነው፡፡
- ✚ የአየር ሁኔታና ጠባይ ተፅዕኖዎችን አስቀድሞ መተንበይ የብቃታችን መለኪያ ነው፡፡

የኢንስቲትዩቱ ዓላማ

ኢንስቲትዩቱ ሲቋቋም የሚከተሉት ዓላማዎች ተሰጥተውታል፡፡

- ✚ የሚቲዎሮሎጂ አገልግሎት መስጠት
- ✚ አየር እንዳይበክል መቆጣጠርና የተፈጥሮ ሚዛኑም እንዳይዛባ መጠበቅ እና
- ✚ ኢትዮጵያ ሚቲዎሮሎጂን በሚመለከት ረገድ በዓለም አቀፍ ስምምነቶች መሠረት ያለባትን ግዴታ በተሻለ አኳኝ መወጣት ናቸው፡፡

ማስታወሻ

- ✚ በዚህ መጽሔት ውስጥ የተጠቀሰው የጊዜ አቆጣጠር እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር መሆኑን እንገልጻለን፡፡
- ✚ በየጊዜው እየተሻሻሉ የሚወጡ መረጃዎች በኢንስቲትዩቱ ድህረ ገፅ ላይ ማግኘት ይቻላል፡፡

የተቋሙ ስልክ +251 115 538 394

ደህረ ገጽ www.ethiomet.gov.et Email emi@ethiomet.gov.et