



በኢትዮጵያ የሚቴዎሮሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎሮሎጂ ትንበያ፣

ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ



ከኖቬምበር 1-10/2025 የነበረው የአየር ሁኔታ ግምገማ

እንዲሁም ከኖቬምበር 11-20፣21-30 የሚኖረው የአየር ሁኔታ

ትንበያ እና ምክረ ሃሳብ

ኖቬምበር 2025


አዲስ አበባ

### 1. እ.ኤ.አ ከኖቬምበር 1 እስከ 10/2025 የነበረው የአየር ሁኔታ

ባለፉት አስር ቀናት ለበጋ ዝናብ መፈጠር ምቹ የሆኑ የሚቴዎርሎጂ ገጽታዎች በተለይም በመጀመሪያዎቹ ቀናቶች ላይ የተሻላ ገጽታ ነበራቸዋል፡፡ ከዚህ ጋር ተያይዞ በጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸዋል በሁኑት የደቡብ አጋማሽ የሀገሪቱ ስፍራዎች ላይ እንዲሁም በከረምት ወቅት ዝናብ ሲያገኙ የነበሩት የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ የተሻላ ገጽታ ነበራቸዋል፡፡ በመሆኑም፤ በዚህ ወቅት በመደበኛ ሁኔታ ዝናብ የሚያገኙት የደቡብ አሮሚያ ዞኖች፤ የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ደቡባዊ ዞኖች ላይ ቀላል መጠን ያለው ዝናብ ተመዝግቧል፡፡ በተጨማሪም በአንዳንድ አካባቢዎችም በፀሀይ ኃይል ታግዞ ከተፈጠረው ዝናብ ሰጪ ደመናዎች ጋር ተያይዞ በአንዳንድ ቦታዎች ላይ በ24 ሰዓት ውስጥ መካከለኛ መጠን ያለው ዝናብ ተመዝግቧል፡፡ በ24 ሰዓት ውስጥ ከ10 ሚ.ሜ በላይ መካከለኛ መጠን ያለው ዝናብ ከተመዘገበባቸው የሚቴዎርሎጂ ጣቢያዎች መካከል አርባምንጭ 20.8፤ 25.2፤ ጎሬ 19.2፤ 18.8፤ 18.1፤ ነቀምት 10.2፤ ሮቤ 14.5፤ አማን 11.9፤ አርጆ 10.2፤ 18.8፤ አሶላ 54.2፤ አይክል 10.9፤ ቦሬ 16.2፤ ቡለን 20፤ ቡረጂ 15፤ ጨፋ 31፤ ዲላ 25.8፤ ዶሎመና 30፤ ፉኙዶ 32፤ ጋቲራ 14.6፤ ቡሌ ሆራ 29.3፤ ኮንሶ 14.1፤ ላሬ 23፤ ላይብር 11.6፤ 12.2፤12፤ ሊሙገነት 16.6፤ ማጂ 50.8፤ ማሻ 30.4፤ ነጆ 27.3፤ ሳዉላ 32.8፤ ተረጫ 11፤ አባጃራ 20.5፤ 18፤ 12.4፤ አቦሞሪንጋ 11.4፤ 13.4፤ አሸ 22.9፤ 12.1፤ ቢላምቢሎ 13.8፤ 17.8፤ ቡልቂ 10.4፤ መንደር ሰባት 13.5፤ 25.7፤ ዲንሾ 13፤ እርምጭ 31.3፤ ፎጉሌቃ 10.2፤ ጌጫ 18፤ 19፤ ጉብቲ 37.3፤ 49.4፤ 12.1፤ ቅዳሜ ገበያ 48.6፤ 32.8፤ 12.5፤ 48.6፤ ኮበን 35.5፤ 33፤ ኩሚ 12.8፤ ሙጊ 14.6፤ 10.1፤ 37.7፤ ኦንጋ 10.2፤ 16፤ ሼንዲ 11.5፤ ትንሹ መጢ 10.2፤ 24.5፤ 11.8፤ መንደር አስራ ሶስት 12.4፤ እንዲሁም መንደር አስራ አንድ 18.5፤ 18.5 ሚ.ሜ የሚደርስ ከመካከለኛ እስከ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ተመዝግቦባቸዋል፡፡ በአጠቃላይ ባለፉት አስር ቀናት በአስራ ሁለት (12) የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ በ24 ሰዓት ውስጥ ከ30 ሚ.ሜ በላይ የሆነ ከባድ መጠን ያለው የዝናብ መጠን ነበራቸዋል (ምስል 1)፡፡ በሌላ በኩል በመካከለኛውና ምዕራብ ጎንደር፤ በሀር ዳር ዙሪያ፤ በሰሜን፤ ምዕራብና ምስራቅ ጎጃም፤ አዊ፤ መተከል በጥቂት ቦታዎቻቸው ላይ አልፎ አልፎ በነበሩት ቀናት ወቅቱን ያልጠበቀ ከ3-5 ሚ.ሜ የሚደርስ አነስተኛ መጠን ያለው ዝናብ ከ1-3 ቀናት ያህል ተመዝግቧል (ካርታ 1 )፡፡

# በኢትዮጵያ የሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎርሎጂ ትንበያ፣


## ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ




ምስል:1 ከኖቬምበር 1 እስከ 10/2025 በ24 ሰዓት ውስጥ ከ30 ሚ.ሜ በላይ ከባድ መጠን ያለው

ባለፉት አስር ቀናት በጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው በሆኑት አካባቢዎች የዘነበዉ የዝናብ መጠን ከቦታ ሽፋን አንፃር ሲገመገም፤ ከአሮሚያ ክልል የቦረና፣ የምስራቅ ቦረና፣ የጉጂ እና ምዕራብ ጉጂ ዞኖች፣ ከደቡብ ኢትዮጵያ ክልል የጋሞ፣ ባስኬቶ፣ አሪ፣ ኮንሶ፣ ቡርጂ፣ አሌ፣ ጋርዱላ፣ ኮሬ እና ደቡብ አሞ ዞኖች፣ ከሱማሌ ዳዋ፣ ሊቦን፣ አፍዴር፣ ሸበሌ፣ ቆራሂ እና ዶሎ ዞኖች ላይ ከ11-60 ሚ.ሜ የሚደርስ ዝናብ ከ2-9 ቀናት ያህል ዝናብ ነበራቸው (ካርታ1 እና 2)፡፡ በተመሳሳይ ቀደም ብሎ የክረምት ወቅት ዝናብ እያገኙ የነበሩት ከአሮሚያ ክልል የቄለም ወለጋ፣ ምዕራብ ወለጋ፣ ምስራቅ ወለጋ፣ ሆሮ ጉድሩ ወለጋ፣ አሊባቦር፣ ቡኖ በደሌ፣ ጅማ፣ ምዕራብ፣ ደቡብ ምዕራብ፣ ምስራቅ ባሌ፣ ባሌ፣ ዞኖች፣ ከጋምቤላ ክልል አጃዋክ፣ መሻጉንግ፣ የኑዌር እና የኢታንግ ልዩ ወረዳ፣ ከቤንሻንጉል ጉምዝ ካማሺ፣ አሶሳ፣ ማኦ ኮሞ ዞኖች፣ ከደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል ኮንታ፣ ዳዉሮ፣ ከፋ፣ ሸካ፣ ቤንች ሸኮ ዞኖች ከደቡብ ኢትዮጵያ ክልል የጎፋ፣ የወላይታ እና ጌዲዮ ዞኖች፣ የሲዳማ ክልል ዞኖች ላይ ከ31-111 ሚ.ሜ የሚደርስ ዝናብ ከ4-10 ቀናት ያህል ዝናብ ነበራቸው (ካርታ 1 እና 2)፡፡ ባለፉት አስር ቀናት የዘነበዉ የዝናብ መጠን ከመደበኛው ጋር ሲነፃፀር በጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው ከሆኑት የሀገሪቱ አካባቢዎች ከአሮሚያ ክልል የቦረና፣ የምስራቅ ቦረና፣ የጉጂ እና ምዕራብ ጉጂ ዞኖች፣ ከደቡብ ኢትዮጵያ ክልል የጋሞ፣ ባስኬቶ፣ አሪ፣ ኮንሶ፣ ቡርጂ፣ አሌ፣ ጋርዱላ፣ ኮሬ እና ደቡብ አሞ ዞኖች ላይ በአብዛኛው ከመደበኛ ጋር የተቀራረበ የዝናብ መጠን ተመዝግቧል (ካርታ 3)፡፡


# በኢትዮጵያ የሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎርሎጂ ትንበያ፣ ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ



ካርታ 1 እ.ኤ.አ ከኖቬምበር 1 እስከ 10/2025  
ድረስ የነበረው የዝናብ መጠን በሚ.ሜ




ካርታ 2 እ.ኤ.አ ከኖቬምበር 1 እስከ  
10/2025 ድረስ ዝናብ የዘነበባቸው ቀናት



ካርታ 3 እ.ኤ.አ ከኖቬምበር 1 እስከ 10/2025  
የነበረው የዝናብ መጠን ከመደበኛው ጋር

በሌላ በኩል ባለፉት አስር ቀናት የለሊቱና የማለዳው ቅዝቃዜ አልፎ አልፎ በነበሩት ቀናት በመካከለኛው፣ በሰሜን ምሥራቅ እና የደቡብ ደጋማ ቦታዎች ላይ ከአምስት (5) ዲግሪ ሴልሺየስ በታች ተመዝግቧል (ምስል 1)፡፡




ምስል:1 ከኖቬምበር 1-10 በ24 ሰዓት ውስጥ ከሶስት (5) ዲግሪ ሴልሺየስ በታች የተመዘገበባቸው ስፍራዎች

## 1.2 እ.ኤ.አ ከኖቬምበር 1 እስከ 10/2025 የነበረው የአየር ሁኔታ

### በግብርና ሥራ እንቅስቃሴ ላይ ያሳደረው ተፅዕኖ

ባለፉት አስር ቀናት በአብዛኛዎቹ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ የበጋው ደረቅ፣ ፀሐያማና ነፋሻማ የአየር ሁኔታ ተስተውሏል። ይህም ሁኔታ የሰብልና የድህረ ሰብል ስብሰባቸውን በሚያካሄዱ በአንዳንድ አካባቢዎች አመቺ ሁኔታን የፈጠረ ነበር። በሌላም በኩል በምዕራብና በደቡብ ምዕራብ በአንዳንድ ቦታዎች ላይ የነበረው እርጥበት ሙሉ ለሙሉ እድገታቸውን ላልጨረሱ ሰብሎች፣ ለቋሚ ተክሎች፣ ለፍርፍሬ ተክሎችና ለጓሮ አትክልቶች የውሃ ፍላጎት መሟላት እንዲሁም በመኸር ወቅት መጨረሻ ላይ በአፈር ውስጥ በተከማቸው እርጥበት በመታገዝ ለሚዘሩ እንደ ጓያ እና ሽንብራ ለመሳሰሉ የጥራጥሬ ሰብሎች ጠቀሜታ ነበረው። እንዲሁም በጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው በሆኑት በደቡብ አጋማሽ የሀገሪቱ ስፍራዎች ላይ የነበረው እርጥበት በተለይም በደጋማው የቦረናና ጉጂ ዞኖች ለተዘሩ ሰብሎች ምቹ ሁኔታ የፈጠረ ሲሆን፣ በአርብቶ አደሩና ከፊል አርብቶ አደር አካባቢ ለግጦሽ ሳርና ለመጠጥ ውሃ አቅርቦት መሻሻልና የዝናብ ውሃን ለመስብሰብና ለማከማችት ገንቢ ሚና ነበረው (ካርታ 4) ።




ካርታ 4 እ.ኤ.አ ከኖቬምበር 1 እስከ 10/2025

ድረስ የነበረው የእርጥበት ሁኔታ

### 1.3 እ.ኤ.አ ከኖቬምበር 1 እስከ 10/2025 የነበረው የአየር ሁኔታ

#### በውሃው ዘርፍ ላይ ያሳደረው ተፅዕኖ

ባሳለፍነው የኖቬምበር የመጀመርያዎቹ አሥር ቀናት በተወሰኑ የበጋ እርጠጥበት ተጠቃሚ ተፋሰሶች ላይ የተሻለ የገፀ ምድር የውሃ ፍሰት ነበራቸው፡፡ ከነዚህም በአብዛኛው ባሮ አካባቢ፣ መካከለኛ እና ታችኛው ኦሞ ጊቤ፣ ስምጥ ሸለቆ፣ በላይኛው ገናሌ ዳዋ፣ ታችኛው አባይ፣ እንዲሁም በጥቂት ላይኛው ዋቢ ሸበሌ ተፋሰሶች የተሻለ የገፀ ምድር የውሃ ፍሰት ነበራቸው፡፡ ይህም ሁኔታ የመጠጥ ውሃ አቅርቦት እና የተፋሰሶችን የስነ-ምህዳር ደህንነት ከማረጋገጥ አንጻር አዎንታዊ ሚና እንደሚኖረው የተተነተኑ የውሃ ሚቲዎሮሎጂ መረጃዎች ያመለክታሉ፡፡ በመሆኑም በምዕራባዊ እና ደቡባዊ ተፋሰሶች የተሻለ የአፈር እርጥበት መጠን፣ የጅረት ፍሰት እና የውሃ ክምችት ለማሻሻል አዎንታዊ ሚና ነበረው፡፡ በአንጻሩ አፋር ደናክል፣ አዋሽ፣ ተከሌ፣ መረብ ጋሽ እና አይሻ ተፋሰሶች በአብዛኛው ደረቅ በሆኑ ሁኔታዎች ውስጥ ቆይተዋል (ካርታ 5) ።



ካርታ 5 እ.ኤ.አ ከኖቬምበር 1 እስከ 10/2025

ድረስ የነበረው የእርጥበት ሁኔታ



# በኢትዮጵያ የሚቲዎሮሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቲዎሮሎጂ ትንበያ፡

## ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

### 2. መግቢያ

በመደበኛ ሁኔታ በኖቬምበር ሁለተኛው አሥር ቀናት በአብዛኛው የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ የበጋው ደረቅ፣ ፀሐያማና ነፋሻማ የአየር ሁኔታ ያመዝናል፡፡ ከዚህ ጋር ተያይዞ በሰሜን፣ ሰሜን ምሥራቅ፣ ምሥራቅ፣ መካከለኛው እና ደቡብ አካባቢዎች ላይ የሌሊቱና የማለዳው ቅዝቃዜ ይዘወተራል፡፡ በተጨማሪም በጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው በሆኑት የደቡብ፣ ደቡብ ምስራቅ እንዲሁም የደቡብ ምዕራብ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን ያለው ዝናብ ያገኛሉ፡፡

### 2.1 እ.ኤ.አ ከኖቬበር 11 እስከ 20/2025 የሚኖረው የአየር ሁኔታ ትንበያ

በሚቀጥሉት የኖቬምበር የሁለተኛው አሥር ቀናት በጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው በሆኑት የቦረና፣ ምስራቅ ቦረና፣ ምዕራብ ጉጂ እና ጉጂ ዞኖች፣ የሲዳማ ክልል ዞኖች፣ የሶማሌ ክልል ደቡባዊና ደቡብ ምስራቅ ዞኖች እና የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ደቡባዊ ዞኖች ላይ ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን ያለው ዝናብ እንደሚኖራቸው አሃዛዊ የትንበያ መረጃዎች ይጠቁማሉ (ካርታ 6)፡፡ በተጨማሪም በፀሀይ ሀይል ታግዘው ከሚጠናከሩት የደመና ክምችቶች ላይ በመነሳት ቀደም ብሎ የክረምት ወቅት ዝናብ እያገኙ ባሉት የምዕራብ ኦሮሚያ ክልል ዞኖች፣ የጋምቤላ ክልል ዞኖች እና የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል ዞኖች ላይ አልፎ አልፎ በሚኖሩት ቀናት በ24 ሰዓት ውስጥ ከ11 እስከ 30 ሚ.ሜ የሚደርስ መካከለኛ መጠን ያለው ዝናብ ይኖራቸዋል (ካርታ 6)፡፡


በሌላ በኩል ከሚጠናከሩት የአየር ሁኔታ ክስተቶች ላይ በመነሳት በተለይም ከሳምንቱ አጋማሽ በኋላ አልፎ አልፎ በሚኖሩት ቀናት የሰሜን፣ መካከለኛው፣ ምዕራብና ደቡብ ጎንደር ዞኖች፣ ባህርዳር ዙሪያ፣ አዊ፣ በምዕራብና ምስራቅ ጎጃም፣ ከቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል መተከል፣ አሶሳ፣ ካማሺ እና የማኦኮሞ ልዩ ዞን፣ አርሲ እና ምዕራብ አርሲ፣ ባሌ እና ምስራቅ ባሌ ዞኖች ላይ አልፎ አልፎ በሚኖሩት ቀናት ወቅቱን ያልጠበቀ አነስተኛ መጠን ያለው ዝናብ ያገኛሉ (ካርታ 6)፡፡ ስለሆነም በሚኖሩት ደረቅ ቀናቶች የደረሱ ሰብሎች መሰብሰብ አስፈላጊ መሆኑን የኢትዮጵያ ሚቲዎሮሎጂ ኢንስቲትዩት ይጠቁማል፡፡

# በኢትዮጵያ የሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎርሎጂ ትንበያ፡


## ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ



Total Rainfall (mm) for 11-21 Nov 2025



Daily minimum temperature (C) for 11-21 Nov 2025



ካርታ 6 እ.ኤ.አ. ከኖቬምበር 11-20, 2025  
የሚኖረው የዝናብ መጠን በሚ.ሜ

ካርታ 7 እ.ኤ.አ. ከኖቬምበር 11-20, 2025  
የሚኖረው ዝቅተኛ የሙቀት መጠን በዲ.ሴ

ሠንጠረዥ 1፡ በሚቀጥሉት አስር ቀናት ዝናብ የሚያገኙ አካባቢዎችና በ24 ሰዓት ውስጥ የሚኖረው የዝናብ መጠን

### በጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው የሆኑ ዞኖች

| ክልል       | ዞን                                                 | በ 24 ሰዓት ውስጥ የሚኖረው የዝናብ መጠን     |
|-----------|----------------------------------------------------|---------------------------------|
| አሮሚያ      | ቦረና፣ ምስራቅ ቦረና፣ ምዕራብ ጉጂ እና ጉጂ፣ ዞኖች                  | ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን (ከ11-29 ሚ.ሜ) |
| ሶማሌ       | ዳዋ፣ ሊቦን እና አፍዴር ዞኖች                                | ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን (ከ11-29 ሚ.ሜ) |
| ደቡብ ኢትዮጵያ | ጋሞ፣ ባስኬቶ፣ አሪ፣ ኮንሶ፣ ቡርጂ፣ አሌ፣ ጋርዱላ፣ ኮሬ እና ደቡብ አሞ ዞኖች | ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን (ከ11-29 ሚ.ሜ) |
| ሲዳማ ክልል   | ሁሉም የክልሉ ዞኖች                                       | መካከለኛ መጠን (ከ11 እስከ 29 ሚ.ሜ)      |

### የክረምት ወቅት ዝናብ ተጠቃሚ ዞኖች

# በኢትዮጵያ የሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎርሎጂ ትንበያ፡



## ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

|                |                                                                  |                                     |
|----------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| አሮሚያ           | የቁለም ወለጋ፣ ምዕራብ ወለጋ፣ ምስራቅ ወለጋ፣ ሆሮ ጉድፋ፣ ወለጋ፣ ኢሉባቦር፣ ቡኖ በደሌ፣ ጅማ ዞኖች | ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን (ከ11-29 ሚ.ሜ)     |
| ጋምቤላ           | የአኝዋክ፣ መሻጥንግ፣ የኑዌር እና የኢታንግ ልዩ ወረዳ                               | ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን (ከ11 እስከ 29 ሚ.ሜ) |
| ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ | የከፋ፣ ኮንታ፣ ዳውሮ፣ ቤንች ሸኮ፣ ሸካ እና ምዕራብ አሞ                             | መካከለኛ መጠን (ከ11 እስከ 29 ሚ.ሜ)          |
| ደቡብ ኢትዮጵያ      | የወላይታ፣ ጎፋ፣ ጌድዮ፣                                                  | መካከለኛ መጠን (ከ11 እስከ 29 ሚ.ሜ)          |


## በጥቂት አካባቢዎች ላይ ወቅቱን ያልጠበቀ ዝናብ የሚያገኙ አካባቢዎች

|             |                                                                                   |                     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| አሮሚያ        | ባሌ እና ምስራቅ ባሌ፣ አርሲ እና ምዕራብ አርሲ፣ ምስራቅ ሐረርጌ፣ የሰሜን፣ የምዕራብ የሸዋ እና የደቡብ ምዕራብ የሸዋ ዞኖች፣  | ቀላል መጠን (ከ1-10 ሚ.ሜ) |
| አማራ         | የሰሜን፣ የመካከለኛው እና ደቡብ ጎንደር፣ የባህርዳር ዙሪያ፣ የሰሜን፣ ምዕራብ እና ምስራቅ ጎጃም፣ የአዊ እና የሰሜን ሸዋ ዞኖች | ቀላል መጠን (ከ1-10 ሚ.ሜ) |
| ትግራይ        | በጥቂት የምዕራብ፣ የሰሜን ምዕራብ እና የምስራቅ ትግራይ ዞኖች                                           | ቀላል መጠን (ከ1-10 ሚ.ሜ) |
| ቤንሻንጉል ጉምዝ  | የካማሺ፣ መተከል፣ አሶሳ፣ ማኦ ኮሞ ዞኖች                                                        | ቀላል መጠን (ከ1-10 ሚ.ሜ) |
| ማዕከላዊ ኢትዮጵያ | በጥቂት ሀዲያ፣ ከምባታ፣ ሀላባ፣ ጠምባሮ ልዩ ወረዳ፣                                                 | ቀላል መጠን (ከ1-10 ሚ.ሜ) |

## በኢትዮጵያ የሚቲዎሮሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቲዎሮሎጂ ትንበያ፡

### ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

በሌላ በኩል በመካከለኛው፣ ምሥራቅ፣ ሰሜን እና የደቡብ ደጋማ ቦታዎች ላይ የለሊቱና የማለዳው ቅዝቃዜ ከቀን ወደ ቀን እየጨመረ እንደሚሄድ የትንበያ መረጃዎች ይጠቁማሉ (ምስል 2)።



ምስል:2 ከኖቬምበር 11-20 በ24 ሰዓት ውስጥ ከሶስት (3) ዲግሪ ሴልሺየስ በታች የሚመዘገብባቸው ስፍራዎች

## 2.2 እ.ኤ.አ ከኖቬምበር 21 እስከ 30/2025 የሚኖረው የአየር ሁኔታ አዝማሚያ

በመጨረሻ የኖቬምበር የሶስተኛው አሥር ቀናት በጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው በሆኑት በደቡብና ደቡብ ምስራቅ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ ለዝናብ መኖር አመቺ ሁኔታ የሚፈጥሩ የሚቲዎሮሎጂ ገጽታዎች በመጨረሻዎቹ ቀናቶች ላይ የተሻለ ገጽታ እንደሚኖራቸው አሃዛዊ የትንበያ መረጃዎች ይጠቁማሉ። ከዚህም በተጨማሪም ከሚጠናከሩት የሚቲዎሮሎጂ ገጽታዎች ላይ በመነሳት በተለይም በጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው በሆኑት የቦረና የምስራቅ ቦረና፣ የምዕራብ ጉጂ እና ጉጂ ዞኖች፣ የሲዳማ ክልል ዞኖች፣ የሶማሌ ክልል ደቡባዊና ደቡብ ምስራቅ ዞኖች እና የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ደቡባዊ ዞኖች ላይ ቀላል መጠን ያለው ዝናብ ይኖራቸዋል። በሌላ በኩል በመካከለኛው፣ ምሥራቅ እና የደቡብ ደጋማ

# በኢትዮጵያ የሚቲዎሮሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቲዎሮሎጂ ትንበያ፡



## ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

በታዎች ላይ የለሊቱና የማለዳው ቅዝቃዜ ከአምስት (5) ዲግሪ ሴልሺየስ በታች እንደሚሆን የትንበያ መረጃዎች ያሳያሉ።

### 2.3 እ.አ.አ ከኖቬምበር 11 እስከ 20/2025 የሚኖረው የአየር ሁኔታ በግብርናው ሥራ እንቅስቃሴ ላይ ሊያሳድር የሚችለው ተፅዕኖ

በሚቀጥሉት አሥር ቀናት በደቡብ ምዕራብ እና ደቡብ አጋማሽ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ የሚኖረው መካከለኛ መጠን ያለው እርጥበት ለወቅቱ የግብርና ስራ እንቅስቃሴ በአመዛኙ አዎንታዊ ሚና ይኖረዋል። እንዲሁም በጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው በሆኑት አርብቶ አደሮች እና ከፊል የአርብቶ አደር ዞኖች ላይ የሚጠበቀው ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን ያለው እርጥበት በአካባቢው ለሚከናወነው የግብርና እንቅስቃሴ ከፍተኛ ጠቀሜታ ይኖረዋል፡ ፡ ሆኖም ተያያዥ ስጋቶችን ለመቀነስና የሚኖሩትን መልካም አጋጣሚዎች በላቀ ሁኔታ ለመጠቀም የቀረቡትን ቦታ ተኮር የግብርና ሚቲዎሮሎጂ ምክረ ሀሳቦች በሁሉም ደረጃ በተገቢው ሁኔታ መተግበር ያስፈልጋል።

ሠንጠረዥ 2፡ በሚቀጥሉት አስር ቀናት የሚኖረው የእርጥበት ሁኔታ በግብርናው እንቅስቃሴ ላይ

| ዞኖች                                                                                                         | የእርጥበት ሁኔታ                   | አዎንታዊ ተጽዕኖ                                                                                                                                                                          | አሉታዊ ተጽዕኖ                                                                                   | የተሰጠ ምክረ ሃሳብ                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| በጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው የሆኑ ዞኖች                                                                                  |                              |                                                                                                                                                                                     |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                |
| ቦረና፣ ምስራቅ ቦረና፣ ምዕራብ ጉጂ ፣ ጉጂ፣ አፍዴር፣ ዳዋ፣ ሊበን፣ ጋሞ፣ ባስኬቶ፣ አሪ፣ ኮንሶ፣ ቡርጂ፣ አሌ፣ ጋርዱላ፣ ኮሬ ፣ ደቡብ አሞ፣ ሁሉም ሲዳማ የክልሉ ዞኖች | ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን ያለው እርጥበት | <ul style="list-style-type: none"> <li>የዝናብ ውሃ ለማሰባሰብና ለማጠራቀም</li> <li>በደጋማ አካባቢዎች ለተዘሩ ሰብሎች እድገት</li> <li>ለአርብቶ አደሩና ከፊል አርብቶ አደር አካባቢዎች ለእንስሳት መኖርና የመጠጥ ውሃ አቅርቦት መሻሻል</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>የአፈር ወሰጥ እርጥበት መጠነኛ መሆን</li> <li>ከፍተኛ ትነት</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>የዝናብ ውሃን በማሰባሰብ በደረቅ ሰሞናት ተግባር ላይ ማዋል</li> <li>የእንስሳት መኖር ከሰበል ተረፈ ምርት ማሰባሰብ እና ማከማቸት</li> <li>ደጋማ አካባቢዎች ሰብሎች በአረም እንደጎዱ የማስወገድ ስራዎችን ማከናወን</li> </ul> |
| የመኸር ሰብል አምራች ዞኖች                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                     |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                |

# በኢትዮጵያ የሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎርሎጂ ትንበያ፡



## ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

|                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| የቁለም ወለጋ፣ ምዕራብ ወለጋ፣ ምስራቅ ወለጋ፣ ሆሮ ጉድሩ ወለጋ፣ ኢሉባቦር፣ ቡኖ በደሌ፣ ጅማ፣ካማሺ፣ አኝዋክ፣ መኸንግ፣ ኑዌር፣ ፤ኢታንግ ልዩ ወረዳ፣ የከፋ፣ ኮንታ፣ ዳውሮ፣ ቤንች ሸኮ፣ ሸካ ፣ምዕራብ አሞ ፣ የወላይታ፣ ጎፋ እና ጌድዮ                                                                                               | ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን ያለው እርጥበት | <ul style="list-style-type: none"> <li>• በአፈር ውስጥ በተከማቸ እርጥበት ለሚዘሩ እንደ ኋያ እና ሽንብራ ለመሳሰሉ የጥራጥሬ ሰብሎች እድገት</li> <li>• ዘግይተው ተዘርተው ፍሬ በመሙላት ላይ ላሉ ሰብሎች</li> <li>• ለቋሚ ተክሎችና ለግጦሽ ሳር ልምላሜ</li> <li>• የመጠጥ ውሃ አቅርቦት መሟላት</li> <li>• የውርጭ ስጋት መቀነስ</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• የደረሱ ሰብሎች ስብሰባና ድህረ ሰብል ስብሰባ ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ</li> <li>• ከእርጥበትና ሙቀት ጋር ተያይዞ የዋግ በሽታ ስጋት መኖር</li> </ul>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• የደረሱ ሰብሎችን በሚኖሩት ደረቅ ቀናቶች መሰብሰብ</li> <li>• የጥራጥሬ ሰብሎች (ሽንብራ እና ኋያ) እድገትን መከታተል</li> <li>• በደጋና በውይን አደጋ አካባቢ የሰብል በሽታ ክትትል ማድረግ</li> </ul>                                     |
| <b>ወቅቱን ያልጠበቀ ዝናብ የሚጠበቅባቸው ዞኖች</b>                                                                                                                                                                                                                  |                              |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |
| ምስራቅ ሐረርጌ፣ አርሲ እና ምዕራብ አርሲ፣ ባሌ እና ምስራቅ ባሌ፣የሰሜን ፣የምዕራብ ሸዋ እና የደቡብ ምዕራብ የሸዋ፣ የሰሜን፣ የመካከለኛው እና ደቡብ ጎንደር፣ የባህርዳር ዙሪያ፣ የሰሜን፣ ምዕራብ እና ምስራቅ ጎጃም፣ የአዊ፣ የሰሜን ሸዋ ዞኖች፣ ምዕራብ እና የምስራቅ ትግራይ ዞኖች፣ የካማሺ፣ መተከል፣ አሶሳ፣ ማኦ ኮሞ ዞኖች፣ በጥቂት ሀዲያ፣ ከምባታ፣ ሀላባ እና ጠምባሮ ልዩ ወረዳ፣ | ቀላል መጠን ያለው እርጥበት            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ለቋሚ ተክሎችና ለግጦሽ ሳር ዕድገት</li> <li>• ዘግይተው ተዘርተው ፍሬ በመሙላት ላይ ላሉ ሰብሎች ፍሬ ለማፍራት</li> </ul>                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• በመኸር ሰብል ስብሰባና ድህረ ሰብል ስብሰባ ላይ አነስተኛ አሉታዊ ተጽዕኖ</li> <li>• በጥቂት ደጋማ ቦታዎች ላይ የለሊቱና የማለዳው ቅዝቃዜ መጨመረ</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• የደረሱ ሰብሎችን በሚኖሩት ደረቅ ሰሞናት የመሰብሰብና በአግባቡ የመከመር ተግባራትን ማከናወን</li> <li>• አልፎ አልፎ የውርጭ ክስተት በሚጠበቅባቸው አንዳንድ አካባቢዎች በሰብሎችና በመስኖ በሚበቅሉ አዝዕሮቶች ላይ ጉዳት እንዳይደርስ ቅድመ ጥንቃቄ ማድረግ</li> </ul> |

# በኢትዮጵያ የሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎርሎጂ ትንበያ፡

## ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

### 2.4 እ.ኤ.አ ከኖቬምበር 11 እስከ 20/2025 የሚኖረው የአየር ሁኔታ በውሃ ዘርፍ ላይ ሊያሳድር የሚችለው ተፅዕኖ

በሚቀጥሉት የኖቬምበር ሁለተኛ አሥር ቀናት የበጋ እርጠጥበት ተጠቃሚ ተፋሰሶች መጠነኛ የገፀ ምድር የውሃ ፍሰት እንደሚኖራቸው የሚጠበቅ ሲሆን የተቀሩት ዝቅተኛ እርጠጥበት ይኖራቸዋል። በመሆኑም ተያያዥ ስጋቶችን ለመቀነስና የሚኖሩትን መልካም አጋጣሚዎች በላቀ ሁኔታ ለመጠቀም የቀረቡትን ተፋሰሶች ተኮር የውሃ ሚቴዎርሎጂ ምክረ ሀሳቦች መተግበር ያስፈልጋል።

ሠንጠረዥ 3፡ በሚቀጥሉት አስር ቀናት የሚኖረው የእርጠጥበት ሁኔታ በውሃ ዘር ላይ ሊኖር የሚችለው ተጽዕኖ

| የውኃ ተፋሰሶች                                                      | የእርጠጥበት ሁኔታ       | አዎንታዊ ተጽዕኖ                                                                                         | አሉታዊ ተጽዕኖ                                                                                          | የውኃ ሚቴዎርሎጂ ምክረ ሃሳብ                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| በአብዛኛው፣ ባሮ አኮሮ፣ መካከለኛው እና ታችኛው አሞጊቤ፣ ስምጥ ሸለቆ፣ አባይ እንዲሁም ገናሌ ዳዋ | መካከለኛ የእርጠጥበት መጠን | <ul style="list-style-type: none"> <li>ለመስኖና ለሃይል ማመንጫ እንዲሁም ለመጠጥ ውሃ መጠነኛ የውሀ አቅርቦት መኖር</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>አንጻራዊ የትነት መጨመር</li> </ul>                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>የሚገኘውን ውሃ ከብክነት እና ከብክለት መጠበቅ</li> <li>ውሃን በተገቢ ሁኔታ ማሰባሰብ</li> <li>ከብክነት እንዲሁም ከብለት መጠበቅ</li> </ul>                     |
| በአብዛኛው አዋሽ፣ ዋቢ ሸበሌ፣ አፋር ደናክል፣ ተከሌ፣ መረብጋሽ፣ አጋዴን እና አይሻ፣         | ከመጠነኛ እስከ ደረቅ ሁኔታ |                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>እርጠጥበት አጠር በሆኑ አካባቢዎች የውሃ አጥረት</li> <li>ከፍተኛ ትነት</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>የዝናብ ውሃ ከጣራ እና ከመሬት ወለል ማሰባሰብ</li> <li>የውኃ ሀብትን በአግባቡ መጠቀም</li> <li>የሚገኘውን መጠነኛ የዝናብ ውኃ ከብክነት እና ከብክለት መከላከል</li> </ul> |