



በኢትዮጵያ የሚቴዎሮሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎሮሎጂ ትንበያ፣

ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ



እ.ኤ.አ ከኦክቶበር 1 እስከ ከኖቬምበር 30/2025 የነበረው

የአየር ጠባይ ግምገማ እና

በቀሪዎቹ ሁለት የበጋ ወራት የሚኖረው የአየር ጠባይ

አዝማሚያ እና ምክረ ሃሳብ

በኢትዮጵያ የሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎርሎጂ ትንበያ፡

ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

እ.ኤ.አ ከኦክቶበር 1 እስከ ኖቬምበር 30/2025 የነበረው የአየር ጠባይ

ግምገማና በቀሪዎቹ የበጋ ወራት የሚኖረው የአየር ጠባይ አዝማሚያ

አጠቃላይ

ለዘንድሮ የበጋ ወቅት የአየር ጠባይ ትንበያ ከመስጠቱ አስቀድሞ በትሮፒካል ፓስፊክ ውቅያኖስ መካከለኛውና ምሥራቃዊ ክፍል ላይ ቀደም ባሉት ወራት የነበረውና በመጨረሻ የበጋ ወቅት የሚኖረው የባህር ወለል ሙቀት ሂደት ላይ ሳይንሳዊ ትንታኔና ጥናት ተደርጓል፡፡ በበጋ ወራት የምስራቅና የመካከለኛው ፓስፊክ ውቅያኖስ የላይኛው የወሃ አካላት ከመደበኛው በታች መቀዝቀዝ (ENSO La Nina) ክስተት ተጽዕኖ ሥር ሆኖ እንደሚቀጥል በተጨማሪም የህንድ ውቅያኖስ ከመደበኛው ጋር የተቀራረበ መሞቅ ጋር ተያይዞ የዘንድሮ የበጋው ወቅት (Neutral IOD) ስር ሊሆን እንደሚችል ተመላክቷል፡፡ በተጨማሪም በአትላንቲክ ውቅያኖስ ሰሜናዊ ክፍል እንዲሁም በሜዲትራኒያን ባህር ላይ መደበኛና ከመደበኛው በላይ የባህር ወለል መሞቅ እንደሚኖር ተጠቁሟል፡፡ ከዚህ ጋር ተያይዞ በመጨረሻ በጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው በሆኑት የቦረናና ጉጂ ዞኖች፣ ሲዳማ እና ደቡብ ኢትዮጵያ መደበኛ ዝናብ፣ የሶማሌ ክልል ደቡባዊ ክፍል ድግሞ ከመደበኛ በታች የሆነ የዝናብ መጠንና ስርጭት እንደሚኖራቸው ትንበያ ተሰጥቷል፡፡ እንዲሁም የምዕራብና ደቡብ ምዕራብ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ ከመደበኛ በላይ ዝናብ እንደሚያገኙ፣ በተጨማሪም እየተስተዋሉ ከሚገኙት የአየር ሁኔታ ክስተቶች ላይ በመነሳት በሰሜን፣ በመካከለኛው፣ በምስራቅና በሰሜን ምዕራብ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ ወቅቱን ያልጠበቀ ዝናብ እንደሚኖር በትንበያው ተመላክቶ ነበር፡፡

በተጨማሪም በሰሜን ምስራቅ፣ በምስራቅና በደቡብ ክፍተኛ ቦታዎች ላይ የቀኑ ዝቅተኛ የሙቀት መጠን ከ 5 ዲግሪ ሴልሺየስ በታች እንደሚሆን የሚጠበቅ ሲሆን፣ ከዚህ ጋር ተያይዞ የውርጭ ክስተት በሚዘወተርባቸው በሰሜን ምስራቅ በመካከለኛው እና በምስራቅ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ ውርጭ የመከሰት ዕድሉ ከፍተኛ እንደሚሆን የትንበያ ተስቶ ነበር፡፡

በዚህ ጽሁፍ ውስጥ ባለፉት ሁለት የበጋ ወራት የነበረው የአየር ጠባይ ግምገማና በቀሪዎቹ ወራት ሊኖር የሚችለው የአየር ጠባይ አዝማሚያ እንዲሁም በግብርናው፣ በወሃ ሴክተሮች እና በጤና ላይ አሳድሮ የነበረው የዳሰሳ እንዲሁም ወደፊትም ሊፈጥር የሚችለው ተፅእኖ ላይ ጽሁፍ ቀርቧል፡፡

1.1 እ.ኤ.አ ከኦክቶበር 1 እስከ ኖቬምበር 30/2025 የነበረው የአየር ጠባይ ግምገማ


ባለፉት ሁለት የበጋ ወራት ወደ ሀገራችን ሲገባ የነበረው ዕርጥበት አዘል አየር በተለይም በኦክቶበር ወር ላይ ከመጠናከሩ ጋር ተያይዞ ለበጋ ዝናብ መፈጠር ምቹ የሆኑ የሚቴዎርሎጂ ገጽታዎች ከቀን ወደ ቀን እየተስፋፉ ከመምጣታቸው ጋር ተያይዞ፤ በተለይም በጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው በሁኑት የደቡብ አጋማሽ የሀገሪቱ ስፍራዎች ላይ እንዲሁም በክረምት ወቅት ዝናብ ሲያገኙ የነበሩት የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ የተሻላ ገጽታ ነበራቸው፡፡ በመሆኑም፤ በዚህ ወቅት በመደበኛ ሁኔታ ዝናብ የሚያገኙት የደቡብ ኦሮሚያ ዞኖች፣ የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ደቡባዊ ዞኖች፣ የደቡብ እና የደቡብ ምስራቅ ሶማሌ ዞኖች ላይ ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን ያለው ዝናብ የተመዘገበ ሲሆን፤ አልፎ አልፎ ጠንከር ያለ የደመና ክምችት ተስተውሎባቸዋል፡፡ እንዲሁም ለዝናብ መኖር አመቺ ሁኔታ የሚፈጥሩ የአየር ሁኔታ ክስተቶች መጠናከር በማሳየታቸው ምክንያት በምዕራብ አጋማሽ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ ከነበራቸው የደመና ሽፋን በመጠንም ሆነ በስርጭት የተሻለ ዝናብ የነበራቸው ሲሆን፤ በተለይም በዚህ ወቅት በመደበኛ ሁኔታ ደረቃማ የአየር ሁኔታ የሚስተዋልባቸው የሰሜን ምዕራብ፣ ምዕራብ እና ሰሜን የሀገሪቱ አካባቢዎች በአንዳንድ ቦታዎቻቸው ላይ አልፎ አልፎ በነበሩት ቀናት ወቅቱን ያልጠበቀ አነስተኛ መጠን ያለው ዝናብ ተመዝግቧል፡፡ በተጨማሪም አልፎ አልፎ ከነበረው የደመና ክምችት በጥቂት ስፍራዎች ላይ ቀላል መጠን ያለው ዝናብ ተመዝግቧል፡፡

በአጠቃላይ በኦክቶበር እና በኖቬምበር ወር ውስጥ ከ30 ሚ.ሜ በላይ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ከተመዘገበባቸው ጣቢዎች ለመጥቀስም ያህል አዲስ አበባ 37፣ በሀር ዳር 35.2፣ 46.2፣ 33.8፣ ጎሬ 55.6፣ 31.9፣ ጅማ 32.4፣ ነገሌ 34.5፣ ነቀምት 76፣ አቦቦ 37.4፣ አዴት 36፣ አማን 54.6፣ አርጆ 41.4፣ አሶላ 34.7፣ 54.2፣ አየሁ 31.8፣ ቦሬ 36፣ 46.2፣ ቡለን 38.4፣ 38.2፣ 38.2፣ 32.2፣ ቡሬ 60.5፣ 41፣ 70.7፣ 31.5፣ ቻግኒ 30.5፣ ጨዋቃ 30፣ ዲላ 35፣ ዶሎመና 30.3፣ 30.4፣ ኢጃጂ 47.7፣ ፉኙዶ 32፣ ጋምቤላ 51.8፣ ጊዳ አያና 39.2፣ ቡሌ ሆራ 40፣ ጅንካ 37.7፣ ካቺሴ 35.5፣ ቀብሪ ደሃር 35.9፣ ላሬ 31.4፣ ሊሙገነት 57.5፣ 42.7፣ 39.4፣ ማጂ 31፣ 50.8፣ ማንኩሽ 31፣ ማሻ 90.2፣ 30.4፣ 30.6፣ ምዕራብ አባያ 37፣ ነጆ 34.4፣ 34.5፣ ፓዌ 38.5፣ ሰጢላ 31.2፣ 32.8፣ ሻምቡ 35.8፣ ሽሬ 34.8፣ ቴፒ 54.8፣ ተርጫ 43፣ ያቤሎ 66.4፣ አቦሞሪንጋ 34.6፣ 43.2፣ 52፣ 33.6፣ አጋሮ 33፣ አታንጎ 49፣ 46.5፣ ቢላምቢሎ 33፣ 44.6፣ 36፣ ቦርቃ 42.3፣ መንደር 7 35.7፣ ደበረ ሲና 54.2 ዲመካ 36.7፣ እርምጭ 31.3፣ ጉብይሬ 75.6፣ ጉብቴ 34.7፣ 33.9፣ 33.6፣ 37.3፣ 49.4፣ 59.8፣ 37.8፣ 47.8፣ 48.6፣ 32.8፣ ሃሮ 30.2፣ ሃንቲ 31.4፣

በኢትዮጵያ የሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎርሎጂ ትንበያ፡

ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

ቅዳሜ ገበያ 48.8፣ 37.6፣ 58.6፣ 59.8፣ 48.6፣ 56.7፣ 46.3፣ 48.6፣ 36.8፣ ከቦን 33፣ 37.5፣ 35.5፣ 33፣ ሙጊ 37.7፣ 47.5፣ ኦንጋ 43.3፣ 42.6፣ ተርኮዲ 36.8፣ ትንሹ መጠ 31.3፣ 36.8፣ መንደር 11 46፣ 53.5፣ 96፣ ያንፋ 40.3፣ 30.3፣ 37.8፣ 30.3፣ 37.8፣ 38.4፣ 48.2፣ 30.3፣ 43.5 እንዲሁም ያዩ 42.5 በሚ.ሜ ይገኙበታል፡፡ በአጠቃላይ ባለፉት ሁለት የቦጋ ወራት በስልሳ አራት(64) የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ በ24 ሰዓት ውስጥ ከ30 ሚ.ሜ በላይ የሆነ ከባድ መጠን ያለው የዝናብ መጠን ነበራቸው ፡፡ በተጨማሪም ቦጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታች በሁኑት የደቡብ ኢጋማሽ የሀገሪቱ አካባቢዎች እንዲሁም በአንዳንድ የክረምት ዝናብ ተጠቃሚ በሆኑ የምዕራብና የደቡብ ምዕራብ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ በ24 ሰዓት ውስጥ 50.8- 96 ሚ.ሜ የሚደርስ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ተመዝግቧል (ምስል 1) ፡፡




ምስል:1 ከአክቶበር 1 እስከ ኖቬምበር 30/2025 በ24 ሰዓት ውስጥ ከ50 ሚ.ሜ በላይ ከባድ መጠን ያለው

በኢትዮጵያ የሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎርሎጂ ትንበያ፡

ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

በሌላ በኩል ባለፉት ሁለት የበጋ ወራት የሌሊትና የማለዳው ቅዝቃዜ እምብዛም ያልተጠናከረ ቢሆንም፤ ከኖቬምበር አጋማሽ በኋላ ከሳይኔሪያ ከፍተኛ የአየር ግፊት ላይ በመነሳት ወደ ሀገራችን የሚነፍሰው ደረቅ እና ቀዝቃዛ አየር ከመጠናከሩ ጋር በተያያዘም የበጋው ደረቅ፣ ፀሐይማና ነፋሻማ የአየር ሁኔታ በተለይም በሰሜን፣ ምስራቅ፣ መካከለኛውና ደቡብ ደጋማ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ የለሊቱና የማለዳው ቅዝቃዜ ከአምስት (5) ዲግሪ ሴልሺየስ በታች በታች ሆኖ ተመዝግቧል (ምስል 2) ።



ምስል 2፡ ከአካባቢ 1 እስከ ኖቬምበር 30/2025 በ24 ሰዓት ውስጥ ከአምስት (5) ዲግሪ ሴልሺየስ በታች



ባለፈው የበጋ ወቅት አጋማሽ የዘነበው የዝናብ መጠን ከሀገሪቱ ቦታ ሽፋን አንፃር ሲገመገም በተለይም በጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው በሆኑት ከኦሮሚያ ክልል ጉጂና ምዕራብ ጉጂ፣ ቦረናና ምስራቅ ቦረና፣ ባሌና ምስራቅ ባሌ፣ አርሲና ምዕራብ አርሲ፣ ከደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ወላይታ፣ ጋሞ፣ ጌዲኦ፣ ደቡብ ኦሞ፣ ቡርጂ፣ ኮንሶ፣ አሊ እና ባስኬቶ ዞኖች፣ የሲዳማ ክልል ዞኖች፣ ከሶማሌ ክልል የዳዋ፣ የሊበን፣ አፍዴር፣ የሸበል፣ የነጎብ፣ የቆራሄ የዶሎ፣ የኤረር እና የጃረር ዞኖች ከ31-200 ሚ.ሜ የሚደርስ ከ9-24 ቀናት ያህል ዝናብ ነበራቸው፡፡

በኢትዮጵያ የሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎርሎጂ ትንበያ፡

ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

በተመሳሳይ ቀደም ብሎ የክረምት ወቅት ዝናብ ሰያገኙ የነበሩት ከኦሮሚያ ክልል የቁለም ወለጋ፣ ምዕራብ ወለጋ፣ ምስራቅ ወለጋ፣ ሆሮ ጉድሩ ወለጋ፣ ኢሉባቦር፣ ቡኖ በደሌ፣ ጅማ ዞኖች፣ ከጋምቤላ ክልል አኝዋክ፣ መሻገንግ፣ የኑዌር እና የኢታንግ ልዩ ወረዳ፣ ከቤንሻንጉል ጉምዝ ካማሺ፣ መተከል፣ አሶሳ፣ ማኦ ኮሞ ዞኖች፣ ከደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል ኮንታ፣ ዳዉሮ፣ ከፋ፣ ሸካ፣ ቤንች ሸኮ ዞኖች ከደቡብ ኢትዮጵያ ክልል የጎፋ፣ የወላይታ እና ጌዲዮ ዞኖች፣ የሲዳማ ክልል ዞኖች ላይ ከ151-700 ሚ.ሜ የሚደርስ ዝናብ ከ13-44 ቀናት ያህል ዝናብ ነበራቸዋል (ካርታ 1 እና 2)፡፡

በሌላ በኩል ከአማራ ክልል የሰሜን፣ መካከለኛው፣ ምዕራብና ደቡብ ጎንደር፣ የሰሜን፣ የምዕራብና የምስራቅ ጎጃም፣ የአዊ፣ የባህርዳር ዙሪያ ዞኖች፣ ዞኖች፣ ከትግራይ ክልል ጥቂት የምዕራብና ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ዞኖች ላይ ከ31-200 ሚ.ሜ የሚደርስ ወቅቱን ያልጠበቀ ዝናብ ከ5-12 ቀናት ያህል ዝናብ ነበራቸዋል (ካርታ 1 እና 2) ፡፡

ባለፉት ሁለት የበጋ ወራት የዘነበዉ የዝናብ መጠን ከመደበኛው ጋር ሲነፃፀር በጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸዉ ከሆኑት የሀገሪቱ አካባቢዎች ከኦሮሚያ ክልል የቦረና፣ የምስራቅ ቦረና፣ የጉጂ እና ምዕራብ ጉጂ ዞኖች፣ ከደቡብ ኢትዮጵያ ክልል የጋሞ፣ ባስኬቶ፣ አሪ፣ ኮንሶ፣ ቡርጂ፣ አሌ፣ ጋርዱላ፣ ኮሬ እና ደቡብ ኦሞ ዞኖች፣ ከሱማሌ ዳዋ፣ ሊበን፣ ቆራሂ፣ ዞኖች ላይ በአብዛኛዉ ከመደበኛ ጋር የተቀራረበ የዝናብ መጠን ሲመዘገብ የአፍዴር፣ ሸበሌ፣ ኖጎብ፣ ጃራር እና ዶሎ ዞኖች ከመደበኛ በተች የዝናብ መጠን ተመዝግቧል (ካርታ 3) ፡፡




Ethiopian Meteorology Institute



በኢትዮጵያ የሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎርሎጂ ትንበያ፡




ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ



ካርታ 1 እ.ኤ.አ ከአክቶበር 1 እስከ ከኖቬምበር 30/2025 ድረስ የነበረው የዝናብ መጠን በሚ.ሜ

ካርታ 2 እ.ኤ.አ ከአክቶበር 1 እስከ ከኖቬምበር 30/2025 ድረስ ዝናብ የዘነበባቸው ቀናት ብዛት



ካርታ 3 እ.ኤ.አ ከአክቶበር 1 እስከ ከኖቬምበር 30/2025 ድረስ የነበረው የዝናብ መጠን ከመደበኛው ጋር በመቶኛ ሲነፃፀር

በኢትዮጵያ የሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎርሎጂ ትንበያ፡

ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

እ.ኤ.አ ከኦክቶበር 1 እስከ ኖቬምበር 30/2025 የነበረው የአየር ጠባይ

በግብርና ስራ እንቅስቃሴ ላይ ያሳደረው ተፅዕኖ


በመደበኛ ሁኔታ የበጋ ወቅት አጋማሽ ወራት በአመዛኙ ደረቃማ ሁኔታ የሚያመዝንበት ወቅት ሲሆን ከግብርና እንቅስቃሴ አንፃርም የመኸር አብቃይ በሆኑ አካባቢዎች የሰብል ስብሰባና ድኸረ ሰብል ስብሰባ በስፋት የሚካሄድበት እንዲሁም በደቡብና በደቡብ ምሥራቅ አርብቶ አደርና ከፊል አረብቶ አደሩ አካባቢዎች ለግጦሽ ሳርና ለመጠጥ ውሃ አቅርቦት አመቺ ሁኔታ የሚኖርበት ወቅት ነው። በአንጻሩ የበጋ ወቅት እንደ ዋግ የመሳሰሉ የሰብል በሽታና ተባይ የሚከሰትበት በተጨማሪም በአንዳንድ ደጋማ አካባቢዎች የውርጭ ክስተት በአዝርዕት እድገት ላይ ተጽዕኖ የሚያሳድረበት ወቅት ነው።

እ.ኤ.አ ከኦክቶበር 2025 እስከ በኖቬምበር 2025 የበጋ አጋማሽ ወራት ሲታይ በኦክቶበር እና በኖቬምበር የነበራቸው የእርጥበት ሁኔታ ሲገመገም በተለይም የክረምቱ ዝናብ ሰጪ ክስተቶች ቀስ በቀስ ከመዳከሙ ጋር ተያይዞ የእርጥበት ሁኔታው ከሰሜንና ከሰሜን ምስራቅ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ በመጠንም ሆነ በስርጭት እየቀነሰ በአንጻሩ በምእራብ አጋማሽ እና በመካከለኛው የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ በተወሰነ ደረጃ የቆየበትና በሂደትም የበጋ ዝናብ ተጠቃሚ ወደ ሆኑት ወደ ደቡብና ደቡብ ምስራቅ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ የተስፋፋ እንደነበረ ተስተውሏል። ይህም ሁኔታ በሰሜንና በሰሜን ምስራቅ አካባቢዎች ለሚገኙ ለደረሱና ተጨማሪ እርጥበት የማያስፈልጋቸው ሰብሎችን ለመሰብሰብ በጎ ጎን ነበረው። በሌላ መልኩ በምዕራብ አጋማሽና በመካከለኛው የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ እርጥበቱ የተሻለ ገፅታ የነበረው መሆኑ በተለያዩ የእድገት ደረጃ ላይ ይገኙ ለነበሩ ሰብሎችም ሆነ በአካባቢዎቹ ለሚገኙ ቋሚ ተክሎች በጎ ሚና ነበረው። በአንጻሩ በኖቬምበር ወር በመደበኛ ሁኔታ ደረቃማ የአየር ሁኔታ በሚስተዋልባቸው በተለይም አልፎ አልፎ በሰሜን፣ በሰሜን ምሥራብና በምእራብ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ ሰብል በደረሰባቸው አካባቢዎች የነበረው ወቅቱን ያልጠበቀ እርጥበት በመጠኑም ቢሆን አሉታዊ ተፅዕኖ ነበረው። በጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው በሆኑት የደቡብና የደቡብ ምስራቅ የሀገራችን አካባቢዎች በተለይም በቦረና፣ ጉጂ እና የደቡብ ክልል ደቡባዊ ዞኖች ላይ የተስተዋለው የእርጥበት ሁኔታ ለአርብቶ አደሮችና ከፊል አርብቶ አደሮች ለግጦሽ ሣርና ለመጠጥ ውሃ አቅርቦት ጠቀሜታ ነበረው (ካርታ 4ሀ እና 4ለ) ።

በኢትዮጵያ የሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎርሎጂ ትንበያ፡



ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ




ካርታ 4ሀ፡ በኦክቶበር 2025 ወር የነበረው የእርጥበት ሁኔታ

ካርታ 4ለ፡ በኖቬምበር 2025 ወር የነበረው የእርጥበት ሁኔታ

እ.ኤ.አ ከኦክቶበር 1 እስከ ኖቬምበር 30/2025 የነበረው የአየር ጠባይ በወህወወ ዘርፍ እንቅስቃሴ ላይ ያሳደረው ተፅዕኖ

ባለፉት ሁለት ወራት በተለያዩ የሀገሪቱ ተፋሰሶች ላይ የነበረው የእርጥበት ሁኔታ ስንመለከት በተለይም በኦክቶበር ወር በአብዛኛው አባይ፣ ባሮ አካባቢ፣ አሞ ጊቤ፣ ስምጥ ሸለቆ፣ ገናሌ ዳዋ፣ ዋቢ ሸበሌ፣ እንዲሁም በመካከለኛው እና በታችኛው ተከሄ ተፋሰሶች ላይ ከመጠነኛ እስከ ከፍተኛ የገፀ ምድር ውኃ ፍሰት ነበራቸው፡፡ በተጨማሪም በመካከለኛው አሞ ጊቤ፣ በላይኛው ባሮ አካባቢ፣ በመካከለኛው እና ታችኛው አባይ፣ በጥቂት የላይኛው ገናሌ ዳዋ ተፋሰሶች ላይ በጣም ከፍተኛ የገፀ ምድር ውኃ አግኝተዋል፡፡ ሆኖም የበጋ ተጠቃሚ ተፋሰሶች የሆኑት የመካከለኛው እና የታችኛው አሞ ጊቤ፣ የታችኛው ስምጥ ሸለቆ፣ በጥቂት ላይኛው ዋቢ ሸበሌ በተጨማሪም ወቅታቸው ባለሆኑ ተፋሰሶች በመካከለኛና ታችኛው አባይ፣ እንዲሁም በጥቂት መካከለኛው ተከሄ ተፋሰሶች ላይ ከመጠነኛ እስከ ከፍተኛ የገፀ ምድር የውሃ ፍሰት የነበራቸው ሲሆን ይህ ሁኔታ በአብዛኛው ተፋሰሶች ላይ የሚገኙ በሰው ሰራሽ የውሃ መያዣ ግድቦች ከረዥም ጊዜ አማካይ ጋር ሲነፃፀር የተሻለ ውሃ እንዲይዙ ያስቻለ ነበር፡፡ ካርታ ሀ እና ለ የበጋ አጋማሽ ካርታ (ካርታ 5 ሀ እና ለ)፡፡

በኢትዮጵያ የሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎርሎጂ ትንበያ፡ ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ




ካርታ 50:በአክቶበር 2025 ወር በተፋሰሶች ላይ የነበረው የእርጥበት መጠን

ካርታ 5A:በኖቬምበር 2025 ወር በተፋሰሶች ላይ የነበረው የእርጥበት መጠን

እ.ኤ.አ ከአክቶበር 1 እስከ ኖቬምበር 30/2025 የነበረው የአየር ጠባይ በጤናው ዘርፍ እንቅስቃሴ ላይ ያሳደረው ተፅዕኖ

እ.ኤ.አ ባሳለፍነው የአክቶበርና የኖቬምበር 2025 ወራቶች ላይ የነበረው የአየር ጠባይ ሁኔታ በሰዎች ጤና ላይ ያሳደረውን ተፅዕኖ ስንመለከት በተለይም በአክቶበር ወር አብዛኛው የሀገራችን ክፍል ለወባ መራባትና ስርጭት ከፍተኛ አስተዋፅኦ የነበረው ሲሆን ይህም ሁኔታ በጥቂት የምዕራብ አማራ ዞኖች፣ በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል፣ በሁሉም የምዕራብና የደቡብ አሮሚያ ዞኖች፣ በአብዛኛው የጋምቤላ ክልል፣ የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል፣ የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል፣ የሲዳማ ክልል፣ የመካከለኛው ኢትዮጵያ ክልል እንዲሁም የደቡብ ምዕራብ ሶማሌ ክልል ዞኖች ለወባ ትንኝ መራባትና ስርጭት ከዝቅተኛ እስከ ከፍተኛ ምቹ የአየር ጠባይ ነበራቸው (ካርታ 6)።




ካርታ 6: የበጋ ሁለት ወራቶች ወር ለወባ ስርጭት ምቹ የሆኑ ቦታዎች

በኢትዮጵያ የሚቲዎሮሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቲዎሮሎጂ ትንበያ፡


ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

በሌላ በኩል ባሳለፈው ሁለት የበጋ ወራቶች ላይ የነበረው የሙቀት ተፅዕኖ ስንመለከት በአብዛኛው የሃገሪቱ ክፍሎች ለሰውም ሆነ ለእንስሳት ተስማሚ እንደነበረ የተተነተኑ የጤና ሚቲዎሮሎጂ መረጃዎች ያመለክታሉ። ሆኖም ግን በተወሰኑ የጋምቤላ፣ የአፋር፣ የምዕራብ አማራ ዝቅተኛ ቦታዎች እንዲሁም የደቡብ እና የሰሜን ሱማሌ ዝቅተኛ ቦታዎች ላይ አስጨናቂ የሙቀት ሁኔታ የነበር በመሆኑ በሰዎችም የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴና በእንስሳት ምርትና ምርታማነት እንዲሁም ጤንነት ላይ አሉታዊ ተፅዕኖ እንደነበረው መረጃዎች ያሳያሉ (ካርታ 6 ለ እና ሐ)።



መግለጫ

- በጣም ቀዝቃዛ
- በጣም ምቹ
- መካከለኛ ምቹ
- በጣም ከፍተኛ ሙቀት



መግለጫ

- በጣም ቀዝቃዛ
- የውጥረት ገደብ
- መካከለኛ ውጥረት
- መካከለኛ ውጥረት
- ከባድ ውጥረት
- በጣም ከፍተኛ ውጥረት

ካርታ 6ለ : አጋማሽ የበጋ ወቅት ለሰዎች የነበረው የምቹት ሁኔታ

ካርታ 6 ሐ: አጋማሽ የበጋ ወቅት ለእንስሳት የነበረው የምቹት ሁኔታ



Ethiopian Meteorology Institute





በኢትዮጵያ የሚቲዎሮሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቲዎሮሎጂ ትንበያ፡

ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

እ.ኤ.አ ክሊሴምበር 1/2025 እስከ ጃንዋሪ 31/2026 የሚኖረው የአየር ጠባይ

አዝማሚያ

በመደበኛ ሁኔታ የክሊሴምበር እና የጃንዋሪ ወራቶች በአብዛኛው የበጋ ወቅት የአየር ጠባይ ገፅታዎች የሆኑት ደረቅ፣ ፀሐያማና ነፋሻማ የአየር ሁኔታ የሚያመዝኑበት ከመሆኑም በተጨማሪ የሌሊቱና የማለዳው ቅዝቃዜ በተለይም ለውርጭ ተጋላጭ በሆኑ ደጋማ ቦታዎች ላይ የሚያይልበት ጊዜ ነው። በአንፃሩ አነስተኛ መጠን ያለው ዝናብ በደቡብና በደቡብ ምሥራቅ ኢትዮጵያ እንዲሁም ከበልግ ወቅት መቃረብ ጋር ተያይዞም በጥቂት የሰሜን ምሥራቅ ቦታዎች ላይ ዝናብ ይስተዋላል።

በመጨረሻ ሁለት የበጋ ወራት የትሮፒካል ፓስፊክ ውቅያኖስ አብዛኛው ክፍል የባህር ወለል ቅዝቃዜው እየቀነሰ እንደሚገኝ የተተነበየ ሲሆን፣ በቀሪዎቹ ሁለት የበጋ ወራት እ.ኤ.አ 2025-26 (ክሊሴምበር እና ጃንዋሪ) ከመደበኛው ጋር የተቀራረበ የትሮፒካል ፓስፊክ ውቅያኖስ የባህር ወለል ሙቀት ከታህሳስ ወር በኋላ ቀስ በቀስ ቅዝቃዜው ከመደበኛው ጋር የተቀራረበ (Enso-Neutral) እንደሚሆን እንዲሁም የህንድ ውቅያኖስ የባህር ወለል ሙቀት ከመደበኛው ጋር የተቀራረበ (Neutral-IOD) እንደሚሆን የትንበያ መረጃዎች ይጠቁማሉ።

በመሆኑም በቀጣዮቹ ሁለት የበጋ ወራቶች በአብዛኛው የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ የበጋው ደረቅ፣ ጸሃያማውና ነፋሻማው የአየር ሁኔታ እንደሚዘወተርባቸው የትንበያ መረጃዎች ያሳያሉ። በተለይም በምስራቅ፣ ሰሜን ምስራቅ እና መካከለኛው የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ የቀኑ ዝቅተኛ የሙቀት መጠን ከ 5 ዲግሪ ሴልሺየስ በታች ሊሆን እንደሚችል የትንበያ መረጃዎች ይጠቁማሉ።

በሌላ በኩል ከሚኖረው የደመና ሽፋን ላይ በመነሳት በጥቂት የሰሜን፣ መካከለኛው፣ ምዕራብና ደቡብ ጎንደር ዞኖች፣ ባህርዳር ዙሪያ፣ አዊ፣ በምዕራብና ምስራቅ ጎጃም፣ የምዕራብ ኦሮሚያ ክልል ዞኖች፣ አርሲ እና ምዕራብ አርሲ፣ ባሌ እና ምስራቅ ባሌ ዞኖች፣ ከቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል መተከል፣ አሶሳ፣ ካማሺ እና የማኦኮሞ ልዩ ዞን፣ የጋምቤላ ክልል ዞኖች፣ የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል ዞኖች በተለይም በክሊሴምበር ወር ላይ አልፎ አልፎ በሚኖሩት ቀናት ወቅቱን ያልጠበቀ አነስተኛ መጠን ያለው ዝናብ ያገኛሉ። ስለሆነም በሚኖሩት ደረቅ ቀናቶች የደረሱ ሰብሎች መሰብሰብ አስፈላጊ መሆኑን የኢትዮጵያ ሚቲዎሮሎጂ ኢንስቲትዩት ይጠቁማል። በሌላ በኩል ከበልግ ወቅት መቃረብ ጋር ተያይዞም ከጃንዋሪ አጋማሽ በዋለ በጥቂት የሰሜን ምሥራቅ ቦታዎች ላይ አነስተኛ መጠን ያለው ዝናብ ይኖራቸዋል።

በኢትዮጵያ የሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎርሎጂ ትንበያ፡

ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

እ.ኤ.አ ከዲሴምበር 1/2025 እስከ ጁንዋሪ 31/2026 የሚኖረው የአየር ጠባይ

አዝማሚያ በግብርና ስራ እንቅስቃሴ ላይ ሊያሳድር የሚችለው ተፅዕኖ

በመጨረሻ የዲሴምበር እና የጁንዋሪ ሁለት የበጋ ወራት በአብዛኛው የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ የበጋው ደረቅ፣ ፀሐያማና ነፋሻማ የአየር ሁኔታ ስለሚያመዝን በወቅቱ እየተከናወነ ላለው የግብርና እንቅስቃሴ በጎ ጎን ይኖረዋል፡፡ በመሆኑም በመጨረሻ ወራት በአብዛኛው የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ የሚጠበቀው ደረቅ የአየር ሁኔታ የደረሱ ሰብሎች እንዲደርቁ፣ በጊዜ እንዲሰበሰቡና የድህረ ሰብል ስብሰባ ተግባራትን ለማከናወን አመቺ ሁኔታን ይፈጥራል፡፡ በሌላ በኩል በአንዳንድ ደጋማ በሆኑ የሀገሪቱ ከፍተኛ ቦታዎች ላይ ከቀኑ ዝቅተኛ የሙቀት መጠን የተነሳ በሌሊትና በማለዳ ሊስተዋል የሚችለው ቅዝቃዜና የውርጭ ክስተት በእንሰሳትም ሆነ በመስኖ በመታገዝ ለሚለሙ አትክልቶች፣ የፍራፍሬ ተክሎች እንዲሁም በቋሚ ተክሎች እድገት ላይ አሉታዊ ተፅዕኖ ስለሚኖረው አስፈላጊውን ቅድመ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል፡፡

በአንፃሩ በዲሴምበር ወር ላይ በጥቂት የሰሜን፣ መካከለኛው፣ ምዕራብና ደቡብ ጎንደር፣ ባህርዳር ዙሪያ፣ አዊ፣ ምዕራብና ምስራቅ ጎጃም፣ ምዕራብ ኦሮሚያ፣ አርሲ እና ምዕራብ አርሲ፣ ባሌ እና ምስራቅ ባሌ፣ መተከል፣ አሶሳ፣ ካማሺ፣ ማአኮሞ ልዩ ዞን፣ ጋምቤላ ክልል፣ የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል ዞኖች ላይ አልፎ አልፎ በሚኖሩት ቀናት ወቅቱን ያልጠበቀ አነስተኛ መጠን እርጥበት የሚጠበቅ ሲሆን፣ ይህም ሁኔታ የድህረ ሰብል ስብሰባ በሚከናወንባቸው አካባቢዎች ጉዳት እንዳያደርስ አስፈላጊውን ጥንቃቄ በማድረግ በሚኖሩት ደረቅ ቀናቶች የደረሱ ሰብሎች እንድሰበሰቡ ይመከራል፡፡ በተጨማሪም ከጁንዋሪ ወር አጋማ በኋላ የሚገኘው አነስተኛ መጠን ያለው እርጥበት የበልግ ወቅት የእርሻ እንቅስቃሴን ቀድመው ለሚጀምሩት በደቡብ፣ በደቡብ ምዕራብ፣ በምሥራቅ አማራ፣ እንዲሁም በሰሜን ሸዋ አካባቢ ለሚካሄደው ለማሳ ዝግጅት የእርሻ እንቅስቃሴ ምቹ ሁኔታን እንደሚፈጥር ነው፡፡

እ.ኤ.አ ከዲሴምበር 1/2025 እስከ ጁንዋሪ 31/2026 የሚኖረው የአየር ጠባይ

አዝማሚያ በዉህዉ ዘርፍ እንቅስቃሴ ላይ ሊያሳድር የሚችለው ተፅዕኖ

በሚቀጥሉት የዲሴምበር እና የጁንዋሪ ሁለት ወራት የሚኖረው የአየር ጠባይ በዉህዉ ዘርፍ ሊያሳድር የሚችለው ተፅዕኖ ስንመለከት በመጀመርያው ዲሴምበር ወር በአብዛኛው የሀገሪቱ ተፋሰሶች ላይ የበጋው ደረቅ እና ከፊል ደረቅ እንደሚሆን የሚጠበቅ ሲሆን በሌላ



በኢትዮጵያ የሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎርሎጂ ትንበያ፡

ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

በኩል በደቡብ እና ደቡብ ምስራቅ መጠነኛ የገፀ ምድር ውሃ የሚያገኙበት ወቅት ከመሆኑ ጋር ተያይዞ በመካከለኛው እና በታችኛው አሞ ጊዜ፣ ስምጥ ሸለቆ፣ ገናሌ ዳዋ፣ በመካከለኛው ዋቤ ሸበሌ፣ እንዲሁም በላይኛው እና መካከለኛው ባሮ አካባቢ ተፋሰሶች መጠነኛ የገፀ ምድር የውሃ ፍሰት ያገኛሉ፡፡ ከዚህ ጋር ተያይዞ የሚገኘው ውሃ በተገቢ ሁኔታ በማሰባሰብ ውሃን ለዘላቂ ጥቅም ክብከነት እና ክብክለት መጠቅ ይመከራል፡፡ የተቀሩት ተፋሰሶች ላይ በአብዛኛው አዋሽ፣ ተከኤ፣ አባይ፣ አፋር ደናክል፣ ኦጋዴን፣ አባይ፣ በላይኛው እና መካከለኛው ስምጥ ሸለቆ እና አሞ ጊዜ ደረቅ ሆነው እንደሚቆዩ ይጠበቃል፡፡

እ.ኤ.አ ከዲሴምበር 1/2025 እስከ ጁንዋሪ 31/2026 የሚኖረው የአየር ጠባይ

አዝማሚያ በጤናው ዘርፍ እንቅስቃሴ ላይ ሊያሳድር የሚችለው ተፅዕኖ

በመጨረሻ የዲሴምበርና የጁንዋሪ ሁለት የበጋ ወራቶች ላይ የሚኖረው የአየር ሁኔታ በጤና ላይ ሊያሳድር የሚችለውን የተጽዕኖ ትንበያ ስንመለከት፡ በቀጣይ ሁለት ወራቶች ምንም አይነት ምቹ የሆነ የአየር ሁኔታ ለወባ መፈጠረና ስርጭት የሚስተዋል ባይሆንም ነገር ግን ባሳለፍናቸው ሁለት የበጋ ወራቶች ላይ የነበረው ምቹ የአየር ሁኔታ ለወባ እና ለትንኝ ወለድ በሽታዎች ስርጭት ምቹ የሚሆንበት ሁኔታ የሚፈጠርበት ወራቶች ናቸው፡፡ ስለሆነም በአክቶበርና ኖቨምበር ወራቶች ላይ የነበረውን ምቹ ሁኔታ በሰዎች ላይ አሉታዊ ተፅዕኖ እንዳያመጣ ማህበረሰቡ እና የሚመለከተው አካል ለወባ ተጋላጭ የሆኑ ቦታዎችን ማፅዳትና መከላከል ያስፈልጋል፡፡

በሌላ በኩል በመጨረሻ የዲሴምበርና የጁንዋሪ ወራቶች ላይ የሚኖረውን የአየር ጠባይ ሁኔታ በሰው ልጅ የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴ እና በእሰሳት ተዋጽኦ ላይ ሊያሳድር የሚችለውን ተጽዕኖ ስንመለከት፡ በሀገራችን የደቡብ፣ የሰሜን እንዲሁም የመካከለኛው ከፍተኛ ቦታዎች ላይ የጠዋቱና የማታው የቅዝቃዜ ሁኔታ ከባለፉት ሁለት የበጋ ወራቶች በተለየ እየጨመረ የሚሄድ ሲሆን በሌሎች መካከለኛ እና ዝቅተኛ ቦታዎች ላይ በሰዎች ጤንነት ላይ አሉታዊ ተፅዕኖ የማይኖር ሲሆን በሌላ በኩል ለእንሰሳት ምርትና ምርታማነት እንዲሁም ጤንነት ምንም አይነት አሉታዊ ተፅዕኖ እንደማይኖር ይጠበቃል ያሳያሉ፡፡