



**በኢትዮጵያ የሚቴዎሮሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎሮሎጂ ትንበያ፣
ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ**



ከጃንዋሪ 21-31 የነበረው የአየር ሁኔታ ትንበያ

እንዲሁም

ከፌብሩዋሪ 1-10፣11-20 የሚኖረው የአየር ሁኔታ ትንበያ እና

ምክረ ሃሳብ

ፌብሩዋሪ 2026

አዲስ አበባ



በኢትዮጵያ የሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎርሎጂ ትንበያ፡

ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ




1. እ.ኤ.አ ከጃንዋሪ 21 እስከ 31/2025 የነበረው የአየር ሁኔታ

በጃንዋሪ ሶስተኛው አሥራ አንድ ቀናት በአንዳን የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ የበጋው ደረቅ፣ ፀሐያማና ነፋሻማ የአየር ሁኔታ አመዝግባቸው ተስተውሏል፡፡ በተለይም የሰሜን ምሥራቅ፣ መካከለኛው፣ ምሥራቅ እና ደቡብ ደጋማ የሀገሪቱ ክፍሎች ደረቅ፣ ፀሐያማና ነፋሻማ የአየር ሁኔታ ነበራቸው፡፡ ከዚህ ጋር ተያይዞ የሌሊትና የማለዳው ቅዝቃዜ አልፎ አልፎ በነበሩት ቀናቶች በተዳከመ ሁኔታ የተስተዋለ ሲሆን፣ በጥቂት የሀገሪቱ ደጋማ ሥፍራዎች ላይ የቀኑ ዝቅተኛ የሙቀት መጠን ከ5 ዲግሪ ሴልሽየስ በታች ሆኖ ተመዝግቧል (ምስል 1)፡፡ ለአብነትም ቁሉቢ 4.0፣ 3.8፣ 3.6፣ 3.5፣ 3.1፣ 2.3፣ 2.0፣ 2.0፣ 2.2፣ ጎብዬሬ 4.8፣ ቡሂ 4.0፣ 4.0፣ኮረም 4.5፣ 4.5፣ 4.0፣ ጨለንቆ -1.0፣ 2.0፣ 2.2፣-1.0፣1.0፣-1.0፣1.0፣ አምባ ማሪያም 4.0፣ 4.8፣4.5፣ ጅግጅጋ 4.5፣ 3.0፣ ሐሮማያ 4.6 እና አርሲ ሮቤ 4.5 በዲግሪ ሴልሽየስ ተመዝግቧል፡፡

በሌላ በኩል አልፎ አልፎ በነበሩት ቀናት ለዝናብ መፈጠር ምቹ የሆኑ የሚቴዎርሎጂ ገጽታዎች ነበራቸው፡፡ ከዚህ ጋር ተያይዞ የደቡብ አጋማሽ እና የደቡም ምዕራብ የሀገሪቱ ስፍራዎች ላይ የተሸላ የደመና ሽፋን ነበራቸው፡፡ በተጨማሪም በፀሀይ ኃይል ታግዞ ከተፈጠረው ዝናብ ሰጪ ደመናዎች ጋር ተያይዞ በጥቂት የደቡብ ምዕራብ የሀገሪቱ አካባቢዎች በ24 ሰዓት ውስጥ ከ3 ሚ.ሜ በላይ አነስተኛ መጠን ያለው ዝናብ ተመዝግቦባቸዋል፡፡ በ24 ሰዓት ውስጥ ከ5 ሚ.ሜ በላይ አነስተኛ መጠን ከተመዘገበባቸው የሚቴዎርሎጂ ጣቢያዎች መካከል ደብረ ማርቆስ 21.5፣ ጎሬ 10.5፣ 12.2፣ ጅማ 14.0፣ 7.8፣ ብላቴ 7.8፣ ጭራ 5.9፣ ፍቼ 7.3፣ ጋቲራ 5.3፣ 14.7፣ 17.3፣ ጉንዶ መስቀል 6.0፣ እምድብር 8.5፣ 15.5፣ ሶኮሩ 5.7፣ ተርጫ 10.0፣ ወላይታ ሶዶ 5.1፣ ኮሶ በር 9.3፣ ይርጋለም 16.2 እና ጋሳይ 9.5 ሚ.ሜ ይገኙበታል፡፡

ባለፉት አስራ አንድ ቀናት በጥቂት የሀገሪቱ አካባቢዎች የዘነበዉ የዝናብ መጠን ከቦታ ሽፋን አንፃር ሲገመገም ከ6-40 ሚ.ሜ የሚደርስ ዝናብ ከ1-5 ቀናት ያህል ዝናብ ነበራቸው (ካርታ 1 እና 2)፡፡በአጠቃላይ ባለፉት አስራ አንድ ቀናት የዘነበዉ የዝናብ መጠን ከመደበኛው ጋር ሲነፃፀር በጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው በሆኑት የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ በአብዛኛው ከመደበኛው በታች የዝናብ መጠን ተመዝግቧል (ካርታ 3)፡፡

በኢትዮጵያ የሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎርሎጂ ትንበያ፣ ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ




ካርታ 1 እ.ኤ.አ ከጃንዋሪ 1 እስከ 31/2025 ድረስ የነበረው የዝናብ መጠን በሚ.ሜ

ካርታ 2 እ.ኤ.አ ከጃንዋሪ 1 እስከ 31/2025 ድረስ ዝናብ የዘነበባቸው ቀናት

ካርታ 3 እ.ኤ.አ ከጃንዋሪ 1 እስከ 31/2025 የነበረው የዝናብ መጠን ከመደበኛው ጋር ሲነፃፀር

1.2 እ.ኤ.አ ከጃንዋሪ 21 እስከ 31/2025 የነበረው የአየር ሁኔታ በግብርና ሥራ እንቅስቃሴ ላይ ያሳደረው ተፅዕኖ

ባለፉት አስራ አንድ ቀናት በአብዛኛዎቹ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ የበጋው ደረቅ የእርጥበት ሁኔታ አመዝኖ እንደነበረ የተተነተኑ የግብርና ሚቴዎርሎጂ መረጃዎች ያመለክታሉ። ይህም ሁኔታ የመኸር አብቃይ በሆኑት የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ የድህረ ሰብል ስብሰባ ተግባራትን በተሟላ መልኩ ለማጠናቀቅ አመቺ ሁኔታን የፈጠረ ነበር። ከደረቃማውና ነፋሻማው የአየር ሁኔታ ጋር ተያይዞ የሌሊት እና የማለዳው ቅዝቃዜ በተለይም በአንዳንድ የሰሜን፣ የሰሜን ምስራቅ፣ የምዕራብ፣ የመካከለኛው እና የምስራቅ የሀገሪቱ ደጋማ ስፍራዎች ላይ በአንጻራዊ መልኩ ቅዝቃዜ የተስተዋለ ቢሆንም በሰብሎች ሁለንተናዊ እድገት ላይ ግን የጎሳ ተጸዕኖ አልነበረውም። በሌላም በኩል አልፎ አልፎ በነበሩት ቀናቶች በጥቂት የምዕራብ፣ የመካከለኛው እና የደቡብ የሀገሪቱ ኪስ ቦታዎች ላይ የነበረው እርጥበት ለቋሚ ተክሎችና የበልግ ወቅት እርሻ እንቅስቃሴን ቀድመው ለሚጀምሩ አካባቢዎች ለማሳ ዝግጅት ጠቀሜታ ነበረው (ካርታ 4) ።




ካርታ 4 እ.ኤ.አ ከጃንዋሪ 21 እስከ 31/2025

ድረስ የነበረው የእርጥበት ሁኔታ

1.3 እ.ኤ.አ ከጃንዋሪ 21 እስከ 31/2025 የነበረው የአየር ሁኔታ በውሃው ዘርፍ ላይ ያሳደረው ተፅዕኖ

ባሳለፈናቸው ጃንዋሪ ሶስተኛ አሥራ አንድ ቀናት አብዛኛዎቹ የሀገሪቱ ተፋሰሶች ደረቅ ሁኔታ ስር እንደነበሩ የተተነተኑ የውሃ ሚቴዎርሎጂ መረጃዎች ያመለክታሉ። ሆኖም በጥቂት የመካከለኛ አሞ ጊዜ፣ የላይኛው ዋቢ ሸበሌ እና በጥቂት በመካከለኛው አባይ ተፋሰሶች ላይ የገጸ ምድር እርጥበት የነበራቸው ሲሆን ይህም ሁኔታ ለውሃ ሀብት መሻሻል መጠነኛ አስተዋፅኦ ነበረው። በሌላ በኩል አብዛኛው የአባይ፣ የተከሤ፣ የአዋሽ፣ የስምጥ ሸለቆ፣ የዋቤ ሸበሌ፣ የአይሻ፣ የመረብ ጋሽ እና የኦጋዴን ተፋሰሶች፣ የበጋው ደረቅ ሁኔታ ስር ቆይተው ነበር (ካርታ 5)።



ካርታ 5 እ.ኤ.አ ከጃንዋሪ 21 እስከ 31/2025

ድረስ የነበረው የእርጥበት ሁኔታ

በኢትዮጵያ የሚቲዎሮሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቲዎሮሎጂ ትንበያ፡



ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ


2. መግቢያ

የፌዴራል ወር በመደበኛ ሁኔታ የበልግ ዝናብ የሚጀምርበት ጊዜ ነው፡፡ በተለይም ከወሩ አጋማሽ በኋላ ዝናብ ሰጭ የሚቲዎሮሎጂ ገጽታዎች እየተጠናከሩ ከመሄዳቸው ጋር ተያይዞ የደቡብ ምዕራብ፣ ደቡብ፣ ሰሜን ምሥራቅ፣ የምሥራቅ፣ የመካከለኛውና አገራባች የስምጥ ሸለቆ ሥፍራዎች የተለያየ መጠን ያለው ዝናብ ያገኛሉ፡፡ በመደበኛ ሁኔታ በፌዴራል የመጀመሪያው አሥር ቀናት በደቡብ ምዕራብና በደቡብ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ ከሚስተዋለው አነስተኛ መጠን ያለው እርጥበት በስተቀር በአብዛኛው የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ ደረቃማው የአየር ሁኔታ ያመዝናል፡፡


2.1 እ.ኤ.አ ከፌዴራል 1-10/2026 የሚኖረው የአየር ሁኔታ ትንበያ

በፌዴራል የመጀመሪያዎች አሥር ቀናት ለዝናብ መፈጠር አስተዋጽኦ ሊያደርጉ የሚችሉ የሚቲዎሮሎጂ ገጽታዎች ቀስ በቀስ እየተጠናከሩ እንደሚሄዱ የትንበያ መረጃዎች ይጠቁማሉ፡፡ ከዚህ ጋር ተያይዞ ለዝናብ መፈጠር ምቹ ሁኔታን የሚፈጥሩ የሚቲዎሮሎጂ ገጽታዎች አልፎ በሚኖሩት ቀናቶች ላይ የተሻለ ገፅታ ይኖራቸዋል (ካርታ 6)፡፡ በተለይም የስምጥ ሸለቆ እና አዋሳኝ አካባቢዎች፣ የመካከለኛውና የደቡብ ምዕራብ አካባቢዎች ላይ የደመና ሽፋን እንደመጨምር ይጠበቃል፡፡ በተጨማሪም ከሚጠናከሩት የሚቲዎሮሎጂ ገጽታዎች ላይ በመነሳት በተለይም በደቡብ ምዕራብ እና በሰሜን ምስራቅ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ አነስተኛ መጠን ያለው ዝናብ እንደሚኖረው አሃዛዊ የትንበያ መረጃዎች ይጠቁማሉ (ካርታ 1)፡፡ በሌላ በኩል በጋምቤላ፣ በሰሜን ምዕራብ፣ በሰሜን ምስራቅና በደቡብ ምስራቅ አካባቢዎች ላይ የቀኑ ከፍተኛ የሙቀት መጠን ከ 29 ዲግሪ ሴልሲየስ በላይ እንደሚሆን የትንበያ መረጃዎች ያሳያሉ (ካርታ 7)፡፡

Total Rainfall (mm) for 01-11 Feb 2026



Daily maximum temperature (C) for 01-11 Feb 2026



ካርታ 6 እ.ኤ.አ. 1 ከፌዴራል 1-10/2026,
የሚኖረው የዝናብ መጠን በሚ.ሜ

ካርታ 7 እ.ኤ.አ. 1 ከፌዴራል 1-10/2026
የሚኖረው ከፍተኛ የሙቀት መጠን በዲ.ሴ

በኢትዮጵያ የሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎርሎጂ ትንበያ፡

ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

ሠንጠረዥ 1፡ በሚቀጥሉት አስር ቀናት ዝናብ የሚያገኙ አካባቢዎችና በ24 ሰዓት ውስጥ የሚኖረው የዝናብ መጠን

በጥቂት ቦታዎቻቸው ላይ አነስተኛ መጠን ዝናብ የሚያገኙ አካባቢዎች

ክልል	ዞን	የሚኖረው የዝናብ መጠን
አሮሚያ	ኢ.ሉ.ባቦር፣ ጅማ እና ቡኖ በደሴ	አነስተኛ መጠን (ከ1-10 ሚ.ሜ)
አማራ	የደቡብ እና የሰሜን ወሎ ዞኖች	አነስተኛ መጠን (ከ1-10 ሚ.ሜ)
ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ	የሸኮ፣ ከፋ፣ ኮንታ፣ ዳውሮ፣ ቤንሻ ሸኮ እና ሸካ ዞኖች	አነስተኛ መጠን (ከ1-10 ሚ.ሜ)
ደቡብ ኢትዮጵያ	የወላይታ፣ ጎፋ፣ ጋሞ፣ ጌዲዮ፣	አነስተኛ መጠን (ከ1-10 ሚ.ሜ)
ሲዳማ		አነስተኛ መጠን (ከ1-10 ሚ.ሜ)

2.2 እ.ኤ.አ ከፌብሩዋሪ 11 እስከ 20/2026 የሚኖረው የአየር ሁኔታ

አዝማሚያ

በመደበኛ ሁኔታ የፌብሩዋሪ ሁለተኛው አሥር ቀናት የበልግ ዝናብ የሚጀምርበት እና የሚቴዎርሎጂ ገጽታዎች የሚጠናከሩበት ጊዜ ነው፡፡ ስለሆነም የደቡብ ምዕራብ፣ የመካከለኛው፣ የሰሜን ምሥራቅና የምሥራቅ የሀገሪቱ ክፍሎች ዝናብ ማግኘት ይጀምራሉ፡፡ በመጨረሻም የፌብሩዋሪ ሁለተኛ አሥር ቀናት አሁን እየተስተዋለ ያለው ዝናብ ሰጭ የሚቴዎርሎጂ ገጽታዎች በአብዛኛዎቹ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ ቀጣይነት እንደሚኖረው የትንበያ መረጃዎች ይጠቁማሉ፡፡ ከዚህም ጋር ተያይዞ ከሚጠናከሩት የሚቴዎርሎጂ ገጽታዎች ላይ በመነሳት በተለይም በደቡብ ምዕራብ፣ በመካከለኛ እና በሰሜን ምስራቅ የሀገራችን አካባቢዎች ላይ ቀላል መጠን ያለው ዝናብ እንደሚኖራቸው አፃፃፂ የትንበያ መረጃዎች ፡፡

በኢትዮጵያ የሚቲዎሮሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቲዎሮሎጂ ትንበያ፡

ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

2.3 እ.ኤ.አ ከፌብሩዋሪ 1 እስከ 10/2026 የሚኖረው የአየር ሁኔታ በግብርናው ሥራ እንቅስቃሴ ላይ ሊያሳድር የሚችለው ተፅዕኖ

በሚቀጥሉት የፌብሩዋሪ የመጀመሪያዉ አስር ቀናት በደቡብ ምዕራብ እና በሰሜን ምስራቅ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ የሚጠበቀው አነስተኛ መጠን ያለው እርጥበት ለቋሚ ተክሎች የውሃ ፍላጎት መሟላትና ለአርብቶ አደርና ከፊል አርብቶ አደር አካባቢዎች የግጦሽ ሳርና የመጠጥ ውሃ አቅርቦትን ከማሻሻል አንፃር አዎንታዊ ሚና ይኖረዋል፡፡ በተጨማሪም የበልግ ወቅትን ቀድመው ለሚጀምሩ አካባቢዎች ማሳን አስቀድሞ ለማዘጋጀት ጠቀሜታ ይኖረዋል፡፡ በመሆኑም የሚኖሩ ስጋቶችን ለመቀነስና መልካም አጋጣሚዎች ለመጠቀም ከታች የቀረቡትን ቦታ ተኮር የግብርና ሚቲዎሮሎጂ ምክረ ሀሳቦች በተገቢው ሁኔታ መተግበር ያስፈልጋል፡፡

ሠንጠረዥ 2፡ በሚቀጥሉት አስር ቀናት የሚኖረው የእርጥበት ሁኔታ በግብርናው እንቅስቃሴ ላይ

የመኸር ሰብል አብቃይና የበልግ እርሻ እንቅስቃሴን ቀድመው የሚጀምሩ አካባቢዎች				
ዞኖች	የእርጥበት ሁኔታ	አዎንታዊ ተጽዕኖ	አሉታዊ ተጽዕኖ	የተሰጠ ምክረ ሃሳብ
የኢሉባቦር፣ ጅማ ፣ቡኖ በደሴ ፣ የደቡብ እና ሰሜን ወሎ፣ ሸኮ፣ ከፋ፣ ኮንታ፣ ዳውሮ፣ ቤንች ሸኮ፣ ሸካ፣ ወላይታ፣ ጎፋ፣ ጋሞና ጌዲዮ ዞኖች	• አነስተኛ መጠን ያለው እርጥበት	• ለበልግ እርሻ እንቅስቃሴ ቀድሞ የማሳ ዝግጅት ለማከናወን • ለቋሚ ተክሎች ዕድገት • የግጦሽ ሳር እና የመጠጥ ውሃ አቅርቦትን ለማሻሻል	• ለሰብል መዝራት በቂ ያለሆነ እርጥበት • ተከታታይ ደረቅ ሰሞናት • ከፍተኛ ትነት	• የበልግ እርሻ እንቅስቃሴ ቀድመው የሚጀምሩ አካባቢዎች የሚገኘውን እርጥበት በአግባቡ መጠቀም



በኢትዮጵያ የሚቲዎሮሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቲዎሮሎጂ ትንበያ፡

ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

2.4 እ.አ.አ ከፌብሩዋሪ 1-10/2026 የሚኖረው የአየር ሁኔታ በውሃ ዘርፍ

ላይ ሊያሳድር የሚችለው ተፅዕኖ

በሚቀጥሉት የፌብሩዋሪ የመጀመርያ አስር ቀናት በጥቂት ተፋሰሶች ላይ ዝቅተኛ የሆነ የገፀ ምድር ውሃ ፍሰት ይኖራቸዋል፡፡ በመሆኑም የሚኖሩ ስጋቶችን ለመቀነስና መልካም አጋጣሚዎች ለመጠቀም ከታች የቀረቡትን ቦታ ተኮር የውሀ ሚቲዎሮሎጂ ምክረ ሀሳቦች በተገቢው ሁኔታ መተግበር ያስፈልጋል፡፡

ሠንጠረዥ 3፡ በሚቀጥሉት አስር ቀናት የሚኖረው የእርጥበት ሁኔታ በዉሀዉ ዘር ላይ

ሊኖር የሚችለው ተጽዕኖ

የውኃ ተፋሰሶች	የእርጥበት ሁኔታ	አዎንታዊ ተጽዕኖ	አሉታዊ ተጽዕኖ	የውኃ ሚቲዎሮሎጂ ምክረ ሃሳብ
በላይኛው እና በመካከለኛ አዋ ጊዜ፤ በላይኛው ስምጥ ሸለቆ፤ በመካከለኛ አባይ፤ በጥቂት ላይኛው ገናሌ ዳዋ እና አዋሽ	ከመካከለኛ እስከ ከመጠነኛ		• አንጻራዊ የትነት መጨመር	• የሚገኘውን ውሃ ከብክነት እና ከብክለት መጠበቅ • ውሃን በተገቢ ሁኔታ ማሰባሰብ
በአብዛኛው፤ ተከቤ፤ አዋሽ፤ ዋቢ ሸበሌ፤ ገናሌ ዳዋ፤ አፋር ደናክል፤ መረብጋሽ፤ አጋዴን እና አይሻ፤	ደረቅ ሁኔታ	• የውሃ ብክለት እና የአፈር መሸርሸር አደጋዎችን ይቀንሳል	• የወንዞች የውሃ መጠን መቀነስ	• ውሃን በአግባቡና በቁጠባ መጠቀም • ውሃ ለአስፈላጊ ፍላጎቶች ብቻ መጠቀም

Ethiopian Meteorology Institute

