

በኢትዮጵያ የሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎርሎጂ ትንበያ፣
ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

በኢትዮጵያ የሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎርሎጂ ትንበያ፣
ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ



ከጁላይ 11-20/2026 የነበረው የአየር ሁኔታ እና

ከጁላይ 21-31 እና ከኦገስት 1-10/2026 የሚኖረው

የአየር ሁኔታ ትንበያ እና ምክረ ሃሳብ

ጁላይ 2026

አዲስ አበባ

በኢትዮጵያ የሚቲዎሮሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቲዎሮሎጂ ትንበያ፡

ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

1. እ.ኤ.አ ከጁላይ 11 እስከ 20/2026 የነበረው የአየር ሁኔታ


ባለፉት አስር ቀናት በደቡብ ምዕራብ፣ ምዕራብ፣ ሰሜን ምዕራብ፣ መካከለኛው እና ምስራቅ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ የተሻለ የደመና ሽፋን ነበራቸው፡፡ ከዚህ ጋር ተያይዞ በደቡብ ምዕራብ፣ ምዕራብ፣ ሰሜን ምዕራብ እና በመካከለኛው የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ በ24 ሰዓት ውስጥ ከመካከለኛ እስከ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ተመዝግቦባቸዋል፡፡ በ24 ሰዓት ውስጥ ከ20 ሚ.ሜ በላይ ዝናብ ከተመዘገበባቸው የሚቲዎሮሎጂ ጣቢያዎች መካከል አዲስ አበባ ቦሌ 33.2፣ ባህር ዳር 52፣ 21.8፣ 23.3፣ ኮምቦልቻ 35.8፣ ጎሬ 38.5፣ ጅማ 96.3፣ 38.6፣ መተሃራ 20.5፣ ነቀምት 21፣ 50.7፣ ሮቤ 30.4፣ አይራ 36፣ አለምከተማ 26.5፣ አማን 21.7፣ አምባማሪያም 50.2፣ 42.6፣ አምደወርቅ 24.4፣ አንገርጉትን 23.6፣ አርጆ 28.4፣ 20.6፣ አሶሳ 39.5፣ አዋሽ አርባ 25፣ አይከል 28.3፣ 25.3፣ በደሌ 20.3፣ ቦሬ 36.6፣ ቡሂ 25.3፣ ቡለን 20፣ ቡሬ 58.8፣ 76.2፣ ጭራ 25.7፣ 70፣ 26.8፣ ደባርቅ 31፣ ደብርብርሃን 32.7፣ ደብርታቦር 20.1፣ 34.4፣ ደምቢዶሎ 25.2፣ 36.3፣ ፊቼ 22.4፣ ፋኙዶ 36.6፣ 48፣ ጋቲራ 21.8፣ ገለምሶ 22፣ ጊዳኦያና 25.8፣ ጊምቢ 22.3፣ 25.7፣ ጉንዶመስቀል 31.7፣ ሆሳዕና 41.1፣ እምድብር 22.6፣ ጅንካ 21.9፣ ካቺሴ 44.4፣ 27.7፣ ሊሙገነት 62.7፣ 22፣ ማጀቱ 29.5፣ ማንኩሽ 26፣ 22.2፣ መሃልሜዳ 47.6፣ መተማ 29.2፣ ሞጣ 24.1፣ ነጆ 22.2፣ 39.7፣ ሳሁላ 20፣ ሻሁራ 21፣ 22.1፣ ሻምቡ 40.8፣ ሾላገበያ 50.7፣ ተርጫ 25.6፣ ወረኢሌ 47፣ የትኖራ 26.4፣ አባይ ሸለቆ 20.3፣ አቦሞሪንጋ 36.3፣ አዳሚቱሉ 29.3፣ አዲስዘመን 20፣ አጋሮ 22.5፣ አቃቂ 21፣ አንጋጫ 23፣ አንኮበር 27.1፣ አሺ 22.4፣ 26፣ 32.4፣ 22.8፣ አሸሬ 22.8፣ አሳሳ 25፣ ቡልቂ 26.4፣ 36.6፣ 26፣ 36.1፣ ጨፌዶንሳ 31.2፣ ጨለንቆ 26.8፣ ደበረሲና 23.9፣ ደነባ 27.3፣ ጋሳይ 33.2፣ 29.2፣ ጋሸና 26.7፣ ጊሽራቤል 44፣ ጎብየሬ 20.8፣ 35.6፣ ጉጉፍቱ 38.2፣ 49.6፣ ሃይቅ 20.8፣ ሃሮ 20.2፣ ሆሮዶዮ 30፣ ቅዳሜ ገበያ 26.7፣ 20.4፣ 36.6፣ 27.8፣ 26.7፣ 20.8፣ ኮሶበር 30.5፣ 36.4፣ ላሎቂሎ 22.4፣ 26.5፣ 29.1፣ ማርዬ 20.4፣ ማያንሳ 39.4፣ መቂ 24፣ አሞናዳ 28፣ 31.2፣ 28.8፣ አንጋ 21.6፣ 24.8፣ 30፣ ሰዲቃ 27.2፣ 21.9፣ ሸብለበረንታ 25.5፣ ሼንዲ 21.5፣ ተርኮዲ 20.5፣ 26.8፣ ፅጌረዳ 20.7፣ መንደር13 24.2፣ 34.2፣ 32.4፣ 30.4፣ መንደር11 20፣ 46.5፣ 22፣ ገምቤ 25.4፣ እንዲሁም ሮቤሃይስኩል 26.5 ሚ.ሜ የሚደርስ ከመካከለኛ እስከ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ተመዝግቦባቸዋል፡፡ በአጠቃላይ ባለፉት አስር ቀናት በ44 የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ በ24 ሰዓት ውስጥ ከ30 ሚ.ሜ በላይ የሆነ ከባድ መጠን ያለው የዝናብ መጠን ነበራቸው፡፡ በተጨማሪም በአንዳንድ የክረምት ዝናብ ተጠቃሚ በሆኑ የምዕራብ፣ የደቡብ ምዕራብና የሰሜን ምዕራብ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ በ24 ሰዓት ውስጥ 40.8-96.3 ሚ.ሜ የሚደርስ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ተመዝግቧል፡፡ ከ45 ሚ.ሜ በላይ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ከተመዘገበባቸው የሀገሪቱ አካባቢዎች መካከል በጅማ፣ ቡሬ፣ ጭራ፣ ሊሙገነት፣ ባህርዳር፣ ነቀምት፣ ሾላ ገበያ፣ አምባ ማሪያም ጉጉፍቱ፣ ፋኙዶ፣ መሃልሜዳ፣ ወረኢሌ፣ መንደር11 ይገኙበታል፡፡

በኢትዮጵያ የሚቲዎሮሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቲዎሮሎጂ ትንበያ፡


ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

ባለፉት አስር ቀናት የዘነበዉ የዝናብ መጠን ከሀገሪቱ ቦታ ሽፋን አንፃር ሲገመገም፤ ከኦሮሚያ ክልል ኢሉባቦር፤ ቡኖ በደሌ፤ ጅማ፤ ቄለም ወለጋ፤ ምዕራብ ወለጋ፤ ምስራቅ ወለጋ፤ ሆሮ ጉድሩ ወለጋ፤ ሁሉም የሸዋ ዞኖች፤ ሸገር ከተማ፤ አርሲ፤ ምዕራብ ሐረርጌ ዞኖች፤ ከአማራ ክልል የሰሜን፤ ምዕራብ፤ መካከለኛውና ደቡብ ጎንደር፤ ባህርዳር ዙሪያ፤ የሰሜን፤ ምዕራብና ምስራቅ ጎጃም፤ አዊ፤ የደቡብ እና የሰሜን ወሎ፤ ሰሜን ሸዋ ዞኖች፤ ከትግራይ ክልል የምዕራብ፤ የሰሜን ምዕራብ እና መካከለኛው ትግራይ ዞኖች፤ ከቤንሻንጉል ጉምዝ ካማሺ፤ መተከል፤ አሶሳ፤ ማኦ ኮሞ ልዩ ወረዳ፤ ከጋምቤላ ክልል አኝዋክ፤ መሻርንግ፤ ኑዌር እና ኢታንግ ልዩ ወረዳ፤ ከደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል ሸካ፤ ቤንች ሸከ፤ ከፋ፤ ኮንታ፤ ዳዉሮ፤ ምዕራብ አሞ ዞኖች፤ ከማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ጉራጌ፤ ምስራቅ ጉራጌ፤ ሀዲያ፤ የም፤ ስልጤ፤ ሃላባ፤ ከምባታ ዞኖች፤ ከደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ወላይታ፤ ጎፋ፤ ባስኬቶ ደቡብ አሞ ዞኖች፤ አዲስ አበባ ላይ ከ31-190 ሚ.ሜ የሚደርስ ዝናብ ከ4-10 ቀናት ያህል ዝናብ ነበራቸዉ (ካርታ 1 እና 2)፡፡


ባለፉት አስር ቀናት የዘነበዉ የዝናብ መጠን ከመደበኛው ጋር ሲነፃፀር ሲገመገም፤ ከኦሮሚያ ክልል ኢሉባቦር፤ ቡኖ በደሌ፤ ጅማ፤ ቄለም ወለጋ፤ ምዕራብ ወለጋ፤ ምስራቅ ወለጋ፤ ሆሮ ጉድሩ ወለጋ፤ ሁሉም የሸዋ ዞኖች፤ ሸገር ከተማ፤ አርሲ፤ ምዕራብ አርሲ፤ ምስራቅ ባሌ፤ ምዕራብ ሐረርጌ፤ ምዕራብ ጉጂ ዞኖች፤ ከአማራ ክልል የሰሜን፤ ምዕራብ፤ መካከለኛውና ደቡብ ጎንደር፤ ባህርዳር ዙሪያ፤ የሰሜን፤ ምዕራብና ምስራቅ ጎጃም፤ አዊ፤ የደቡብ እና የሰሜን ወሎ፤ ሰሜን ሸዋ ዞኖች፤ ከትግራይ ክልል የምዕራብ እና የሰሜን ምዕራብ ትግራይ ዞኖች፤ ከቤንሻንጉል ጉምዝ ካማሺ፤ መተከል፤ አሶሳ፤ ማኦ ኮሞ ልዩ ወረዳ፤ ከጋምቤላ ክልል አኝዋክ፤ መሻርንግ፤ ኑዌር እና ኢታንግ ልዩ ወረዳ፤ ከደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል ሸካ፤ ቤንች ሸከ፤ ከፋ፤ ኮንታ፤ ዳዉሮ፤ ምዕራብ አሞ ዞኖች፤ ከማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ጉራጌ፤ ምስራቅ ጉራጌ፤ ሀዲያ፤ የም፤ ስልጤ፤ ሃላባ፤ ከምባታ ዞኖች፤ ከደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ወላይታ፤ ጎፋ፤ ባስኬቶ ደቡብ አሞ ዞኖች፤ አዲስ አበባ መደበኛ እና ከመደበኛ በላይ የሆነ የዝናብ መጠን ተመዝግቧል (ካርታ 3) ፡፡



ካርታ 1 እ.ኤ.አ ጁላይ 11 እስከ 20 /2026 ድረስ የነበረው የዝናብ መጠን በሚ.ሜ



ካርታ 2 እ.ኤ.አ ጁላይ 11 እስከ 20/2026 ድረስ ዝናብ የዘነበባቸዉ ቀናት



ካርታ 3 እ.ኤ.አ ጁላይ 11 እስከ 20 /2026 የነበረዉ የዝናብ መጠን ከመደበኛው ጋር ሲነፃፀር

1.2 እ.ኤ.አ ከጁላይ 11 እስከ 20/2026 የነበረው የአየር ሁኔታ በግብርና ሥራ እንቅስቃሴ ላይ ያሳደረው ተፅዕኖ

ባለፉት አስር ቀናት በተለይም በሰሜን፣ ሰሜን ምዕራብ፣ ደቡብ ምዕራብና ምዕራብ እንዲሁም በመካከለኛው የመኸር ሰብል አብቃይ በሆኑ አካባቢዎች ላይ ከመካከለኛ እስከ ከፍተኛ መጠን ያለው እርጥበት ነበራቸው። ይህም ሁኔታ የመካከለኛና የአጭር ጊዜ ሰብሎችን ለመዝራት ጥሩ አስተዋጾ የነበረው ሲሆን፤ እንዲሁም የረጅም ጊዜ የመኸር ሰብሎች እድገት የጎላ አስተዋፅኦ ነበረው። በተጨማሪም በምስራቅና በሰሜን ምስራቅ የነበረው አነስተኛ መጠን ያለው እርጥበት ለአርብቶ አደርና ከፊል አርብቶ አደር አካባቢዎች የተፈጥሮንም ሆነ የሰው ሰራሽ የውሃ ምንጮችን በማጎልበት ለመጠጥ ውሃና ለግጦሽ ሳር አቅርቦት አዎንታዊ ሚና ነበረው። በአንጻሩ በተወሰኑ የሰሜንና የሰሜን ምስራቅ የመኸር ሰብል አብቃይ አካባቢዎች ላይ ከዝናብ መቆራረጥ ጋር ተያይዞ የአፈር ውስጥ እርጥበት እጥረት የተስተዋለ ሲሆን ይህም ሁኔታ በተዘሩ ሰብሎች እድገት ላይ መጠነኛ አሉታዊ ተጽዕኖ ነበረው። በተጨማሪም በአንዳንድ አካባቢዎች ላይ የነበረው ከባድ ዝናብ የአፈር ውስጥ እርጥበት መብዛት ጋር ተያይዞ የደረሱ የበልግ ሰብሎች ላይ እድገት ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ ነበረው (ካርታ 4)።


1.3 እ.ኤ.አ ከጁላይ 11 እስከ 20/2026 የነበረው የአየር ሁኔታ በውሃው ዘርፍ ላይ ያሳደረው ተፅዕኖ

ባሳለፍናቸው የጁላይ ሁለተኛ አሥር ቀናት በአብዛኛው አባይ፣ ኦሞ ጊቤ፣ ባሮ አኮቦ፣ ተከቤ፣ በላይኛውና መካከለኛ ስምጥ ሸለቆ፣ በላይኛውና መካከለኛ ዋቢ ሸበሌ እንዲሁም በላኛው ገናሌ ዳዋ ተፋሰሶች ላይ እጅግ በጣም ከፍተኛ የሆነ የገፀ ምድር የውሃ ፍሰት ነበራቸው። በተጨማሪም ተከቤ፣ አባይ፣ በላይኛው አዋሽ፣ በመካከለኛው ኦሞ ጊቤና ስምጥ ሸለቆ ተፋሰሶች ላይ በጣም ከፍተኛ የገጸምደረ የውሃ ፍሰት የነበረ ሲሆን በተጨማሪም በመካከለኛ አዋሽ፣ በአፋር ደናክል፣ በታችኛው ኦሞ ጊቤ፣ እንዲሁም በላይኛው ተከቤ፣ በአይሻ እና በላይኛው ጥቂት የኦጋዴን ተፋሰሶች ከመጠነኛ መጠን ያለው የገፀ ምድር ውሃ ፍሰት ነበራቸው። ይህ ሁኔታ ለገጸ ምድር፣ ለከርሰ ምድር፣ ለመስኖ፣ ለሃይል ማመንጫ እንዲሁም የመጠጥ ውሃ አቅርቦትን

በኢትዮጵያ የሚቴዎሮሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎሮሎጂ ትንበያ፡


ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

ከማሻሻል አንጻር ከፍተኛ አስተዋፅዖ እንደነበራቸው የተተነተኑ የውሃ ሚቴዎሮሎጂ መረጃዎች ያመለክታሉ (ካርታ 5)።



ካርታ 4 እ.ኤ.አ ከጁላይ 11 እስከ 20/2026

ድረስ የነበረው የእርጥበት ሁኔታ



ካርታ 5 እ.ኤ.አ ከጁላይ 11 እስከ 20/2026

ድረስ የነበረው የእርጥበት ሁኔታ



Ethiopian Meteorology Institute




2. እ.ኤ.አ ከጁላይ 21 እስከ 31/2026 የሚኖረው የአየር ሁኔታ ትንበያ

በጁላይ ሶስተኛው አስራ አንድ ቀናት ለክረምት ዝናብ መፈጠር

ምቹ ሁኔታን የሚፈጥሩ የሚቲዎሮሎጂ ገጽታዎች ይበልጥ እየተስፋፉ እየተጠናከሩ እንደሚሄዱ አሃዛዊ የትንበያ መረጃዎች ይጠቁማሉ (ካርታ 6)፡፡ ከዚህ ጋር በተያያዘም በደቡብ ምዕራብ፣ ምዕራብ፣ ሰሜን ምዕራብ፣ ሰሜን፣ መካከለኛው፣ ሰሜን ምስራቅ እና ምስራቅ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ የተሻለ የዝናብ መጠንና ሥርጭት ይኖራቸዋል (ካርታ 6)፡፡ በመሆኑም በደቡብ ምዕራብ፣ ምዕራብ፣ ሰሜን ምዕራብና ሰሜን የሀገራችን አካባቢዎች በብዙ ቦታዎቻቸው ላይ ከመካከለኛ እስከ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ይኖራቸዋል፡፡ በተጨማሪም በመካከለኛው፣ ሰሜን ምስራቅ፣ ምስራቅና ደቡብ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን ያለው ዝናብ እንደሚኖራቸው አሃዛዊ የትንበያ መረጃዎች ያመለክታሉ (ካርታ 6)፡፡

Total Rainfall (mm) for 21 Jul-01 Aug 2026



ካርታ 6 እ.ኤ.አ. ከጁላይ 21-31/2026 የሚኖረው የዝናብ መጠን በሚ.ሜ

2.1 የሚኖረው የዝናብ ሁኔታ

በሚቀጥሉት አስራ አንድ ቀናቶች ከሚጠናከሩት የሚቲዎሮሎጂ ገጽታዎች ላይ በመነሳት የክረምት ዝናብ ተጠቃሚ በሆኑ የሀገሪቱ አካባቢዎች ብዙ ቦታዎቻቸውን የሚሸፍን ከመካከለኛ እስከ ከባድ (ከ11-30 ሚ.ሜ) መጠን ያለው ዝናብ ያገኛሉ፡፡ በተጨማሪም በውሃ አካላትና በከባቢ አየር ውስጥ ከሚጠናከሩት የሚቲዎሮሎጂ ገጽታዎች ላይ በመነሳት በደቡብ ምዕራብ፣ ምዕራብ፣ ሰሜን ምዕራብ፣ ሰሜን እና በመካከለኛው የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ በ24 ሰዓት ውስጥ ከ30 ሚ.ሜ በላይ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ እንደሚያገኙ አሃዛዊ የትንበያ መረጃዎች ይጠቁማሉ (ካርታ 6) ፡፡

በኢትዮጵያ የሚቲዎሮሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቲዎሮሎጂ ትንበያ፡

ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

ሠንጠረዥ 1፡ በሚቀጥሉት አስር ቀናት ዝናብ የሚያገኙ አካባቢዎችና በ24 ሰዓት ውስጥ የሚኖረው የዝናብ መጠን

ክልል	ዞን	በ 24 ሰዓት ውስጥ የሚኖረው የዝናብ መጠን
አሮሚያ	ቄለም ወሊጋ፣ ምዕራብ ወሊጋ፣ ምስራቅ ወሊጋ፣ ሆሮ ጉድሩ ወሊጋ፣ ኢሉባቦር፣ ቡኖ በደሌ፣ ጅማ፣ ምዕራብ አርሲ፣ ሸገር ሲቲ እና ሁሉም የሸዋ ዞኖች	ከመካከለኛ እስከ ከባድ መጠን (ከ11 እስከ 30 ሚ.ሜ በላይ)
	አርሲ፣ ምስራቅ እና ምዕራብ ሐረርጌ፣ ምዕራብ ጉጂ እና ጉጂ፣ ባሌ፣ ምስራቅ ባሌ፣ ጥቂት የምስራቅ ቦረና ዞን	ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን (ከ1-29 ሚ.ሜ)
አማራ	የምዕራብ፣ መካከለኛ፣ ደቡብ እና ሰሜን ጎንደር፣ የባህርዳር ዙሪያ፣ የሰሜን፣ የምዕራብ እና የምስራቅ ጎጃም፣ የአዊ ዞኖች	ከመካከለኛ እስከ ከባድ መጠን (ከ11 እስከ 30 ሚ.ሜ)
	ዋግህምራ፣ የደቡብ እና ሰሜን ወሎ፣ የሰሜን ሸዋ ዞኖች፣	ከቀላል እስከ ከባድ መጠን (ከ1-30 ሚ.ሜ)
ጋምቤላ	አኝዋክ፣ መሻንግ፣ የኑዌር እና የኢታንግ ልዩ ወረዳ	ከመካከለኛ እስከ ከባድ መጠን (ከ11 እስከ 30 ሚ.ሜ በላይ)
ቤንሻንጉል ጉምዝ	ካማሺ፣ መተከል፣ አሶሳ፣ ማኦ ኮሞ ዞኖች	ከመካከለኛ እስከ ከባድ መጠን (ከ11 እስከ 30 ሚ.ሜ)
ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ	ከፋ፣ ኮንታ፣ ዳውሮ፣ ቤንች ሸኮ፣ ሸካ፣ ምዕራብ ኦሞ	ከመካከለኛ እስከ ከባድ መጠን (ከ11 እስከ 30 ሚ.ሜ)
ማዕከላዊ ኢትዮጵያ	ጉራጌ፣ ምስራቅ ጉራጌ፣ ስልጤ፣ ሀዲያ፣ ከምባታ፣ ሀላባ፣ የም፣ ጠምባሮ ልዩ ወረዳ፣ ቀቤና ልዩ ወረዳ፣ ማረቆ ልዩ ወረዳ	ከቀላል እስከ ከባድ መጠን (ከ1-30 ሚ.ሜ)
አዲስ አበባ፣ ድሬዳዋ እና ሐረሪ		ከመካከለኛ እስከ ከባድ መጠን (ከ11 እስከ 30 ሚ.ሜ)

በኢትዮጵያ የሚታወቁ አጠቃላይ የየወሩ የሚከሰቱ ትንበያዎች


ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

ትግራይ	የምዕራብ፣ የሰሜን ምዕራብ እና መካከለኛው ትግራይ ዞኖች	ከመካከለኛ እስከ ከባድ መጠን (ከ11 እስከ 30 ሚ.ሜ)
	ምስራቅ፣ ደቡብ ምስራቅ እና ደቡብ ትግራይ ዞኖች	ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን (ከ1-29 ሚ.ሜ)
አፋር	የፋንቲ፣ አዉሲ፣ ማሂ፣ ሀሪ እና ጋቢ ዞኖች	ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን (ከ1-29 ሚ.ሜ)
ሲዳማ ክልል	ሁሉም የክልሉ ዞኖች	ከቀላል መጠን እስከ መካከለኛ መጠን (ከ1-29 ሚ.ሜ)
ደቡብ ኢትዮጵያ	ወላይታ፣ ጋሞ፣ ጎፋ፣ ጌድዮ፣ ኮሬ፣ ባስኬቶ እና ኮንሶ፣ ቡርጂ፣ አሌ፣ ጋርዱላ፣ ዞኖች	ከቀላል መጠን እስከ መካከለኛ መጠን (ከ1-29 ሚ.ሜ)
ሶማሌ	ሲቲ፣ ፋፈን እና ዳዋ ዞኖች	ቀላል መጠን (ከ1-10 ሚ.ሜ)

2.2 የሚኖረው የቀኑ ከፍተኛ የሙቀት ሁኔታ

በጁላይ የሁለተኛው አስር ቀናት ከሚኖረው የቀኑ ከፍተኛ የፀሐይ ሀይል ጋር በተያያዘ፣ በተለይም የቀኑ ከፍተኛ ሙቀት በኤሊ ዳር፣ ዱብቲ፣ ሰመራ፣ ቡሬ፣ አሳይታ፣ ሁንዱፎ፣ ገዋኔ፣ ሚሌ፣ ዳሊፋጊ፣ አይሻ፣ ጉሊና፣ አዋሽ አርባ፣ ባቲ፣ ዶሎ አዶ፣ ዳዋ፣ ጎዴ፣ አቦቦ፣ ቋራ፣ አዋሽ ፈንታሌ፣ ጭፍራ፣ ላሬ፣ መተሃራ እና ፋኙዶ አካባቢዎች ላይ ከ24 እስከ 40 ዲግሪ ሴልሲየስ እንደሚሆን አሃዛዊ ትንበያዎች ያመለክታሉ (ካርታ 7)፡፡

Daily maximum temperature (C) for 21 Jul-01 Aug 2026




ካርታ 7 እ.ኤ.አ. ከጁላይ 21-31/2026፣ የሚኖረው ከፍተኛ የሙቀት መጠን በዲ.ሴ

2.3 እ.ኤ.አ ከጁላይ 21 እስከ 31/2025 የሚኖረው የአየር ሁኔታ አዝማሚያ

በመጨረሻ የአገሱን መጀመሪያዎቹ አሥር ቀናት ዝናብ ሰጭ የሚቴዎርሎጂ ገጽታዎች የክረምት ዝናብ ተጠቃሚ በሆኑት የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ የተሻለ የዝናብ መጠንና ሥርጭት እንደሚኖራቸው የትንበያ መረጃዎች ይጠቁማሉ። ከዚህ ጋር በተያዘም በደቡብ ምዕራብ፣ ምዕራብ፣ ሰሜን ምዕራብ፣ ሰሜን እና መካከለኛው የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ በ24 ሰዓት ውስጥ ከ11 እስከ 30 ሚ.ሜ የሚደርስ ከመካከለኛ እስከ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ እንደሚኖር የአሀዛዊ የትንበያ መረጃዎች ይጠቁማሉ። በተጨማሪም በሰሜን ምስራቅ እና ምስራቅ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ ከቀላል እስከ መካከለኛ (ከ1-29 ሚ.ሜ) መጠን ያለው ዝናብ ያገኛሉ (ካርታ 8)።

Total Rainfall (mm) for 1-10 August



ካርታ 8 እ.ኤ.አ. ከኦገስት 1-10/2026, የሚኖረው የዝናብ መጠን በሚ.ሜ



Ethiopian Meteorology Institute



2.4 እ.ኤ.አ ከጁላይ 21 እስከ 31/2026 የሚኖረው የአየር ሁኔታ በግብርናው ሥራ እንቅስቃሴ ላይ ሊያሳድር የሚችለው ተፅዕኖ

በሚቀጥሉት የጁላይ ወር ሶስተኛ አስራ አንድ ቀናት በደቡብ ምዕራብ፣ በምዕራብ፣ በሰሜን ምዕራብ እና በሰሜን የሀገራችን አካባቢዎች በብዙ ቦታዎቻቸው ላይ ከመካከለኛ እስከ ከባድ መጠን ያለው እርጥበት ይኖራቸዋል። በመሆኑም በመካከለኛው፣ በሰሜን ምስራቅ፣ በምስራቅና በደቡብ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን ያለው የአፈር ወስጥ እርጥበት ይኖራቸዋል። በመሆኑም የሚኖሩ መልካም አጋጣሚዎችን ለመጠቀምና የሚጠበቁ አሉታዊ ተጽዕኖዎችን ለመቀነስ ከታች የቀረቡትን ቦታ ተኮር የግብርና ሚቴዎርሎጂ ምክረ ሀሳብ ከወዲሁ ማከናወን ያስፈልጋል (ሠንጠረዥ 2) ።

2.5 እ.ኤ.አ ከጁላይ 21 እስከ 31/2026 የሚኖረው የአየር ሁኔታ በውሀ ዘርፍ ላይ ሊያሳድር የሚችለው ተፅዕኖ

በሚቀጥሉት አስር ቀናት የክረምት እርጥበት ተጠቃሚ በሆኑ ተፋሰሶች ላይ ከመካከለኛ እስከ ከባድ መጠን የሚደረስ የገፀ ምድር የውሃ ፍሰት ይኖራቸዋል። በመሆኑም የሚመለከታቸው የዘርፉ አካላት የሚኖሩ መልካም ዕድሎችን በአግባቡ ለመጠቀምና ተያያዥ ስጋቶችን ለመቀነስ የሚከተሉትን ተፋሰስ ተኮር የውሃ ሚቴዎርሎጂ ምክረ ሀሳቦች ተግባራዊ ማድረግ ያስፈልጋል (ሠንጠረዥ 3) ፡



በኢትዮጵያ የሚታወቁት ኢንስቲትዩት የሚታወቁት ትንበያ፡

ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ



ሠንጠረዥ 2፡ በሚቀጥሉት አስር ቀናት የሚኖረው የእርጥበት ሁኔታ በግብርናው እንቅስቃሴ ላይ

የክረምት ዝናብ ተጠቃሚና የመኸር ሰብል አብቃይ እንዲሁም አርብቶ አደርና ከፊል አርብቶ አደር አካባቢዎች

ከመካከለኛ እስከ ከባድ መጠን ያለው እርጥበት የሚያገኙ ዞኖች	አዎንታዊ ተጽዕኖ	አሉታዊ ተጽዕኖ	የተሰጠ ምክረ ሃሳብ
ቁለም ወለጋ፣ ምዕራብ ወለጋ፣ ምስራቅ ወለጋ፣ ሆሮ ጉድሩ ወለጋ፣ ኢሊባቦር፣ ቡኖ በደሌ፣ ጅማ፣ ምዕራብ አርሲ፣ ሸገር ሲቲ እና ሁሉም የሸዋ ዞኖች፣ የምዕራብ፣ መካከለኛ፣ የደቡብ እና ሰሜን ጎንደር፣ ባህርዳር ዙሪያ፣ የሰሜን፣ የምዕራብ እና የምስራቅ ጎጃም፣ አዊ፣ አኝዋክ፣ መሻርንግ፣ የኑዌር እና የኢታንግ ልዩ ወረዳ፣ ካማሺ፣ መተከል፣ አሶሳ፣ ማኦ ኮሞ፣ ከፋ፣ ኮንታ፣ ዳውሮ፣ ቤንች ሸኮ፣ ሸካ፣ ምዕራብ ኦሞ አዲስ አበባ፣ ድሬዳዋ እና ሐረሪ፣ የምዕራብ፣ የሰሜን ምዕራብ እና መካከለኛው ትግራይ ዞኖች	➤ የአፈር ወስጥ እርጥበት መሻሻል ➤ ለረጅም ጊዜ ሰብሎች እድገትና የአጭር ጊዜ ሰብሎችን ለመዝራት ➤ ለእንስሳት መኖርና የመጠጥ ውሃ አቅርቦት መሻሻል ➤ የተፈጥሮና ሰው ሰራሽ የውሃ ማጠራቀሚያዎችን ለማጎልበት ➤ ለቋሚ ተክሎች እድገት	➤ የእርጥበት መብዛት፣ የማሳዎች መጨቅየት እና ተዳፋታማ በሆኑ አካባቢዎች የውሃ በማሳዎች ላይ መተኛት ➤ ውሃን በሆኑና በወንዝ ዳርቻ ባሉ ሰብሎች ላይ የአፈር መታጠብ ➤ በልግ አብቃይ በሆኑት አካባቢዎች የደረሱ የበልግ ሰብሎች በእርጥበት መጎዳት ➤ የአረም መከሰት ➤ የሰብል በሽታና ተባይ መከሰት	➤ የሚገኘውን እርጥበት በመጠቀም የመኸር ሰብሎችን ዘር መዝራት ➤ ተዳፋታማ ማሳዎች ላይ የተዘጉ የማፋሰሻና የማንጣፈፊያ ቦቦችን ማስተካከል ➤ የሰብል በሽታንና አረምን አስቀድሞ መከላከል፤ ➤ የአፈር መሸርሸር መከላከል ስራዎችን በስፋት መስራት ➤ የመሬት መንሸራተት ተጋላጭነትን መቀነስ ➤ እርጥበት አጠር አካባቢዎች የዝናብ ውሃን ማሰባሰብና ማጠራቀም ➤ የማዳበሪያ አጠቃቀምን በትክክለኛው ሰዓት መተግበር ➤ አረምን በወቅቱ ማረም፣ ፀረ-አረምና ፀረ-ተባይ ኬሚካሎችን ከግብርና ባለሙያ ጋር በመመካከር መተግበር ➤ በልግ አብቃይ በሆኑት አካባቢዎች የደረሱ የበልግ ሰብሎችን በየጣልቃው የሚኖሩ ደረቅ ቀናቶችን በመጠቀም መሰብሰብ

በኢትዮጵያ የሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎርሎጂ ትንበያ፡

ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ



ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን ያለው እርጥበት የሚያገኙ ዞኖች	አዎንታዊ ተጽዕኖ	አሉታዊ ተጽዕኖ	የተሰጠ ምክረ ሃሳብ
አርሲ፣ ምስራቅ እና ምዕራብ ሐረርጌ፣ ምዕራብ ጉጂ እና ጉጂ፣ ባሌ፣ ምስራቅ ባሌ፣ ጥቂት የምስራቅ ቦረና ዞን፣ ዋግህምራ፣ የደቡብ እና ሰሜን ወሎ፣ የሰሜን ሸዋ ዞኖች፣ ጉራጌ፣ ምስራቅ ጉራጌ፣ ስልጤ፣ ሀዲያ፣ ከምባታ፣ ሀላባ፣ የም፣ ጠምባሮ ልዩ ወረዳ፣ ቀቤና ልዩ ወረዳ፣ማረቆ ልዩ ወረዳ ምስራቅ፣ ደቡብ ምስራቅ እና ደቡብ ትግራይ ዞኖች፣ ፋንቲ፣ አዉሲ፣ ማሂ፣ ሀሪ እና ጋቢ ዞኖች፣ የሲዳማ ክልል ሁሉም ዞኖች፣ ወላይታ፣ ጋሞ፣ ጎፋ፣ ጌድዮ፣ ኮሬ፣ ባስኬቶ እና ኮንሶ፣ ቡርጂ፣ አሌ፣ ጋርዱላ፣ ሲቲ፣ ፋፈን እና ዳዋ ዞኖች	➤ ለመኸር ሰብሎችን ዘር ለመዝራት ምቹነት ➤ የአረንጓዴ እፅዋት ልምላሜ፣ ለመጠጥ ውሃና ለግጦሽ ሣር አቅርቦት መሻሻል ➤ ለከተማ አካባቢ ግብርና ስራ	➤ የዝናብ መቆራረጥና ደረቅ ሰሞናት መኖር ➤ የትነት መጠን መጨመር፤ ➤ የሰብል በሽታ መከሰት፤ ➤ የአፈርና ውስጥ እርጥበት ዝቅተኛ መሆንና ለሰብሎች የውሃ ፍላጎት በቂ አለመሆን ➤ በልግ አብቃይ በሆኑት አካባቢዎች የደረሱ የበልግ ሰብሎች በእርጥበት መጎዳት	➤ የሚገኘውን እርጥበት በቂ መሆኑን በማረጋገጥ የመኸር ሰብሎችን ጊዜውን ጠብቆ መዝራት ➤ የዝናብ ውኃን በማሰባሰብ በደረቅ ሰሞናት ተግባር ላይ ማዋል ➤ የአፈር ትነት መጠንን ለመቀነስ የሚያስችሉ ተግባራትን ማከናወን ➤ የአፈር እቀባ ስራ ማከናወን ➤ የእንስሳት ግጦሽ ሣር በአግባቡ መጠቀምና መጠበቅ፤ ➤ የደረሱ የበልግ ሰብሎችን በየጣልቃው የሚኖሩ ደረቅ ቀናቶች በመጠቀም መሰብሰብ

Ethiopian Meteorology Institute



በኢትዮጵያ የሚቲዎሮሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቲዎሮሎጂ ትንበያ፡

ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ



ሠንጠረዥ 3 በሚቀጥሉት አስር ቀናት የሚኖረው የእርጥበት ሁኔታ በወሀወ ዘር ላይ ሊኖር የሚችለው ተጽዕኖ

ከመካከለኛ እስከ ከባድ የገፀ ምድር ውሃ ፍሰት	አዎንታዊ ተጽዕኖ	አሉታዊ ተጽዕኖ	የውኃ ሚቲዎሮሎጂ ምክረ ሃሳብ
በይኛውና መካከለኛ አባይ፣ ኦሞ ጊቤ፣ ባሮ አኮቦ፣ መካከለኛና ታችኛው ተከቤ በላኛውና መካከለኛው በላኛው ስምጥ ሸለቆ፣አዋሽና የገናሌ ዳዋ ተፋሰሶች	- የገፀ ምድር የውሃ ፍሰት መሻሻል - የመስኖም ሆነ የሃይል ማመንጫ ግድቦች ውኃ መጠን መሻሻል - የመጠጥ ውኃ አቅርቦት መሻሻል - የከርሰ ምድር የውኃ መጠን መሻሻል	- ቅፅበታዊ ኀረፍ መከሰት - የደለል ስጋት መጨመር - የውሃ ማፋሰሻ ቱቦዎች በቆሻሻ መዘጋት	- የዝናብ ውኃ ማሰባሰብና ማጠራቀም - የመጠጥ ውሃን አክሞ መጠቀም - የፍሳሽ መውረጃ ቦቶችን ማፅዳት - የጎርፈ መቀለበሻ ቦቶችን ማዘጋጀት - ወራጅ ውሃን በእግርም ሆነ በቀላል ተሽከርካሪ ለማቋረጥ አለመሞከር - ትንበያዎችንና ምክረ ሀሳቦችን በየጊዜው መከታተል
ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን ያለው የገፀ ምድር ውሃ ፍሰት	አዎንታዊ ተጽዕኖ	አሉታዊ ተጽዕኖ	የውኃ ሚቲዎሮሎጂ ምክረ ሃሳብ
መረብ ጋሽ፣ ላይኛውና መካከለኛ ተከቤ፣ መካከለኛውና ታችኛው አዋሽ፣ ላይኛው ዋቢ ሸበሌ ተፋሰሶች	- የገፀ ምድር የውሃ ፍሰት በመጠኑ መሻሻል - የጎርፍ ሆነ የደለል ስጋት መቀነስ	- ዝቅተኛ የገጸ ምድር የውሃ ፍሰት - እርጥበት አጠር በሆኑ አካባቢዎች መጠነኛ የውሃ እጥረት	- የሚገኘውን የዝናብ ውሃ አክሞ መጠቀም - ወራጅ የዝናብ ውሃን ማሰባሰብና ማጠራቀም - ከቤት ጣራ ላይ ውሃ የማሰባሰብ ማጠራቀም - የአየር ሁኔታ መረጃን በቅርብ መከላከል
በደረቅ የገፀ ምድር ውሃ ፍሰት	አዎንታዊ ተጽዕኖ	አሉታዊ ተጽዕኖ	የውኃ ሚቲዎሮሎጂ ምክረ ሃሳብ
አጋዴን፣ አይሻ፣ታችኛው ስምጥ ሸለቆ፣ ገናሌ ዳዋ፣ ዋቢ ሸበሌ ተፋሰሶች	የጎርፍ ሆነ የደለል ስጋት አለመኖር፤	የገጸ ምድር የውሃ የትነት መጨመር	የሚገኘውን ውሃ በቁጠባና ውጤታማ መጠቀም