

በኢትዮጵያ የሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎርሎጂ ትንበያ፣
ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

በኢትዮጵያ የሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎርሎጂ ትንበያ፣
ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ



ከጁላይ 1-31/2026 የነበረው የአየር ጠባይ ግምገማ

እንዲሁም

ከኦገስት 1-31/2026 የሚኖረው የአየር ጠባይ ትንበያ እና

ምክረ ሃሳብ

ኦገስት 2026

አዲስ አበባ

በኢትዮጵያ የሚቲዎሮሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቲዎሮሎጂ ትንበያ፡

ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

1.1 እ.ኤ.አ ከጁላይ 1 እስከ 31/2026 የነበረው የአየር ሁኔታ


ባለፈው የጁላይ ወር በደቡብ ምዕራብ፣ ምዕራብ፣ ሰሜን ምዕራብ፣ መካከለኛው እና ምስራቅ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ የተሻለ የደመና ሽፋን ነበራቸው፡፡ ከዚህ ጋር ተያይዞ በደቡብ ምዕራብ፣ ምዕራብ፣ ሰሜን ምዕራብ እና በመካከለኛው የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ በ24 ሰዓት ውስጥ ከመካከለኛ እስከ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ተመዝግቦባቸዋል፡፡ በ24 ሰዓት ውስጥ ከ30 ሚ.ሜ በላይ ከባድ ዝናብ ከተመዘገበባቸው የሚቲዎሮሎጂ ጣቢያዎች መካከል አዲስ አበባ 33.2፣ ሀዋሳ 35.6፣ 56.7፣ በሃር ዳር 52፣ 44.4፣ 61.5፣ ኮምቦልቻ 35.8፣30.4፣ ደበረ ማርቆስ 30፣ ቢሾፍቱ 33.1፣ 32፣ 35.1፣ ጎንደር 40.1፣ 34.4፣ ጎሬ 38.5፣ 31፣ ጅማ 96.3፣ 38.6፣ 37.6፣ ነቀምት 38፣ 61፣ 38.6፣ 50.7፣ ሮቤ 30.4፣ አዴት 36፣ አይራ 36፣ 47.4፣ አማን 51.9፣ 30.5፣ አምባ ማሪያም 50.2፣ 42.6፣ 38.6፣ አምደወርቅ 37.6፣ አንገር ጉትን 33.2፣ 40፣ አርጆ 32.8፣ አርሲ ሮቤ 40፣ አሶሳ 39.5፣ 62.3፣ አፅቢ 40.7፣ አይክል 32፣ 52፣ በደሌ 52፣ ባቲ 65፣ ቦሬ36.6፣ 42፣ 36.8፣ ቡሂ 39.7፣ 34.2፣ ቡለን 61፣ 35.4፣ 40፣ 30፣ 70፣ ቡሬ 45፣ 58.8፣ 76.2፣ ቻግኒ 30፣ ጨፋ 60፣ ጭፍራ 61.2፣ ጭራ 70፣ 35፣ ዳሊፋጊ 38.2፣ደባርቅ 31፣ ደበረ ብርሃን32.7፣ ደበረ ታቦር 34.4 48.3፣ ደበረ ወርቅ 44.1፣ 52.8፣ ደምቢ ዶሎ 30.5፣ 31.5፣ 36.3፣ 35.2፣ ፈቼ 38.8፣ 31.6፣ 43.7፣ ፉኙዶ36.6፣ 48፣ ጋምቤላ 65.6፣ 80፣ ገለምሶ 34.5፣ ጊምቢ 43.1፣ 55.4፣ 50.4፣ ጉንዶ መስቀል 31.7፣ 35.6፣ 49.3፣ ካቺሴ 44.4፣ እምድብር 31.4፣ ላሊበላ 90፣ ሊሙገነት 44፣ 62.7፣ 33፣ ማጀቴ 38.4፣ ማንኩሽ 60.2፣ ማሻ 30.6፣ ማሃል ሜዳ 47.6፣ 30፣ መካነሰላም 35.2፣ መተማ 44.8፣ ንፋስ መውጫ 48.7፣ አዳማ 30.9፣ ነጆ 39.7፣ ፓዌ 32.2፣ ሰኮሩ 32፣ ሰንቃጣ 30.5፣ ሲርንቃ 36.8፣ 30.5፣ ሽሬ 37.5፣ 39.9 ሻሁራ 33.8፣ ሻምቦ 34.2፣ 40.8፣ ሾላገበያ 50.7፣ ተርጫ 48፣ ወገልጤና 40፣ ወረኢሊ 47፣ 36፣ 46፣ ይትኖራ 38.3፣ ባቲ 35.5፣ 67.5፣ አባጃራ 32.4፣ አባይ ሸለቆ 32.3፣ 37.1፣ አቦሞሪንጋ 36.3፣ 44.7፣ 36.9፣ አዳሚቱሊ 41.2፣ አዲስ ዘመን 38.6፣ 39.9፣ አጋሮ 32.2፣ አቃስታ 30.6፣ አንኮበር 35፣ አሺ 32.4፣ 32፣ አሸሬ 37.8፣ 31.1፣ አሶሳ 30.5፣ አታንጎ 46.2፣ 37.7፣ ባምቢስ 45.2፣ ቢላምቢሎ 32.8፣ 35.7፣ 38.5፣ ቡልቂ 36.6፣ 36.1፣ 47.4፣ 33.2፣ 45.2፣ ጨፌዶንሳ 31.2፣ 30.7፣ ደበረ ሲና 39.9፣ 80.2፣ 35.1፣ ደጋን 39.8፣ 62.1፣ ደነባ 50.2፣ 30.3፣ ደንጎለታ 32.1፣ እርብቲ 47.9፣ እነዳባጉና 30.6፣ 38፣ ጋሳይ 33.2፣ ጋሸና 60.7፣ ጊናገር 36.4፣ ጊሽራቤል 44፣ 45.2፣ ጎብየሬ 35.6፣ ጉብቲ 47.8፣ ጉጉፍቱ 38.2፣ 49.6፣ 30.2፣ 36.8፣ 39.6፣ 75.5፣ ጉንዶ በረት 46፣ 30፣ ሐገረ ሰላም 36፣ ሃይቅ 78.8፣ ሃሮ 30.2፣ 30.5፣ 30፣ 30.2፣ 30.4፣ 30.5፣ 40.6፣ ሆሮዶዮ 30፣ ከሚሴ 50.5፣ ቅዳሜ ገቤ39.9፣ 36.6፣ 56.4፣ ኮሶበር 30.5፣ 36.4፣ ኩልመስክ 37.7፣ 30.2፣ ማያንሳ 39.4፣ መካነአየሱስ 44.6፣ ማርዬ 51፣ 83.1፣ ሞላሊ 48.7፣ አሞናዳ 38.6፣ 31.2፣ 32.5፣ 30.5፣ አንጋ 33.4፣ 30፣ ሸንዲ 46.5፣ ስቆጣ 35.4፣ ሲቦ 34.2፣ 45.3፣ ተርኮዲ 38.2፣ ትንሹመጢ 37.2፣ ጽገሬዳ 31.3፣ መንደር13 34.2፣ 32.4፣ 30.4፣ 32.4፣ 32፣ 30.2፣ መንደር11 46.5፣ ወልዲያ 30፣ ወቅሮ 63፣ ወርቃምባ 34.7፣ እንዲሁም ገምቢ 47.5፣ 46.9 ሚ.ሜ የሚደርስ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ተመዝግቦባቸዋል፡፡ ነበራቸው፡፡ በአጠቃላይ ባለፈው የጁላይ ወር በ127 የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ በ24 ሰዓት ውስጥ ከ30 ሚ.ሜ በላይ የሆነ ከባድ መጠን ያለው የዝናብ መጠን ነበራቸው፡፡

በኢትዮጵያ የሚቲዎሮሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቲዎሮሎጂ ትንበያ፡


ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

ባለፈው የጁላይ ወር የዘነበው የዝናብ መጠን ከሀገሪቱ ቦታ ሽፋን አንፃር ሲገመገም፤ ከኦሮሚያ ክልል ኢሉባቦር፤ ቡኖ በደሌ፤ ጅማ፤ ቄለም ወለጋ፤ ምዕራብ ወለጋ፤ ምስራቅ ወለጋ፤ ሆሮ ጉድሩ ወለጋ፤ ሁሉም የሸዋ ዞኖች፤ ሸገር ከተማ፤ አርሲ፤ ምዕራብ ሐረርጌ ዞኖች፤ ከአማራ ክልል የሰሜን፤ ምዕራብ፤ መካከለኛውና ደቡብ ጎንደር፤ ባህርዳር ዙሪያ፤ የሰሜን፤ ምዕራብና ምስራቅ ጎጃም፤ አዊ፤ የደቡብ እና የሰሜን ወሎ፤ ሰሜን ሸዋ ዞኖች፤ ከትግራይ ክልል የምዕራብ፤ የሰሜን ምዕራብ፤ መካከለኛው፤ ምስራቅና ደቡብ ምስራቅ ትግራይ ዞኖች፤ ከቤንሻንጉል ጉምዝ ካማሺ፤ መተከል፤ አሶሳ፤ ማኦ ኮሞ ልዩ ወረዳ፤ ከጋምቤላ ክልል አኝዋክ፤ መሻርንግ፤ ኑዌር እና ኢታንግ ልዩ ወረዳ፤ ከደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል ሸካ፤ ቤንች ሸኩ፤ ከፋ፤ ኮንታ፤ ዞኖች፤ ከማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ጉራጌ፤ ምስራቅ ጉራጌ፤ ሀዲያ፤ የም፤ ስልጤ፤ ሃላባ፤ ከምባታ ዞኖች፤ ከደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ወላይታና ጎፋ፤ ዞኖች፤ አዲስ አበባ ላይ ከ61-570 ሚ.ሜ የሚደርስ ዝናብ ከ4-10 ቀናት ያህል ዝናብ ነበራቸው (ካርታ 1 እና 2)፡፡


በጁላይ ወር የዘነበው የዝናብ መጠን ከመደበኛው ጋር ሲነፃፀር ሲገመገም፤ ከኦሮሚያ ክልል ኢሉባቦር፤ ቡኖ በደሌ፤ ጅማ፤ ቄለም ወለጋ፤ ምዕራብ ወለጋ፤ ምስራቅ ወለጋ፤ ሆሮ ጉድሩ ወለጋ፤ ሁሉም የሸዋ ዞኖች፤ ሸገር ከተማ፤ አርሲ፤ ከአማራ ክልል የሰሜን፤ ምዕራብ፤ መካከለኛውና ደቡብ ጎንደር፤ ባህርዳር ዙሪያ፤ የሰሜን፤ ምዕራብና ምስራቅ ጎጃም፤ አዊ፤ የደቡብ እና የሰሜን ወሎ፤ ሰሜን ሸዋ ዞኖች፤ ከትግራይ ክልል የምዕራብ፤ የሰሜን ምዕራብ፤ መካከለኛው፤ ምስራቅና ደቡብ ምስራቅ ትግራይ ዞኖች፤ ከአፋር ክልል ሁሉም ዞኖች፤ ከቤንሻንጉል ጉምዝ ካማሺ፤ መተከል፤ አሶሳ፤ ማኦ ኮሞ ልዩ ወረዳ፤ ከጋምቤላ ክልል አኝዋክ፤ መሻርንግ፤ ኑዌር እና ኢታንግ ልዩ ወረዳ፤ ከደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል ሸካ፤ ቤንች ሸኩ፤ ከፋ፤ ኮንታ፤ ዳዉሮ ዞኖች፤ ከማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ጉራጌ፤ ምስራቅ ጉራጌ፤ ሀዲያ፤ የም፤ ስልጤ፤ ሃላባ፤ ከምባታ ዞኖች፤ ከደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ወላይታና ጎፋ፤ አዲስ አበባ ላይ በአብዛኛው ከመደበኛው የተቀራረበ እና በጥቂት የደቡብ ምዕራብና የምዕራብ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ ከመደበኛ በላይ የሆነ የዝናብ መጠን ተመዝግቧል (ካርታ 3) ፡፡



ካርታ 1 እ.ኤ.አ ጁላይ 1 እስከ 31/2026
ድረስ የነበረው የዝናብ መጠን በሚ.ሜ



ካርታ 2 እ.ኤ.አ ጁላይ 1 እስከ 31/2026
ድረስ ዝናብ የዘነበባቸው ቀናት



ካርታ 3 እ.ኤ.አ ጁላይ 1 እስከ 31/2026
የነበረው የዝናብ መጠን ከመደበኛው ጋር ሲነፃፀር

በኢትዮጵያ የሚቲዎሮሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቲዎሮሎጂ ትንበያ፡

ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

1.2 እ.ኤ.አ ከጁላይ 1 እስከ 31/2026 የነበረው የአየር ሁኔታ በግብርና ሥራ እንቅስቃሴ ላይ ያሳደረው ተፅዕኖ


ባሳለፍነው የጁላይ ወር በአብዛኛው የክረምት ዝናብ ተጠቃሚ አካባቢዎች ከቦታ ቦታ በመጠን ይለያይ እንጂ በስርጭት ረገድ ብዙ ቦታዎችን ያደረሰ የእርጥበት ሁኔታ ነበራቸዋል፡፡ ይህም የተገኘው ዝናብ የአፈር ውስጥ እርጥበትን ከማሻሻልም አልፎ ከጁላይ ወር ጀምሮ ለሚዘፋ የተለያዩ የመካከለኛ ጊዜ ሰብሎችን ለመዝራትና አስቀድሞው ተዘርተው በተለያዩ የእድገት ደረጃ ላይ ለሚገኙ የመኸር ሰብሎች የውሃ ፍላጎታቸውን ከሟሟላት አንፃር የጎሳ ሚና ከመኖሩም በላይ፤ ከኤፕሪል ወር ጀምሮ ቀደም ብለው ለተዘፋ እንደ በቆሎና ማሽሳ ለመሳሰሉት የረጅም ጊዜ የመኸር ሰብሎች እንዲሁም ለተለያዩ ቋሚ ተክሎች፤ ለንሮ አትክልቶችና ፍራፍሬዎች በተሟላ ሁኔታ እንዲያድጉ የጎሳ አስተዋፅዖ ነበረው፡፡ ከዚህ በተጨማሪ በአርብቶ አደርና ከፊል የአርብቶ አደር አካባቢዎች የነበረው የእርጥበት ሁኔታ ለግጦሽ ሳርና ለመጠጥ ውሃ አቅርቦት አዎንታዊ አስተዋፅዖ ከማበርከቱም በላይ ሰው ሰራሽም ሆነ የተፈጥሮ ምንጮችን ከማጎልበት አንፃር በጎ ጎን ነበረው (ካርታ 4)።

1.3 እ.ኤ.አ ከጁላይ 1 እስከ 31/2026 የነበረው የአየር ሁኔታ በውሃው ዘርፍ ላይ ያሳደረው ተፅዕኖ

ባሳለፍነው የጁላይ ወር በአብዛኛቹ የሃገራችን ዋና ዋና ተፋሰሶች ላይ ከመጠነኛ እስከ እጅግ ከፍተኛ የሚደርስ የገፁ-ምድር የውኃ ፍሰት የነበራቸው ሲሆን፤ በተለይም በባሮ አኮቦ፤ አባይ፤ ኦሞ ጊቤና ተከዜ ተፋሰሶች የነበረው እጅግ ከፍተኛ የውሃ ፍሰት ከገጸ ምድር አልፎ የከርሶ ምድር የውኃ ሃብት ክምችትን በማሻሻል፤ እንዲሁም በላይኛውና መካከለኛው ስምጥ ሸለቆ፤ በላይኛው ዋቢ ሸበሌ፤ ገናሌ ዳዋ እና በአፋር ደናክል ተፋሰሶች የነበረው ከመጠነኛ እስከ ከፍተኛ የገጸ ምድር የውኃ ሽፋን የተፋሰሱን የውኃ ይዘት በማጎልበት ወደ ተለያዩ የሰው ሰራሽም ይሁን የተፈጥሮ የውኃ ማጠራቀሚያዎች የሚገባውን የውኃ መጠን በመጨመር ረገድ አዎንታዊ አስተዋፅዖ እንደነበረው የተተነተኑ የውኃ ሚቲዎሮሎጂ መረጃዎች ያሳያሉ። በአንፃሩ በኦጋዴን፤ በታችኛው አዋሽ፤ በታችኛው ስምጥ ሸለቆ እንዲሁም በመካከለኛውና የታችኛው ገናሌ ዳዋ እና ዋቢ ሸበሌ ተፋሰሶች ደረቅ የአየር ሁኔታ ስር ነበሩ (ካርታ 5)።


በኢትዮጵያ የሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎርሎጂ ትንበያ፣

ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ




ካርታ 4 እ.ኤ.አ ከጁላይ 1 እስከ 31/2026

ድረስ የነበረው የእርጥበት ሁኔታ



ካርታ 5 እ.ኤ.አ ከጁላይ 1 እስከ 31/2026

ድረስ የነበረው የእርጥበት ሁኔታ



Ethiopian Meteorology Institute



2. መግቢያ

በመደበኛ ሁኔታ የክረምት ዝናብ ቀደም ብሎ በደቡብ ምዕራብ እና ምዕራብ ኢጋማሽ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ የሚጀምር ሲሆን፤ በሂደትም እየተጠናከሩ ከሚሄዱ ዝናብ ሰጭ የሚቲዎሮሎጂ ገጽታዎች ጋር ተያይዞ በኦገስት ወር ውስጥ የክረምት ዝናብ ተጠቃሚ አካባቢዎች ሙሉ በሙሉ ዝናብ ያገኛሉ። የኦገስት ወር ከተቀሩት የክረምት ወራት በተሻለ ሁኔታ ሁሉንም የክረምት ዝናብ ተጠቃሚ አካባቢዎችን አካቶ በመጠንም ሆነ በሥርጭት ከፍተኛ ደረጃ የሚደርስበት ወር ነው። ስለሆነም የወሩ አማካይ የዝናብ መጠን በምዕራብ ኢጋማሽ በአብዛኛው የሀገሪቱ ሥፍራዎች ላይ ከ200-400 ሚ.ሜ እና በአንዳንድ ሥፍራዎች ላይ ከ400 ሚ.ሜ በላይ ይደርሳል። በእነዚህ አካባቢዎች የዝናብ ቀናትም በዚያው መልክ የሚጨምር በመሆኑ ከ18-30 ለሚደርሱት ቀናት ዝናብ ይኖራል። በሌላ በኩል በምስራቅ፣ በሰሜን ምስራቅ እና በመካከለኛው ኢትዮጵያ አካባቢዎች ላይም ቢሆን የዝናቡ መጠንና ሥርጭት እየተስፋፋ የሚሄድ በመሆኑ ከ6-20 ቀናት ያህል እስከ 300 ሚ.ሜ የሚደርስ ዝናብ በአማካይ ይኖራል።

2.1 እ.ኤ.አ ከኦገስት 1 እስከ 31/2025 የሚኖረው የአየር ጠባይ ትንበያ

በመደበኛ ሁኔታ የኦገስት ወር ካለፉት የክረምት ወራት በተሻለ ሁኔታ ሁሉንም የክረምት ዝናብ ተጠቃሚ አካባቢዎችን በመጠንም ሆነ በሥርጭት በከፍተኛ መጠን የሚያደርስበት ወር ነው። ከዚህም ጋር ተያይዞ በአንዳንድ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ ለተከታታይ ሰዓትና ቀናት የሚዘንብበትና በተጨማሪም በፀሐይ ሀይል ታግዘው ከሚፈጠሩ የደመና ክምችቶች በረዶ የቀላቀለ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ የሚስተዋልበት ሲሆን ከዚህ ጋር ተያይዞ ለወንዞች ሙላትና ቅጽበታዊ ጎርፍ የሚከሰትበት ወር ነው።


በመጨረሻው የኦገስት ወር ዝናብ ሰጪ የሚቲዎሮሎጂ ገጽታዎች እየተሻሻሉ ሊሄዱ እንደሚችሉ አሃዛዊ የትንበያ መረጃዎች ይጠቁማሉ። ከሚጠናከሩት ዝናብ ሰጭ የሚቲዎሮሎጂ ገጽታዎች ጋር ተያይዞ በተለይም በደቡብ ምዕራብ፣ ምዕራብ ሰሜን፣ ሰሜን ምዕራብ፣ ሰሜን፣ መካከለኛው የሀገሪቱ ቦታዎች ላይ ከመካከለኛ እስከ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ እንደሚኖር አሃዛዊ የትንበያ መረጃዎች ይጠቁማሉ። በተጨማሪም በአንዳንድ ቦታዎች ላይ በፀሐይ ሀይል ታግዘው ከሚፈጠሩ የደመና ክምችቶች በመነሳት አልፎ አልፎ በሚኖሩት ቀናት በረዶ የቀላቀለ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ሊኖር እንደሚችል የትንበያ መረጃዎች ይጠቁማሉ።

በኢትዮጵያ የሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎርሎጂ ትንበያ፣


ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

በአጠቃላይ በሚቀጥለው ወር ከኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ወለጋ፣ ምስራቅ ወለጋ፣ ሆሮ ጉድሩ ወለጋ፣ ቄለም ወለጋ፣ ኢሉባቦር፣ ቡኖ በደሌ፣ ጅማ፣ ሰሜን ሸዋ (ሰላሌ)፣ ሁሉም የሸዋ ዞኖች፣ ሸገር ከተማ፣ ከአማራ ክልል የሰሜን፣ ምዕራብ፣ መካከለኛው እና ደቡብ ጎንደር፣ የባህርዳር ዙሪያ፣ የአዊ፣ የሰሜን፣ ምዕራብ እና ምስራቅ ጎጃም፣ ዋግ ህምራ፣ የሰሜን እና ደቡብ ወሎ፣ የሰሜን ሸዋ ዞኖች፣ የኦሮሞ ብሄረሰብ ልዩ ዞን፣ ከትግራይ ክልል ምዕራብ፣ ሰሜን ምዕራብ፣ ከቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል መተከል፣ ፓዌ፣ አሶሳ፣ ካማሺ ዞኖች እና ማኦ ኮሞ ልዩ ወረዳ፣ ከጋምቤላ ክልል ንዌር፣ አኝዋክ፣ ማህንግ እና የኢታንግ ልዩ ዞን፣ የሲዳማ ክልል ዞኖች፣ ከማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ጉራጌ፣ ምስራቅ ጉራጌ፣ ስልጤ፣ ሀዲያ፣ ከምባታ፣ ሀላባ፣ የም፣ ጠምባሮ ልዩ ወረዳ፣ ቀቤና ልዩ ወረዳ፣ ማረቆ ልዩ ወረዳ፣ ከደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል ከፋ፣ ኮንታ፣ ዳውሮ፣ ቤንሻ ሸኮ፣ ሸካ ዞኖች፣ አዲስ አበባ፣ ድሬዳዋ እና ሐረሪ ላይ ከመካከለኛ እስከ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ያገኛል (ካርታ 15) ፡ በተጨማሪም ከዕለት ወደ ዕለት ከሚጠናከሩት የአየር ሁኔታ ገጽታዎች ላይ በመነሳት፣ ከኦሮሚያ ክልል ምስራቅና ምዕራብ ሀረርጌ፣ አርሲ እና ምዕራብ አርሲ፣ ባሌ እና ምስራቅ ባሌ፣ ጉጂ እና ምዕራብ ጉጂ፣ ከሱማሌ ክልል ሲቲ፣ ፋፋን እና ኤረር ዞኖች፣ ከአፋር ክልል ቅልበቲ፣ ፈንቲ፣ አውሲ፣ ጋቢ፣ ማሂ እና ሀሪ ዞኖች፣ ከደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ወላይታ፣ ጋሞ፣ ጎፋ፣ ባስኬቶ፣ ጌድዮ፣ አሪ፣ ኮንሶ፣ ቡርጂ፣ አሌ፣ ጋርዳላ፣ ኮሬ እና ደቡብ ኦሞ ዞኖች ላይ ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን ያለው ዝናብ ያገኛል (ካርታ 6 እና 7)፡፡

Total Rainfall (mm) for 1-31, 2026 Aug 2026



ካርታ 6 እ.ኤ.አ. እ.ኤ.አ. ከኦገስት 1 እስከ 31/2026 የሚኖረው የዝናብ መጠን በሚ.ሜ



ካርታ 7 እ.ኤ.አ. ከኦገስት 1 እስከ 31/2026 የሚኖረው የዝናብ መጠን ከረጅም ጊዜ አማካይ

Ethiopian Meteorology I



2.2 እ.ኤ.አ ከኦገስት 1 እስከ 31/2026 የሚኖረው የአየር ጠባይ

በግብርናው ሥራ እንቅስቃሴ ላይ ሊያሳድር የሚችለው ተፅዕኖ

በሚቀጥለው የኦገስት ወር በተለይም በደቡብ ምዕራብ፣ ምዕራብ፣ ሰሜን፣ ሰሜን ምዕራብና የመካከለኛው የሃገሪቱ ቦታዎች ላይ ከመካከለኛ እስከ ከባድ መጠን ያለው እርጥበት ይኖራቸዋል። ይህም የሚኖረው እርጥበት በተለያየ የእድገት ደረጃ ላይ ለሚገኙ የረዥም ጊዜ ሰብሎች እድገትና ፍሬ ለማፍራት፣ ዘግይተው ለሚዘፋ የአጭር ጊዜ የመኸር ሰብሎችን ለመዝራት፣ ለቋሚ ተክሎች፣ ለጓሮ አትክልቶችና ፍራፍሬዎች የውሃ ፍላጎትን ለማሟላት እና ለአርብቶ አደርና ከፊል አርብቶ አደር አካባቢዎች የግጦሽ ሳርና የመጠጥ ውሃ አቅርቦትን ከማሻሻል አንፃር ከፍተኛ ጠቀሜታ ይኖረዋል። በሌላም በኩል በአንዳንድ ቦታዎች ከሚኖረው ተደጋጋሚ የሆነ የእርጥበት መብዛት ጋር ተያይዞ በረባዳማ አካባቢዎች ውሃ በሰብል ላይ መተኛት፣ የመሬት አቀማመጡ ከፍታ ባላቸውና ተዳፋታማ በሆኑ አካባቢዎች ደግሞ የመሬት መንሸራተትና በጎርፍ የመጠቃት እንዲሁም እርጥበት በሚበዛባቸው አካባቢዎች የሰብል በሽታ እና የአረም መስፋፋት ሊከሰት ይችላል። በመሆኑም አርሶ አደሮች እና ከፊል አርሶ አደሮች እንዲሁም የሚመለከታቸው አካላት ሰብሎች በጎርፍ እንዳይጠቁ እና በማሳ ላይ ውሃ እንዳይተኛ የጎርፍ መቀልበሻዎችንና ከማሳ ውስት ውሃን ማንጣፈፊያ ቦቶችን ማዘጋጀት እንዲሁም የፀረ-አረም እና የፀረ-ተባይ ኬሚካሎችን በወቅቱና የአየር ሁኔታ ምቹነትን ባገናዘበ ሁኔታ ጥቅም ላይ ማዋል ያስፈልጋል። በሌላ በኩል በመደበኛ ባህሪያቸው የእርጥበት እጥረት በሚያጋጥማቸው አካባቢዎች ላይ የአፈር ውስጥ እርጥበት ለሰብሎች የውሃ ፍላጎት በቂ አለመሆን እንዳይከሰት የዝናብ ውሃን በማሰባሰብ በደረቅ ሰሞናት ተግባር ላይ ማዋልና የአፈር ውስጥ የትነት መጠንን ለመቀነስ የሚያስችሉ ተግባራትን ማከናወን ያስፈልጋል።

2.3 እ.ኤ.አ ከኦገስት 1 እስከ 31/2026 የሚኖረው የአየር ጠባይ በውሃ

ዘርፍ ላይ ሊያሳድር የሚችለው ተፅዕኖ

በመጭው የኦገስት ወር በአብዛኛው መረብጋሽ፣ ተከዜ፣ አባይ፣ ባሮ አኮቦ፣ አሞ ጊቤ፣ የላይኛው እና መካከለኛው ስምጥ ሸለቆ፣ አዋሽ እንዲሁም የላይኛው ዋቢ ሸበሌ እና በጥቂት የላይኛው ገናሌ ዳዋ ተፋሰሶች ላይ ከመካከለኛ እስከ እጅግ በጣም ከፍተኛ የሆነ የገፀ ምድር የውሃ ፍሰት ይኖራቸዋል። ይህም ሁኔታ የክረምት ተጠቃሚ በሆኑት የሃገራችን ተፋሰሶች በዚህ ወር ከፍተኛ የሆነ የገጸ-ምድር የውኃ ሃብት ግብዓትና ፍሰት የሚጠበቅ ሲሆን፤ ከሚኖረው ተደጋጋሚ ዝናብና እርጥበት ሁኔታ ጋር ተያይዞ በአፈር ውስጥ ውሃ ሰርጎ

በኢትዮጵያ የሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎርሎጂ ትንበያ፤

ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

መግባትን በማሳደግ የክርስ ምድር የውሃ ሃብት ግብዓት እንዲኖር አዎንታዊ አስተዋጽኦ ይኖረዋል። በሌላ በኩል አልፎ አልፎ ከሚኖር ከባድ እና ተደጋጋሚ የዝናብ ሁኔታ ጋር ተያይዞ በተለይም ለጎርፍ ተጋላጭ በሆኑ ተፋሰሶች እና ለጎርፍ መፈጠር አመቺ በሆኑ በከተማም ሆነ በተጋላጭ አካባቢዎች ላይ ቅፅበታዊ ጎርፍ፣ የወንዞች ሙላትና ከገደብ በላይ መፍሰስ የማስከተል አቅም ሊኖረው ይችላል። በተጨማሪም በአብዛኛው አፋር ደናክል፣ በመካከለኛውና ታችኛው አዋሽ እንዲሁም የታችኛው ስምጥ ሸለቆ ተፋሰሶች ላይ መካከለኛ የሆነ የገፀ ምድር የውሃ ፍሰት ይኖራቸዋል።

