

በኢትዮጵያ የሚቲዎሮሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቲዎሮሎጂ ትንበያ፣
ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

በኢትዮጵያ የሚቲዎሮሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቲዎሮሎጂ ትንበያ፣
ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ



ከኦገስት 21-31/2026 የነበረው የአየር ሁኔታ

ግምገማ እንዲሁም

ከሴፕቴምበር 1-10፣ 11-10/2026 የሚኖረው የአየር ሁኔታ ትንበያ

እና ምክረ ሃሳብ

ሴፕቴምበር 2026

አዲስ አበባ


በኢትዮጵያ የሚቲዎርሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቲዎርሎጂ ትንበያ፤

ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

1. እ.ኤ.አ ከኦገስት 21 እስከ 31/2026 የነበረው የአየር ሁኔታ

ባለፉት አስራ አንድ ቀናት በደቡብ ምዕራብ፣ ምዕራብ፣ ሰሜን ምዕራብ፣ ሰሜን፣ መካከለኛው እና ሰሜን ምስራቅ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ የተሻለ የደመና ሽፋን ነበራቸው። ከዚህ ጋር ተያይዞ በደቡብ ምዕራብ፣ ምዕራብ፣ ሰሜን ምዕራብ እና በመካከለኛው የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ በ24 ሰዓት ውስጥ ከመካከለኛ እስከ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ተመዝግቦባቸዋል። በአጠቃላይ ባለፉት አስራ አንድ ቀናት በ51 የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ በ24 ሰዓት ውስጥ ከ30 ሚ.ሜ በላይ የሆነ ከባድ መጠን ያለው የዝናብ መጠን ነበራቸው (ምስል 1) ።

በተጨማሪም በምዕራብ፣ ደቡብ ምዕራብና ሰሜን ምዕራብ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ በ24 ሰዓት ውስጥ 40-133 ሚ.ሜ የሚደርስ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ተመዝግቧል። ከ40 ሚ.ሜ በላይ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ከተመዘገበባቸው የሀገሪቱ አካባቢዎች መካከል አደዋ 45.6፣ አንገር ጉትን 40፣ ቢላምቢሎ 40፣ ቦሬ 43፣ ቡለን 65፣ ድንግላ 45.7፣ ደብር ሲና 47.2፣ ጊምቢ 82.4፣ ጎንደር 51፣ ሊሙገነት 61.7፣ ማይጨው 79.5፣ ማጅቱ 42.5፣ ማሻ 133፣ ሮቢት 42.2፣ ሽሬ 40.6፣ ጽጺቃ 46.8 ይገኙበታል ።




ምስል1:ከኦገስት 21 እስከ 31/2026 በ24 ሰዓት ውስጥ ከ40 ሚ.ሜ በላይ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ የተመዘገበባቸው ስፍራዎች

በኢትዮጵያ የሚቲዎሮሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቲዎሮሎጂ ትንበያ፡


ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

ባለፉት አስራ አንድ ቀናት የዘነበዉ የዝናብ መጠን ከሀገሪቱ ቦታ ሽፋን አንፃር ሲገመገም፤ ከኦሮሚያ ክልል ኢሉባቦር፤ ቡኖ በደሌ፤ ጅማ፤ ቄለም ወለጋ፤ ምዕራብ ወለጋ፤ ምስራቅ ወለጋ፤ ሆሮ ጉድሩ ወለጋ፤ ሁሉም የሸዋ ዞኖች፤ ሸገር ከተማ፤ ከአማራ ክልል የሰሜን፤ ምዕራብ፤ መካከለኛዉና ደቡብ ጎንደር፤ ባህርዳር ዙሪያ፤ የሰሜን፤ ምዕራብና ምስራቅ ጎጃም፤ አዊ፤ የደቡብ እና የሰሜን ወሎ፤ ሰሜን ሸዋ ዞኖች፤ ከትግራይ ክልል የምዕራብ፤ የሰሜን ምዕራብ፤ መካከለኛዉ፤ ምስራቅ እና ደቡብ ምስራቅ ትግራይ ዞኖች፤ ከቤንሻንጉል ጉምዝ ካማሺ፤ መተከል፤ አሶሳ፤ ማኦ ኮሞ ልዩ ወረዳ፤ ከደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል ሸካ፤ ቤንች ሸኮ፤ ከፋ፤ ኮንታ፤ ዳዉሮ ዞኖች፤ ከማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ጉራጌ፤ ምስራቅ ጉራጌ፤ ሀዲያ፤ የም፤ ስልጤ፤ ሃላባ፤ ከምባታ ዞኖች፤ ከደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ወላይታ፤ አዲስ አበባ ላይ ከ31-210 ሚ.ሜ የሚደርስ ዝናብ ከ3-10 ቀናት ያህል ዝናብ ነበራቸዉ (ካርታ 1 እና 2)፡፡


ባለፉት አስራ አንድ ቀናት የዘነበዉ የዝናብ መጠን ከመደበኛዉ ጋር ሲነፃፀር ሲገመገም፤ ከኦሮሚያ ክልል ኢሉባቦር፤ ቡኖ በደሌ፤ ጅማ፤ ቄለም ወለጋ፤ ምዕራብ ወለጋ፤ ምስራቅ ወለጋ፤ ሆሮ ጉድሩ ወለጋ፤ ሁሉም የሸዋ ዞኖች፤ ሸገር ከተማ፤ ከአማራ ክልል የሰሜን፤ ምዕራብ፤ መካከለኛዉና ደቡብ ጎንደር፤ ባህርዳር ዙሪያ፤ የሰሜን፤ ምዕራብና ምስራቅ ጎጃም፤ አዊ፤ የደቡብ እና የሰሜን ወሎ፤ ሰሜን ሸዋ ዞኖች፤ ከትግራይ ክልል የምዕራብ፤ የሰሜን ምዕራብ፤ መካከለኛዉ፤ ምስራቅና ደቡብ ምስራቅ ትግራይ ዞኖች፤ ከአፋር ክልል ሁሉም ዞኖች፤ ከቤንሻንጉል ጉምዝ ካማሺ፤ መተከል፤ አሶሳ፤ ማኦ ኮሞ ልዩ ወረዳ፤ ከጋምቤላ ክልል አኝዋክ፤ መሻርንግ፤ ኑዌር እና ኢታንግ ልዩ ወረዳ፤ አዲስ አበባ በአብዛኛ መደበኛ እና በጥቂት ቦታዎቻቸዉ ላይ ከመደበኛ በላይ የሆነ የዝናብ መጠን ተመዝግቧል (ካርታ 3) ፡፡



ካርታ 1 እ.ኤ.አ ከኦገስት 21 እስከ 31/2026 ድረስ የነበረዉ የዝናብ መጠን በሚ.ሜ



ካርታ 2 እ.ኤ.አ ከኦገስት 21 እስከ 31/2026 ድረስ ዝናብ የዘነበባቸዉ ቀናት



ካርታ 3 እ.ኤ.አ ከኦገስት 21 እስከ 31/2026 የነበረዉ የዝናብ መጠን ከመደበኛዉ ጋር ሲነፃፀር

1.2 እ.ኤ.አ ከኦገስት 21 እስከ 31/2026 የነበረው የአየር ሁኔታ በግብርና

ሥራ እንቅስቃሴ ላይ ያሳደረው ተፅዕኖ

ባለፉት አስራ አንድ ቀናት በአብዛኛው የክረምት ዝናብ ተጠቃሚ በሆኑት የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ የነበረው የአፈር ዉስጥ እርጥበት ሁኔታ በተለያዩ የእድገት ደረጃ ላይ ለሚገኙ የረጅም፣ የመካከለኛ እና የአጭር ጊዜ የመኸር ሰብሎችም ሆነ ለቋሚ ተክሎች፣ ለጓሮ አትክልቶችና ለፍራፍሬዎች የውሃ ፍላጎታቸውን ከማሟላት አንጻር ከፍተኛ ጠቀሜታ ነበረው፡፡ ከዚህም በተጨማሪ በተለይም በምስራቅና በሰሜን ምስራቅ አካባቢዎች ለሚገኙት አርብቶ አደርና ከፊል አርብቶ አደር አካባቢዎች የመጠጥ ውሃ እና የግጦሽ ሳር አቅርቦት ጠቀሜታ ነበረው፡፡ በሌላ በኩል አልፎ አልፎ በአንዳንድ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ በተለይም በዋግህመራ ዞን ከነበረው በረዶ የቀላቀለ ከባድ ዝናብ ጋር ተያይዞ በሰብሎች ላይ ጉዳት አድረጓል፡፡ (ካርታ 4)።


1.3 እ.ኤ.አ ከኦገስት 21 እስከ 31/2026 የነበረው የአየር ሁኔታ በውሃው ዘርፍ

ላይ ያሳደረው ተፅዕኖ

ባለፉት የኦገስት ሶስተኛው አስር ቀናት በአብዛኛው አባይ፣ በላይኛውና መካከለኛው ባሮ አካባቢ፣ ኦሞ ጊዜ፣ ስምጥ ሸለቆ፣ በጥቂት የላይኛው ዋቢ ሸበሌ፣ ገናሌ ዳዋ፣ አዋሽ፣ የተከሄ፣ መረብ ጋሽ እንዲሁም የአፋር ደናክል ተፋሰሶች ላይ ከመጠነኛ እስከ በጣም ከፍተኛ የገፀ ምድር የውሃ ፍሰት እንደነበራቸው የተተነተኑ የውሃ ሚቲዎሮሎጂ መረጃዎች ያመለክታሉ፡፡ ይህም ሁኔታ ለገፀ ምድር ውሃ ሀብት መሻሻል ከፍተኛ አስተዋፅኦ የነበረው ሲሆን በአንጻሩ ግን በከፊል የአፋር ደናክል፣ ኦጋዴን፣ አይሻ፣ ገናሌ ዳዋ፣ ዋቢ ሸበሌ፣ እንዲሁም የታችኛው ስምጥ ሸለቆ ተፋሰሶች በደረቅ እርጥበት ሁኔታ ስር ቆይተዋል (ካርታ 5)።


በኢትዮጵያ የሚኒስቴር ሥልጣን አገልግሎት የሚኒስቴር ትንበያ፡

ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ



ካርታ 4 እ.ኤ.አ ከኅዳር 21 እስከ 31/2026

ድረስ የነበረው የእርጥበት ሁኔታ



ካርታ 5 እ.ኤ.አ ከኅዳር 21 እስከ 31/2026

ድረስ የነበረው የእርጥበት ሁኔታ



Ethiopian Meteorology Institute



በኢትዮጵያ የሚቲዎሮሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቲዎሮሎጂ ትንበያ፡

ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

2. መግቢያ


በመደበኛ ሁኔታ ሴፕቴምበር የክረምት የመጨረሻ ወር ከመሆኑ ጋር ተያይዞ የወቅቱ ዝናብ ከሰሜን ምስራቅ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ እየቀነሰ የሚሄድ ሲሆን፤ በአንጻሩ ለረጅም ጊዜ ደረቅ ሆነው የሰነበቱት የደቡብና የደቡብ ምሥራቅ አካባቢዎች ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸውን ማግኘት ይጀምራሉ። በዚህም መሠረት በምዕራብ አጋማሽ የሀገሪቱ ሥፍራዎች ላይ ከ100-300 ሚ.ሜ ይደርሳል። በእነዚህ አካባቢዎች የዝናብ ቀናትም ከ12-23 ለሚደርሱት ቀናት ያህል ዝናብ ይኖራል። በሌላ በኩል በምስራቅ፣ በሰሜን ምስራቅ እና በመካከለኛው ኢትዮጵያ አካባቢዎች ላይም ቢሆን የዝናቡ መጠንና ሥርጭት እየቀነሰ የሚሄድ በመሆኑ ከ3-15 ቀናት ያህል ከ20-200 ሚ.ሜ የሚደርስ ዝናብ በአማካይ ይኖራል። የደቡብና የደቡብ ምስራቅ ስፍራዎች ላይ ዝናቡ በመጠንም ሆነ በሥርጭት የሚጨምር በመሆኑ 30-100 ሚ.ሜ ከ3-12 ቀናት ይደርሳል።

2.1 እ.ኤ.አ ከሴፕቴምበር 1 እስከ 10/2026 የሚኖረው የአየር ሁኔታ ትንበያ

በመጨረሻ የሴፕቴምበር የመጀመሪያዎቹ አሥር ቀናት ለዝናብ መፈጠር ምቹ ሁኔታን የሚፈጥሩ የሚቲዎሮሎጂ ገጽታዎች በምዕራብ አጋማሽ የሀገሪቱ አካባቢዎች እየተስፋፉና እየተጠናከሩ ይሄዳሉ። ከዚህ ጋር በተያያዘም በተለይም በደቡብ ምዕራብ፣ ምዕራብ፣ ሰሜን ምዕራብ፣ ሰሜን፣ መካከለኛው የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ የተሻለ የዝናብ መጠንና ሥርጭት እንደሚኖራቸው አህዛዊ የትንበያ መረጃዎች ያሳያሉ (ካርታ 6)። ስለሆነም እርጥበታማው የአየር ሁኔታ በምዕራብ፣ ሰሜን ምዕራብ፣ ደቡብ ምዕራብ እና መካከለኛው የሀገራችን አካባቢዎች ላይ በመጠንም ሆነ በሥርጭት እየተስፋፋ ከመሄዱ ጋር ተያይዞ በብዙ ቦታዎቻቸው ላይ ከመካከለኛ እስከ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ እንደሚያገኙ ይጠበቃል። በተጨማሪም፣ በሰሜን ምዕራቅ እና ምዕራቅ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን ያለው ዝናብ እንደሚኖራቸው አህዛዊ የትንበያ መረጃዎች ያመላክታሉ (ካርታ 6 እና 7)። በሌላ በኩል በሰሜን ምዕራብ፣ ደቡብ ምዕራብ፣ መካከለኛው እና ምዕራብ የሀገራችን አካባቢዎች ላይ አልፎ አልፎ ከሚጠናከሩት የአየር ሁኔታ ክስተቶች ላይ በመነሳት ከባድ መጠን ያለው ዝናብ እንደሚኖር የትንበያ መረጃዎች ይጠቁማሉ።

በሚቀጥሉት አስር ቀናት ከሚጠናከሩት የሚቲዎሮሎጂ ገጽታዎች ላይ በመነሳት የክረምት ዝናብ ተጠቃሚ በሆኑ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ ብዙ ቦታዎቻቸውን የሚሸፍን ከመካከለኛ እስከ ከባድ (ከ11-30 ሚ.ሜ) መጠን ያለው ዝናብ ያገኛሉ (ካርታ 7) ።


Rainfall (mm) forecast for 01-11 Sep 2026



ካርታ 6 እ.ኤ.አ. ከሴፕቴምበር 1-10, 2026

የሚኖረው የዝናብ መጠን በሚ.ሜ

Exceptional Rainfall for 01-11 Sep 2026



ካርታ 7 እ.ኤ.አ. ከሴፕቴምበር 1-10, 2026

የሚኖረው ከፍተኛ የዝናብ መጠን

በኢትዮጵያ የሚቲዎሮሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቲዎሮሎጂ ትንበያ፡

ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

ሠንጠረዥ 1፡ በሚቀጥሉት አስር ቀናት ዝናብ የሚያገኙ አካባቢዎችና በ24 ሰዓት ውስጥ የሚኖረው የዝናብ መጠን

ክልል	ዞን	በ 24 ሰዓት ውስጥ የሚኖረው የዝናብ መጠን
አሮሚያ	ቁለም ወሊጋ፣ ምዕራብ ወሊጋ፣ ምስራቅ ወሊጋ፣ ሆሮ ጉድሩ ወሊጋ፣ ኢሉባቦር፣ ቡኖ በደሌ፣ ጅማ ዞኖች	ከመካከለኛ እስከ ከባድ መጠን (ከ11 እስከ 30 ሚ.ሜ)
	ምዕራብ አርሲ፣ አርሲ፣ ሸገር ሲቲ እና ሁሉም የሸዋ ዞኖች፣ ምስራቅ እና ምዕራብ ሐረርጌ፣ ባሌ፣ ምስራቅ ባሌ እና የምዕራብ ጉጂ ዞን	ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን (ከ1-29 ሚ.ሜ)
አማራ	የምዕራብ፣ መካከለኛው፣ ደቡብ እና ሰሜን ጎንደር፣ የባህርዳር ዙሪያ፣ የሰሜን፣ የምዕራብ እና የምስራቅ ጎጃም እና የአዊ ዞኖች	ከመካከለኛ እስከ ከባድ መጠን (ከ11 እስከ 30 ሚ.ሜ)
	ዋግህምራ፣ የደቡብ እና ሰሜን ወሎ፣ የሰሜን ሸዋ ዞኖች እና የኦሮሞ ብሄረሰብ ልዩ ዞን፣	ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን (ከ1-29 ሚ.ሜ)
ጋምቤላ	አኝዋክ፣ መሻርንግ፣ የኑዌር እና የኢታንግ ልዩ ወረዳ	ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን (ከ1 እስከ 29 ሚ.ሜ በላይ)
ቤንሻንጉል ጉምዝ	ካማሺ፣ መተከል፣ አሶሳ፣ ማኦ ኮሞ ዞኖች	ከመካከለኛ እስከ ከባድ መጠን (ከ11 እስከ 30 ሚ.ሜ)
ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ	ከፋ፣ ኮንታ፣ ዳውሮ፣ ቤንች ሸኮ፣ ሸካ፣ ምዕራብ ኦሞ	ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን (ከ1 እስከ 29 ሚ.ሜ በላይ)
ማዕከላዊ ኢትዮጵያ	ጉራጌ፣ ምስራቅ ጉራጌ፣ ስልጤ፣ ሀዲያ፣ ከምባታ፣ ሀላባ፣ የም፣ ጠምባሮ ልዩ ወረዳ፣ ቀቤና ልዩ ወረዳ፣ ማረቆ ልዩ ወረዳ	ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን (ከ1 እስከ 29 ሚ.ሜ በላይ)
አዲስ አበባ፣ ድሬዳዋ እና ሐረሪ		ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን (ከ1 እስከ 29 ሚ.ሜ በላይ)

በኢትዮጵያ የሚቲዎሮሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቲዎሮሎጂ ትንበያ፡

ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

ትግራይ	የምዕራብ፣ የሰሜን ምዕራብ፣ መካከለኛው፣ ምስራቅ፣ እና ደቡብ ትግራይ ዞኖች	ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን (ከ1-29 ሚ.ሜ በላይ)
አፋር	የአዉሲ፣ ማሂ፣ ሀሪ እና ጋቢ ዞኖች	ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን (ከ1-29 ሚ.ሜ)
ሲዳማ ክልል	አብዛኛው የክልሉ ዞኖች	ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን (ከ1-29 ሚ.ሜ)
ደቡብ ኢትዮጵያ	ወላይታ፣ጎፋ፣ እና ጌድዮ ዞኖች	ቀላል መጠን (ከ1-10 ሚ.ሜ)
ሶማሌ	ሲቲ እና ፋፈን ዞኖች	ቀላል መጠን (ከ1-10 ሚ.ሜ)

2.3 እ.ኤ.አ ከሴፕቴምበር 11 እስከ 20/2026 የሚኖረው የአየር ሁኔታ

አዝማሚያ

በመደበኛ ሁኔታ በሴፕቴምበር ሁለተኛው አሥር ቀናት የክረምት ዝናብ ሰጭ የሚቲዎሮሎጂ ገጽታዎች ከሰሜንና ከሰሜን ምሥራቅ የሀገሪቱ አካባቢዎች እየተዳከሙ የሚሄዱበትና ከዚህም ጋር ተያይዞ የወቅቱ ዝናብ በመጠንም ሆነ በሥርጭት በጎላ መልኩ እየቀነሰ ይሄዳል፡፡ በሌላ በኩል የክረምት የዝናብ ድንበር (ITCZ) ወደ ምዕራባዊው አጋማሽና ወደ ደቡባዊው የኢትዮጵያ ክፍሎች ስለሚያፈገፍግ ዝናቡ በምዕራብና በደቡብ ምዕራብ ቀጣይነት የሚኖረው ሲሆን፤ በተመሳሳይ ሁኔታም የደቡብ የሀገሪቱ ሥፍራዎች ሁለተኛውን የዝናብ ወቅታቸውን ቀስ በቀስ ማግኘት ይጀምራሉ፡፡

በሚቀጥሉት የሴፕቴምበር ሁለተኛው አሥር ቀናት አሁን ከሚታዩትና በቀጣይነትም ከተተነበዩት የትንበያ መረጃዎች መረዳት እንደተቻለው ዝናብ ሰጭ የሚቲዎሮሎጂ ገጽታዎች በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ ቀጣይነት ይኖራቸዋል፡፡ በመሆኑም፤ በሰሜን ምዕራብ፣ ደቡብ ምዕራብ፣ ምዕራብ እንዲሁም መካከለኛው የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን ያለው ዝናብ እንደሚኖራቸው የትንበያ መረጃዎች ያመለክታሉ፡፡ በተጨማሪም በጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው በሆኑት የደቡብና ደቡብ ምስራቅ የሀገሪቱ አካባቢዎች ከቀን ወደ ቀን የደመና ሽፋን እየጨመረ እንደሚሄድ ከመጠበቁ ጋር ተያይዞ ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን ያለው ዝናብ ያገኛሉ፡፡

**በኢትዮጵያ የሚቲዎሮሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቲዎሮሎጂ ትንበያ፣
ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ**

**2.4 እ.ኤ.አ ከሴፕቴምበር 1 እስከ 10/2026 የሚኖረው የአየር ሁኔታ በግብርናው
ሥራ እንቅስቃሴ ላይ ሊያሳድር የሚችለው ተፅዕኖ**

በሚቀጥሉት የሴፕቴምበር የመጀመሪያው አስር ቀናት በምዕራብ፣ በሰሜን ምዕራብ፣ በደቡብ ምዕራብ እና በመካከለኛው የሀገራችን አካባቢዎች ላይ ከመካከለኛ እስከ ከባድ መጠን ያለው እርጥበት እንደሚኖር ይጠበቃል። በመሆኑም የሚኖሩ መልካም አጋጣሚዎችን በአግባቡ ለመጠቀምና አሉታዊ ተጽዕኖዎችን ለመቀነስ የሚያስችል ቦታ ተኮር የግብርና ሚቲዎሮሎጂ ምክረ ሀሳብ ከወዲሁ ተግባራዊ ማድረግ ያስፈልጋል (ሠንጠረዥ 2)።

**2.5 እ.ኤ.አ ከሴፕቴምበር 1 እስከ 10/2026 የሚኖረው የአየር ሁኔታ በውሀ
ዘርፍ ላይ ሊያሳድር የሚችለው ተፅዕኖ**

በሚቀጥሉት የሴፕቴምበር የመጀመሪያዎቹ አስር ቀናት የክረምት ዝናብ ተጠቃሚ በሆኑት የሀገራችን ተፋሰሶች ላይ ከዝቅተኛ እስከ ከፍተኛ መጠን ያለው የገፀ ምድር የውሃ ፍሰት እንደሚኖራቸው ይጠበቃል (ሠንጠረዥ 3) ።



በኢትዮጵያ የሚታወቁት ኢንስቲትዩት የሚታወቁት ትንበያ፡

ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ



ሠንጠረዥ 2፡ በሚቀጥሉት አስር ቀናት የሚኖረው የእርጥበት ሁኔታ በግብርናው እንቅስቃሴ ላይ

የክረምት ዝናብ ተጠቃሚና የመኸር ሰብል አብቃይ እንዲሁም አርብቶ አደርና ከፊል አርብቶ አደር አካባቢዎች

ከመካከለኛ እስከ ከባድ መጠን ያለው እርጥበት የሚያገኙ ዞኖች	አዎንታዊ ተጽዕኖ	አሉታዊ ተጽዕኖ	የተሰጠ ምክረ ሃሳብ
ቁለም ወለጋ፣ ምዕራብ ወለጋ፣ ምስራቅ ወለጋ፣ ሆሮ ጉድሩ ወለጋ፣ ኢሉባቦር፣ ቡኖ በደሌ፣ ጅማ ፣ የምዕራብ፣ መካከለኛ፣ ደቡብ እና ሰሜን ጎንደር፣ የባህርዳር ዙሪያ፣ የሰሜን፣ የምዕራብ እና የምስራቅ ጎጃም ዞኖች ፣ አዊ ፣ ካማሺ፣ መተከል፣ አሶሳ፣ ማኦ ኮሞ ዞኖች	➤ ለረጅምና መካከለኛ ጊዜ ሰብሎች እድገት እና ፍሬ ለማፍራት ➤ ለእንስሳት መኖርና የመጠጥ ውሃ አቅርቦት መሻሻል ➤ የተፈጥሮና ሰው ሰራሽ የውሃ ማጠራቀሚያዎችን ለማጎልበት ➤ ለቋሚ ተክሎች እድገት እና ለከተማ ግብርና እንዲሁም ለአረንጓዴ እፅዋት ልምላሜ እና ለአረንጓዴ አሻራ መረሃ ግብሮች	➤ የእርጥበት መብዛት እና ተዳፋታማ በሆኑ አካባቢዎች የውኃ በሰብሎች ላይ መተኛት ➤ ውሃገብ በሆኑና በወንዝ ዳርቻ ባሉ ሰብሎች ላይ የአፈር መታጠብ ➤ የአረም መስፋፋት ➤ የሰብል በሽታና ተባይ መከሰት ➤ የበረዶ ክስተት	➤ ተዳፋታማ ማሳዎች ላይ የተዘጉ የማፋሰሻና የማንጣፈፊያ ቦቶችን ማስተካከል ➤ የሰብል በሽታንና አረምን አስቀድሞ መከላከል፤ ➤ የአፈር መሸርሸር መከላከል ስራዎችን በስፋት መስራት ➤ የመሬት መንሸራተት ተጋላጭነትን መቀነስ ➤ እርጥበት አጠር አካባቢዎች የዝናብ ውሃን ማሰባሰብና ማጠራቀም ➤ አርሶ አደሮች የማሳ ጉብኝት በየጊዜው ማድረግ ➤ አረምን በወቅቱ ማረም፣ ፀረ-አረምና ፀረ-ተባይ ኬሚካሎችን ከግብርና ባለሙያ ጋር በመመካከር መተግበር

በኢትዮጵያ የሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎርሎጂ ትንበያ፡

ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ



ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን ያለው እርጥበት የሚያገኙ ዞኖች	አዎንታዊ ተጽዕኖ	አሉታዊ ተጽዕኖ	የተሰጠ ምክረ ሃሳብ
ምዕራብ አርሲ፣ አርሲ፣ ሸገር ሲቲ ፣ ሁሉም የሸዋ ዞኖች፣ ምስራቅ እና ምዕራብ ሐረርጌ፣ ባሌ፣ ምስራቅ ባሌ ፣ ምዕራብ ጉጂ ፣ ዋግህምራ፣ ደቡብ እና ሰሜን ወሎ፣ ሰሜን ሸዋ ፣የኦሮሞ ብሄረሰብ ልዩ ዞን፣ አኝዋክ፣ መኻንግ፣ የኑዌር እና የኢታንግ ልዩ ወረዳ ፣ ከፋ፣ ኮንታ፣ ዳውሮ፣ ቤንች ሸኮ፣ ሸካ፣ ምዕራብ አሞ፣ ጉራጌ፣ ምስራቅ ጉራጌ፣ ስልጤ፣ ሀዲያ፣ ከምባታ፣ ሀላባ፣ የም፣ ጠምባሮ ልዩ ወረዳ፣ ቀቤና ልዩ ወረዳ፣ ማረቆ ልዩ ወረዳ፣ አዲስ አበባ፣ ድሬዳዋ ፣ ሐረሪ፣ የምዕራብ፣ የሰሜን ምዕራብ፣ መካከለኛው፣ ምስራቅ፣ እና ደቡብ ትግራይ ዞኖች ፣ አዉሲ፣ ማሂ፣ ሀሪ ፣ ጋቢ ፣ የሲዳማ አብዛኛው የክልሉ ዞኖች፣ ወላይታ፣ጎፋ ፣ ጌድዮ ፣ ሲቲ እና ፋፈን ዞኖች	➤ ለረጅምና መካከለኛ ጊዜ ሰብሎች እድገት እና ፍሬ ለማፍራት ➤ የአረንጓዴ እፅዋት ልምላሜ፣ ለመጠጥ ውሃና ለግጦሽ ሣር አቅርቦት መሻሻል ➤ የዝናብ ውሃን ለማሰባሰብና ለማጠራቀም	➤ የዝናብ መቆራረጥና ደረቅ ሰሞናት መኖር ➤ የትነት መጠን መጨመር፤ ➤ የሰብል በሽታ መከሰት፤ ➤ በተወሰኑ ቦታዎች ላይ የአፈር ውስጥ እርጥበት ዝቅተኛ መሆንና ➤ ለሰብሎች የውሃ ፍላጎት በቂ አለመሆን	➤ የሚገኘውን እርጥበት በአግባቡ መጠቀም ➤ የዝናብ ውኃን በማሰባሰብ በደረቅ ሰሞናት ተግባር ላይ ማዋል ➤ የአፈር ውስጥ የትነት መጠንን ለመቀነስ የሚያስችሉ ተግባራትን ማከናወን፤ ➤ ለእንስሳት የግጦሽ ሣርን በአግባቡ መጠቀምና መጠበቅ፤

Ethiopian Meteorology Institute



በኢትዮጵያ የሚቲዎሮሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቲዎሮሎጂ ትንበያ፡

ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ



ሠንጠረዥ 3 በሚቀጥሉት አስር ቀናት የሚኖረው የእርጥበት ሁኔታ በወሀወሀ ዘር ላይ ሊኖር የሚችለው ተጽዕኖ

ከመካከለኛ እስከ ከፍተኛ የገፀ ምድር ውሃ ፍሰት	አዎንታዊ ተጽዕኖ	አሉታዊ ተጽዕኖ	የውሃ ሚቲዎሮሎጂ ምክረ ሃሳብ
አብዛኛው አባይ፣ ባሮ አካባቢ፣ በላኛውና መካከለኛው አሞ ጊዜ፣ ስምጥ ሽለቆ፣ አዋሽ፣ በላኛው የገናሌ ዳዋ	• የገጸ ምድርና የወንዞች ውሃ መጠን መጨመር። • የከርሰ ምድር ውሃ ይዘት መሻሻል። • ለመስኖና ለኃይል ማመንጫ የሚውሉ ግድቦች የውሃ ክምችት መጨመር። • የመጠጥ ውሃ አቅርቦት መሻሻል። • የውሃ ኃይል ምርታማነት መጨመርና መሻሻል። • በደረቅ ወቅት የወንዞች መሠረታዊ ፍሰት መጠናከር። የውሃ ሀብት ተደራሽነትና የአካባቢ ኢኮኖሚ መሻሻል።	• የደለል ስጋት መኖር • የውሃ ማፋሰሻ ቱቦዎች በቆሻሻ መዘጋት	• የዝናብ ውኃ ማሰባሰብና ማጠራቀም • የመጠጥ ውሃን አክሞ መጠቀም • ትንበያዎችንና ምክረ ሀሳቦችን በየጊዜው መከታተል • የፍላጎት መውረጃ ቦቶችን ማፅዳት • የጎርፍ መቀለበሻ ቦቶችን ማዘጋጀት
ከቀላል እስከ መካከለኛ የገፀ ምድር ውሃ ፍሰት	አዎንታዊ ተጽዕኖ	አሉታዊ ተጽዕኖ	የውሃ ሚቲዎሮሎጂ ምክረ ሃሳብ
የታችኛው አዋሽ፣ የላይኛው ዋቢ ሸበሌና ተከዜ፣ መረብ፣	የገፀ ምድር የውሃ ፍሰት በመጠኑ መሻሻል • የጎርፍም ሆነ የደለል ስጋት መቀነስ	• ከፍተኛ ትነት • ዝቅተኛ የውኃ ፍሰት • እርጥበት አጠር በሆኑ አካባቢዎች መጠነኛ የውሃ እጥረት	• የሚገኘውን የዝናብ ውኃ አክሞ መጠቀም • ወራጅ የዝናብ ውኃን ማሰባሰብና ማጠራቀም ከቤት ጣራ ላይ ውኃ የመሰባሰብና ማጠራቀም ስራዎች የአየር ሁኔታ መረጃን በቅርበት መከታተል
ደረቅ የአየር ሁኔታ	አዎንታዊ ተጽዕኖ	አሉታዊ ተጽዕኖ	የውሃ ሚቲዎሮሎጂ ምክረ ሃሳብ
አጋዴን፣ የመካከለኛውና ታችኛው ዋቢ ሸበሌ፣ አፋር ደናክል፣ አይሻ፣ እንዲሁም የገናሌ ዳዋ ተፋሰሶች	• የጎርፍም ሆነ የደለል ስጋት አለመኖር፤	• የገጸ ምድር የውሃ ፍሰት መቀነስ • የትነት መጠን መጨመር	• የሚገኘውን ውኃ በቁጠባና በአግባቡ መጠቀም • የገጸ ምድር የውኃ ሀብትን በአግባቡ መያዝ