

በኢትዮጵያ የሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎርሎጂ ትንበያ፣
ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

በኢትዮጵያ የሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎርሎጂ ትንበያ፣
ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ



ከኦገስት 1-31/2026 የነበረው የአየር ጠባይ ግምገማ እንዲሁም

ከሴፕቴምበር 1-30/2026 የሚኖረው የአየር ጠባይ ትንበያ እና
ምክረ ሃሳብ

ሴፕቴምበር 2026

አዲስ አበባ


በኢትዮጵያ የሚቲዎሮሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቲዎሮሎጂ ትንበያ፡

ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

1.2 እ.ኤ.አ ከኦገስት 1 እስከ 31/2026 የነበረው የአየር ሁኔታ

ባለፈው የኦገስት ወር በደቡብ ምዕራብ፣ ምዕራብ፣ ሰሜን ምዕራብ፣ ሰሜን፣ መካከለኛው እና ሰሜን ምስራቅ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ የተሻለ የደመና ሽፋን ነበራቸው፡፡ ከዚህ ጋር ተያይዞ በደቡብ ምዕራብ፣ ምዕራብ፣ ሰሜን ምዕራብ እና በመካከለኛው የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ በ24 ሰዓት ውስጥ ከመካከለኛ እስከ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ተመዝግቦባቸዋል፡፡ በአጠቃላይ ባለፉት አስር ቀናት በ112 የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ በ24 ሰዓት ውስጥ ከ30 ሚ.ሜ በላይ የሆነ ከባድ መጠን ያለው የዝናብ መጠን ነበራቸው (ምስል 1) ፡፡

በተጨማሪም በምዕራብ፣ ደቡብ ምዕራብና ሰሜን ምዕራብ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ በ24 ሰዓት ውስጥ 51-133 ሚ.ሜ የሚደርስ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ተመዝግቧል፡፡ ከ60 ሚ.ሜ በላይ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ከተመዘገበባቸው የሀገሪቱ አካባቢዎች መካከል አዳዋ 60.5፣ አምባማሪያም 70.2፣ አሳሳ 60፣ አየው 65፣ ቡለን 65፣ ደብረ ታቦር 63.4፣ ዳንግላ 74፣ ደብረ ሲና 63.5፣ ጊምቢ 82.4፣ ሂርና 98.3፣ ሊ.መ.ገነት 61.7፣ ማይጨው 79.5፣ ማሻ 133፣ መተማ 61.7፣ ነቀምት 89.4፣ ሰመራ 60.2፣ ወረኢሊ 78 ይገኙበታል ፡፡




ምስል1: ከኦገስት 1 እስከ 31/2026 በ24 ሰዓት ውስጥ ከ60 ሚ.ሜ በላይ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ የተመዘገበባቸው ስፍራዎች

በኢትዮጵያ የሚቲዎሮሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቲዎሮሎጂ ትንበያ፡


ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

ባለፈው የኦገስት ወር የዘነበው የዝናብ መጠን ከሀገሪቱ ቦታ ሽፋን አንፃር ሲገመገም፤ ከኦሮሚያ ክልል አሊባቦር፤ ቡኖ በደሌ፤ ጅማ፤ ቄለም ወለጋ፤ ምዕራብ ወለጋ፤ ምስራቅ ወለጋ፤ ሆሮ ጉድሩ ወለጋ፤ ሁሉም የሸዋ ዞኖች፤ ሸገር ከተማ፤ አርሲ፤ ምዕራብ ሐረርጌ ዞኖች፤ ከአማራ ክልል የሰሜን፤ ምዕራብ፤ መካከለኛውና ደቡብ ጎንደር፤ ባህርዳር ዙሪያ፤ የሰሜን፤ ምዕራብና ምስራቅ ጎጃም፤ አዊ፤ የደቡብ እና የሰሜን ወሎ፤ ሰሜን ሸዋ ዞኖች፤ ከትግራይ ክልል የምዕራብ፤ የሰሜን ምዕራብ፤ መካከለኛው ትግራይ ዞኖች፤ ከቤንሻንጉል ጉምዝ ካማሺ፤ መተከል፤ አሶሳ፤ ማኦ ኮሞ ልዩ ወረዳ፤ ከደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል ሸካ፤ ቤንች ሸከ፤ ከፋ፤ ኮንታ ዞኖች፤ ከማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ጉራጌ፤ ምስራቅ ጉራጌ፤ ሀዲያ፤ የም፤ ስልጤ፤ ሃላባ፤ ከምባታ ዞኖች፤ ከደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ወላይታና ጎፋ፤ ዞኖች፤ አዲስ አበባ ላይ ከ101-450 ሚ.ሜ የሚደርስ ዝናብ ከ4-10 ቀናት ያህል ዝናብ ነበራቸው (ካርታ 1 እና 2)፡፡


በኦገስት ወር የዘነበው የዝናብ መጠን ከመደበኛው ጋር ሲነፃፀር ሲገመገም፤ ከኦሮሚያ ክልል አሊባቦር፤ ቡኖ በደሌ፤ ጅማ፤ ቄለም ወለጋ፤ ምዕራብ ወለጋ፤ ምስራቅ ወለጋ፤ ሆሮ ጉድሩ ወለጋ፤ ሁሉም የሸዋ ዞኖች፤ ሸገር ከተማ፤ አርሲ፤ ከአማራ ክልል የሰሜን፤ ምዕራብ፤ መካከለኛውና ደቡብ ጎንደር፤ ባህርዳር ዙሪያ፤ የሰሜን፤ ምዕራብና ምስራቅ ጎጃም፤ አዊ፤ የደቡብ እና የሰሜን ወሎ፤ ሰሜን ሸዋ ዞኖች፤ ከትግራይ ክልል የምዕራብ፤ የሰሜን ምዕራብ፤ መካከለኛው፤ ምስራቅና ደቡብ ምስራቅ ትግራይ ዞኖች፤ ከአፋር ክልል ሁሉም ዞኖች፤ ከቤንሻንጉል ጉምዝ ካማሺ፤ መተከል፤ አሶሳ፤ ማኦ ኮሞ ልዩ ወረዳ፤ ከጋምቤላ ክልል አኝዋክ፤ መሻርንግ፤ ኑዌር እና ኢታንግ ልዩ ወረዳ፤ ከደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል ሸካ፤ ቤንች ሸከ፤ ከፋ፤ ኮንታ፤ ዳዉሮ ዞኖች፤ ከማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ጉራጌ፤ ምስራቅ ጉራጌ፤ ሀዲያ፤ የም፤ ስልጤ፤ ሃላባ፤ ከምባታ ዞኖች፤ ከደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ወላይታና ጎፋ፤ አዲስ አበባ፤ ድሬዳዋ እና ሐረሪ ላይ በአብዛኛው ከመደበኛው የተቀራረበ እና በጥቂት የደቡብ ምዕራብና የምዕራብ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ ከመደበኛ በላይ የሆነ የዝናብ መጠን ተመዝግቧል (ካርታ 3)፡፡



ካርታ 1 እ.ኤ.አ ከኦገስት 1 እስከ 31/2026 ድረስ የነበረው የዝናብ መጠን በሚ.ሜ



ካርታ 2 እ.ኤ.አ ከኦገስት 1 እስከ 31/2026 ድረስ ዝናብ የዘነበባቸው ቀናት



ካርታ 3 እ.ኤ.አ ከኦገስት 1 እስከ 31/2026 የነበረው የዝናብ መጠን ከመደበኛው ጋር ሲነፃፀር


1.3 እ.ኤ.አ ከኦገስት 1 እስከ 31/2026 የነበረው የአየር ጠባይ በግብርና ሥራ እንቅስቃሴ ላይ ያሳደረው ተፅዕኖ

ባሳለፍነው የኦገስት ወር በአብዛኛው የክረምት ዝናብ ተጠቃሚ በሆኑት የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ የነበረው የእርጥበት ሁኔታ ለግብርናው የስራ እንቅስቃሴ ከፍተኛ ጠቀሜታ ነበረው። በተለይም በማደግ፣ በማበብና ፍሬ በማፍራት ላይ ባሉ የረጅም፣ የመካከለኛ እና የአጭር ጊዜ የመኸር ሰብሎችም ሆነ ለቋሚ ተክሎች፣ ለጓሮ አትክልቶችና ለፍራፍሬዎች የውሃ ፍላጎታቸውን ከማሟላት አንጻር ከፍተኛ ጠቀሜታ ነበረው። ከዚህም በተጨማሪ በተለይም በምስራቅና በሰሜን ምስራቅ አካባቢዎች ለሚገኙት አርብቶ አደርና ከፊል አርብቶ አደር አካባቢዎች የመጠጥ ውሃ እና የግጦሽ ሳር አቅርቦት በተሻለ ሁኔታ እንዲኖራቸው ያስቻለ ነበር። በአንፃሩ በሶስተኛው አስር ቀናት አልፎ አልፎ በዋግህመራ ዞን ከነበረው በረዶ የቀላቀለ ከባድ ዝናብ ጋር ተያይዞ በሰብሎች ላይ ጉዳት አድረጏል። እንዲሁም በሁለተኛው አስር ቀናት ከመኸሩ ዝናብ መቆራረጥ ጋር ተያይዞ በደሴ ዙሪያ ወረዳ 012 እና 041 ቀበሌዎች የፌንጣ ክስተት የተስተዋለ ሲሆን ተባብሮ የሚያደርሰውን ጉዳት ለመቀነስ አርሶ አደሮች ከሚመለከታቸው ባለሙያዎች ጋር በመቀናጀት አፋጣኝ የመከላከል እርምጃ በመውሰድ መከላከል ተችሏል (ካርታ 4)።


1.4 እ.ኤ.አ ከኦገስት 1 እስከ 31/2026 የነበረው የአየር ጠባይ በውሃው ዘርፍ ላይ ያሳደረው ተፅዕኖ

ባሳለፈው የኦገስት ወር በአብዛኛው ባሮ አካባቢ፣ አባይ፣ በአብዛኛው አሞ ጊቤ፣ ስምጥ ሸለቆ፣ ገናሌ ዳዋ፣ ተከዜ፣ በላይኛው ዋቢ ሸበሌ፣ አዋሽ፣ አይሻ፣ አፋር ደናክል፣ እንዲሁም የኦጋዴን ተፋሰሶች ላይ ከመጠነኛ እስከ ከፍተኛ የገፀ ምድር የውሃ ፍሰት ነበራቸው። ይህም ሁኔታ በተፋሰሶችና ንዑስ ተፋሰሶች ውስጥ ያለውን የውሃ ክምችት በማሻሻል ወደ ግድቦች የውሃ መያዣዎች የሚገባውን የውሃ መጠን ከመጨመር አንፃር አዎንታዊ ሚና ነበረው (ካርታ 5)።


በኢትዮጵያ የሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎርሎጂ ትንበያ፣
ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ



ካርታ 4 እ.ኤ.አ ከኦገስት 1 እስከ 31/2026
ድረስ የነበረው የእርጥበት ሁኔታ



ካርታ 5 እ.ኤ.አ ከኦገስት 1 እስከ 31/2026
ድረስ የነበረው የእርጥበት ሁኔታ



2. መግቢያ

በመደበኛ ሁኔታ ሴፕቴምበር የክረምት የመጨረሻ ወር ከመሆኑ ጋር ተያይዞ የወቅቱ ዝናብ ከሰሜን ምስራቅ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ እየቀነሰ የሚሄድ ሲሆን፤ በአንዳንድ ለረጅም ጊዜ ደረቅ ሆነው የሰነበቱት የደቡብና የደቡብ ምሥራቅ አካባቢዎች ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸውን ማግኘት ይጀምራሉ። በዚህም መሠረት በምዕራብ አጋማሽ የሀገሪቱ ሥፍራዎች ላይ ከ100-300 ሚ.ሜ ይደርሳል። በእነዚህ አካባቢዎች የዝናብ ቀናትም ከ12-23 ለሚደርሱት ቀናት ያህል ዝናብ ይኖራል። በሌላ በኩል በምስራቅ፣ በሰሜን ምስራቅ እና በመካከለኛው ኢትዮጵያ አካባቢዎች ላይም ቢሆን የዝናቡ መጠንና ሥርጭት እየቀነሰ የሚሄድ በመሆኑ ከ3-15 ቀናት ያህል ከ20-200 ሚ.ሜ የሚደርስ ዝናብ በአማካይ ይኖራል። የደቡብና የደቡብ ምስራቅ ስፍራዎች ላይ ዝናቡ በመጠንም ሆነ በሥርጭት የሚጨምር በመሆኑ 30-100 ሚ.ሜ ከ3-12 ቀናት ይደርሳል።

2.1 እ.ኤ.አ ከሴፕቴምበር 1 እስከ 30/2026 የሚኖረው የአየር ጠባይ ትንበያ



በመደበኛው ሁኔታ የክረምት ዝናብ ሰጪ የሚቴዎርሎጂ ክስተቶች የፀሐይ አቅጣጫን ተከትለው ከሴፕቴምበር የመጀመሪያው ሳምንት በኋላ ከሰሜንና ሰሜን ምሥራቅ አካባቢዎች የሚዳከሙ ሲሆን በምዕራብ፣ ደቡብ ምዕራብና መካከለኛው የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ የተሻለ ስርጭት ይኖራቸዋል። በወሩ መጨረሻ ሳምንት ደግሞ ዝናብ ሰጪ ክስተቶች እየተዳከሙ በመምጣት ከአብዛኛዎቹ የሰሜን ምሥራቅ፣ መካከለኛውና ምሥራቅ ኢትዮጵያ አካባቢዎች በበጋው ደረቅ የአየር ጠባይ ተፅዕኖ ስር መሆን ይጀምራሉ።

በመጨረሻው ሴፕቴምበር በምዕራብ አማራ፣ ቤንሻንጉል-ጉሙዝ፣ ጋምቤላ፣ ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ፣ የኦሮሚያ ምዕራባዊ አጋማሽ ላይ የክረምቱ ዝናብ እስከ ወሩ መጨረሻ ድረስ የሚቀጥል ሲሆን፤ በመጠን ረገድ ደግሞ አብዛኛው የምዕራብ ትግራይ፣ የአማራ ምሥራቃዊ አጋማሽ፣ የመካከለኛው ኦሮሚያ እንዲሁም ከላይ የተጠቀሱት አካባቢዎችን ጨምሮ ከመደበኛው ጋር የተቀራረበ እና በጥቂት ቦታዎቻቸው ላይ ከመደበኛው በታች ዝናብ እንደሚኖር የሚጠበቅ ሲሆን፤ በአንዳንድ ቦታዎች ላይ አልፎ አልፎ መካከለኛ መጠን ያለው ዝናብ በተለይ እስከ ወሩ አጋማሽ ድረስ ይኖራቸዋል። በተጨማሪም የምሥራቅ የሀገሪቱ አካባቢዎች፣ የሶማሌ ማዕከላዊ እና ደቡባዊ ክፍል፣ ከኦሮሚያ ምዕራብና ምስራቅ ሐረርጌ፣ አርሲ እና ምዕራብ አርሲ እንዲሁም ባሌ እና ምስራቅ ባሌ፣ የማዕከላዊ ኢትዮጵያ፣ የሲዳማ እንዲሁም የአፋር ደቡባዊው ክፍል ቀላል መጥን ያለው ዝናብ እንደሚያገኙ ይጠበቃል (ካርታ 6 እና 7)። በሌላ በኩል ደግሞ የክረምት ዝናብ ሰጪ ክስተቶች ወደ ደቡብ በሚያደርጉት

በኢትዮጵያ የሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎርሎጂ ትንበያ፤

ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

እንቅስቃሴ የደቡብ ኢትዮጵያ፤ ከደቡብ ኦሮሚያ ጉጂ እና ምዕራብ ጉጂ፤ ቦረና እና ምስራቅ ቦረና ዞኖች፤ የደቡብ ሶማሌ አካባቢም ከወሩ አጋማሽ ጀምሮ ዝናብ ያገኛሉ (ካርታ 6)፡፡



ካርታ 6 እ.ኤ.አ. ከሴፕቴምበር 1 እስከ 30/2026

የሚኖረው የዝናብ መጠን ከረጅም ጊዜ አማካይ ሲነፃፀር

ካርታ 7 እ.ኤ.አ. እ.ኤ.አ. ከሴፕቴምበር 1 እስከ

30/2026 የሚኖረው የዝናብ መጠን በሚ.ሜ

2.2 እ.ኤ.አ ከሴፕቴምበር 1 እስከ 30/2026 የሚኖረው የአየር ጠባይ በግብርናው ሥራ እንቅስቃሴ ላይ ሊያሳድር የሚችለው ተፅዕኖ

በሚቀጥለው የመስከረም ወር በአብዛኛው የክረምት እርጥበት ተጠቃሚና የመኸር ሰብል አብቃይ በሆኑት የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ የሚጠበቀው የእርጥበት ለግብርናው ስራ እንቅስቃሴ አዎንታዊ ሚና ይኖረዋል፡፡ በመሆኑም ቀደም ብለው ለተዘሩና ፍሬ በማፍራት ላይ ለሚገኙ፤ እንዲሁም ዘግይተው ተዘርተው በተለያዩ የእድገት ደረጃ ላይ ላሉ ሰብሎች፤ ለፍራፍሬ ተክሎችና ለጓሮ አትክልቶች የሚያስፈልጋቸውን የእርጥበት መጠን ከማሟላት አንጻር ጠቀሜታው የጎላ ነው፡፡ በአንፃሩም የእርጥበት ሁኔታው ባለፉት የክረምት ወራት በመደበኛ ሁኔታ ደረቅ ሆነው በሰነበቱትና በጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው ወደ ሆኑት ደቡብና ደቡብ ምስራቅ የሀገራችን አካባቢዎች የሚኖረው መስፋፋት የማሳ ዝግጅት ለማድረግና የበጋ ወቅት ሰብሎችን ለመዝራት እንዲሁም ለግጦሽ ሳርና ለመጠጥ ውሃ አቅርቦት ምቹ ሁኔታን ይፈጥራል፡፡ በሌላ በኩል በአንዳንድ ስፍራዎች ላይ አልፎ አልፎ ከባድ ዝናብ ሊኖር ስለሚችል ከዚህ ጋር ተያይዞ በሰብሎች ላይ የውሃ መተኛት፤ የአረም መስፋፋት፤ በየጣልቃው ከሚኖረው

ሙቀት ጋር ተዳምሮ ፀረ ሰብል ተባይ ክስተት ሊኖር ስለሚችል አርሶ አደሮችና የሚመለከታቸው አካላት ተገቢውን ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል። በተጨማሪም ውሃ አጠር የሆኑ አካባቢዎች የሚገኘውን እርጥበት በማሰባሰብና በማከማቸት በደረቅ ሰሞናት ጥቅም ላይ ማዋል ያስፈልጋል።

2.3 እ.ኤ.አ ከሴፕቴምበር 1 እስከ 30/2026 የሚኖረው የአየር ጠባይ በውሃ ዘርፍ ላይ ሊያሳድር የሚችለው ተፅዕኖ

በመጭው የሴፕቴምበር ወር በአብዛኛው ባሮ አካባቢ፣ አሞ ጊቤ፣ ላይኛውና መካከለኛው አባይ፣ የታችኛው ተከሄ፣ ላይኛውና መካከለኛው ስምጥ ሸለቆ፣ አዋሽ እንዲሁም የላይኛው ዋቤ ሸበሌ እና በጥቂት የላይኛው ገናሌ ዳዋ ተፋሰሶች ላይ ከዝቅተኛ እስከ ከፍተኛ የሆነ የገፀ ምድር የውሃ ፍሰት እንደሚኖራቸው ይጠበቃል። ይህም ሁኔታ የገጸ-ምድር የውሃ ፍሰትን የሚያሻሽል ሲሆን፣ በተጨማሪም የከርሰ ምድር የውሃ ሃብት ከማሻሻል አንጻር አዎንታዊ አስተዋጽኦ ይኖረዋል። በሌላ በኩል በአንዳንድ ለጎርፍ ተጋላጭ በሆኑ የከተማም ሆነ ገጠራማ አካባቢዎች ላይ ቅፅበታዊ ጎርፍ፣ የወንዞች ሙላትና ሊኖረው ይችላል። ስለሆነም ለጎርፍ ተጋላጭ በሆኑ የወንዝ ዳርቻዎች፣ በረግረጋማ እንዲሁም ረባዳማ እና ተዳፋት በሆኑ አካባቢ በሚኖሩ የማህበረሰቦች ክፍሎች በህይወትና በንብረትና እንዲሁም በመሰረተ ልማት ላይ ጎዳት እንዳያደርስ አስፈላጊው የቅድመ ጥንቃቄና ቅድመ ዝግጅት ስራዎችን ማድረግ ያስፈልጋል። በተጨማሪም በአብዛኛው አፋር ደናክል፣ በኦጋዴንና በታችኛው ዋቤ ሸበሌ እንዲሁም በመካከለኛውና ታችኛው አዋሽ፣ በታችኛው ስምጥ ሸለቆ ተፋሰሶች ላይ ቀላል የሆነ የገፀ ምድር የውሃ ፍሰት እንደሚኖራቸው ይጠበቃል።

Ethiopian Meteorology Institute

