

በኢትዮጵያ የሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎርሎጂ ትንበያ፣
ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

በኢትዮጵያ የሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎርሎጂ ትንበያ፣
ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ



ከሴፕቴምበር 1-30/2026 የነበረው የአየር ጠባይግምገማ

እንዲሁም

ከኦክቶበር 1-31/2026 የሚኖረው የአየር ጠባይ ትንበያ እና

ምክረ ሃሳብ

ኦክቶበር 2026

አዲስ አበባ


በኢትዮጵያ የሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎርሎጂ ትንበያ፡

ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

1.1 እ.ኤ.አ ከሴፕቴምበር 1 እስከ 30/2026 የነበረው የአየር ሁኔታ

ባለፈው የሴፕቴምበር ወር በደቡብ ምዕራብ፣ ምዕራብ፣ ሰሜን ምዕራብ፣ ሰሜን፣ መካከለኛው ሰሜን ምስራቅ፣ ደቡብ እና ደቡብ ምስራቅ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ የተሻለ የደመና ሽፋን ነበራቸው። ከዚህ ጋር ተያይዞ በደቡብ ምዕራብ፣ ምዕራብ፣ ሰሜን ምዕራብ እና በመካከለኛው የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ በ24 ሰዓት ውስጥ ከመካከለኛ እስከ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ተመዝግቦባቸዋል። በተጨማሪም በመጨረሻዎቹ ቀናቶች ላይ በጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው በሆኑት የደቡብ እና ደቡብ ምስራቅ የሀገሪቱ አካባቢዎች ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን ያለው ዝናብ ተመዝግቧል። በአጠቃላይ በሴፕቴምበር ወር በ73 የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ በ24 ሰዓት ውስጥ ከ30 ሚ.ሜ በላይ የሆነ ከባድ መጠን ያለው የዝናብ መጠን ነበራቸው (ምስል 1) ።

በተጨማሪም በምዕራብ፣ ደቡብ ምዕራብና ሰሜን ምዕራብ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ በ24 ሰዓት ውስጥ 50-76.6 ሚ.ሜ የሚደርስ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ተመዝግቧል። ከ60 ሚ.ሜ በላይ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ከተመዘገበባቸው የሀገሪቱ አካባቢዎች መካከል አቦሞሪንጋ 62.4፣ አይራ 76.6፣ አታንጎ 60፣ ጨለንቆ 76፣ ዳሊፋጊ 63፣ ደብረማርቆስ 68.8፣ ኢጃጂ 50.5፣ ፋፕዶ 52.1፣ ገምቢ 56.9፣ ጊኒር 50.5፣ ካቼሶ 50፣ ቀብሪዳር 55.4፣ ማንኩሽ 75.4፣ ማሳ 60፣ መተማ 72.8፣ ሽራ 58.5፣ ተርጫ 53.5 ።




ምስል1: ከሴፕቴምበር 1 እስከ 30/2026 በ24 ሰዓት ውስጥ ከ60 ሚ.ሜ በላይ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ የተመዘገበባቸው ስፍራዎች

በኢትዮጵያ የሚቲዎሮሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቲዎሮሎጂ ትንበያ፡


ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

ባለፈው የሴፕቴምበር ወር የዘነበው የዝናብ መጠን ከሀገሪቱ ቦታ ሽፋን አንፃር ሲገመገም፤ ከኦሮሚያ ክልል ኢሉባቦር፤ ቡኖ በደሌ፤ ጅማ፤ ቄለም ወለጋ፤ ምዕራብ ወለጋ፤ ምስራቅ ወለጋ፤ ሆሮ ጉድሩ ወለጋ፤ ቦርና፤ ምስራቅ ቦርና፤ ጉጂ እና ምዕራብ ጉጂ፤ ባሌ እና ምስራቅ ባሌ፤ ሁሉም የሸዋ ዞኖች፤ ሸገር ከተማ፤ ከአማራ ክልል የምዕራብና መካከለኛው ጎንደር፤ ባህርዳር ዙሪያ፤ የሰሜንና ምዕራብ ጎጃም፤ አዊ፤ ደቡብ ወሎ፤ ከትግራይ ክልል የምዕራብና የሰሜን ምዕራብ ትግራይ፤ ከቤንሻንጉል ጉምዝ ካማሺ፤ መተከል፤ አሶሳ፤ ማኦ ኮሞ ልዩ ወረዳ፤ ከጋምቤላ ክልል ኢታንግ ልዩ ወረዳ፤ አኝዋክ፤ ኑዌር እና መሻርንግ ዞኖች፤ ከደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል ሸካ፤ ቤንች ሸከ፤ ከፋ፤ ኮንታ፤ ዳዉሮ ዞኖች፤ ከማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ጉራጌ፤ ምስራቅ ጉራጌ፤ ስልጤ፤ ሀዲያ፤ የም፤ ስልጤ፤ ሃላባ፤ ከምባታ ዞኖች፤ ከደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ወላይታ፤ ጋሞ፤ ጎፋ፤ ጌድዮ፤ ኮሬ፤ ባስኬቶ፤ አሌ፤ ደራሼ እና ኮንሶ ዞኖች፤ ከሶማሌ ክልል ቆራሄ፤ ነጎብ፤ አፍዴር፤ ሊበን፤ ዳዋ ላይ ከ81-350 ሚ.ሜ የሚደርስ ዝናብ ከ8-30 ቀናት ያህል ዝናብ ነበራቸው (ካርታ 1 እና 2)፡፡


ባለፈው የሴፕቴምበር ወር የዘነበው የዝናብ መጠን ከመደበኛው ጋር ሲነፃፀር፤ ከኦሮሚያ ክልል ኢሉባቦር፤ ቡኖ በደሌ፤ ቄለም ወለጋ፤ ምዕራብ ወለጋ፤ ምስራቅ ወለጋ፤ ሆሮ ጉድሩ ወለጋ፤ ቦርና፤ ምስራቅ ቦርና፤ ጉጂ እና ምዕራብ ጉጂ፤ ባሌ እና ምስራቅ ባሌ፤ ምዕራብ አርሲ፤ ሁሉም የሸዋ ዞኖች፤ ሸገር ከተማ፤ ከአማራ ክልል የምዕራብ፤ መካከለኛ፤ ደቡብ እና ሰሜን ጎንደር፤ የአዊ፤ ምዕራብ ጎጃም እና ባህርዳር ዙሪያ የሰሜን፤ የምዕራብ እና የምስራቅ ጎጃም ዞኖች፤ ከቤንሻንጉል ጉምዝ ካማሺ፤ መተከል፤ አሶሳ፤ ማኦ ኮሞ ልዩ ወረዳ፤ ከጋምቤላ ክልል ኢታንግ ልዩ ወረዳ፤ አኝዋክ፤ ኑዌር እና መሻርንግ ዞኖች፤ ከደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል ሸካ፤ ቤንች ሸከ፤ ከፋ፤ ኮንታ፤ ዳዉሮ ዞኖች፤ ከደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ጎፋ፤ ጌድዮ፤ ኮሬ፤ ባስኬቶ፤ አሌ፤ ደራሼ እና ኮንሶ ዞኖች፤ ከሶማሌ ክልል ቆራሄ፤ ነጎብ፤ አፍዴር፤ ሊበን፤ ዳዋ፤ አዲስ አበባ፤ ድሬዳዋ እና ሐረሪ በአብዛኛ መደበኛ እና ላይ ከመደበኛ በላይ የሆነ የዝናብ መጠን ተመዝግቧል (ካርታ 3)፡፡



ካርታ 1 እ.ኤ.አ ከሴፕቴምበር 1 እስከ 30/2026 ድረስ የነበረው የዝናብ መጠን በሚ.ሜ



ካርታ 2 እ.ኤ.አ ከሴፕቴምበር 1 እስከ 30/2026 ድረስ ዝናብ የዘነበባቸው ቀናት



ካርታ 3 እ.ኤ.አ ከሴፕቴምበር 1 እስከ 30/2026 የነበረው የዝናብ መጠን ከመደበኛው ጋር ሲነፃፀር

1.2 እ.ኤ.አ ከሴፕቴምበር 1 እስከ 30/2026 የነበረው የአየር ጠባይ በግብርና ሥራ እንቅስቃሴ ላይ ያሳደረው ተፅዕኖ


ባሳለፍነው የሴፕቴምበር ወር በአብዛኛው የክረምት ዝናብ ተጠቃሚና የመኸር አብቃይ አካባቢዎች ከቦታ ቦታ በመጠን ይለያይ እንጂ በስርጭት ረገድ ብዙ ቦታዎችን ያደረሰ የእርጥበት ሁኔታ ነበራቸው፡፡ ይህም ሁኔታ ቀደም ሲል ተዘርተው በተለያዩ የእድገት ደረጃና ፍሬ በመሙላት ላይ ለሚኖሩት እንደ ማሽላና በቆሎ ለመሳሰሉት የረጅም ጊዜ ሰብሎች፣ ለቋሚ ተክሎች፣ ለፍራፍሬዎችና ለጓሮ አትክልቶች የውሃ ፍላጎታቸውን ከመሟላት አንጻር ከፍተኛ ጠቀሜታ ነበረው፡፡ በተጨማሪም የክረምት ወቅታቸውን ጠብቀው ተዘርተው ፍሬ በመሙላትና በማበብ ላይ ባሉ የመካከለኛና የአጭር ጊዜ ሰብሎች የውሃ ፍላጎት መሟላት ምቹ ሁኔታን ከመፍጠሩም በላይ በሰሜን ምስራቅና በምስራቅ ለሚገኙት አርብቶ አደሮችና ከፊል አርብቶ አደሮች ለግጦሽ ሳርና ለመጠጥ ውሃ አቅርቦት ከፍተኛ አስተዋፅዖ ከማበርከቱም በላይ ሰው ሰራሽም ሆነ የተፈጥሮ ምንጮችን ከማጎልበት አንፃር ከፍተኛ ጠቀሜታ ነበረው፡፡ እንዲሁም ቀስ በቀስ በተለይም በሦስተኛው አስር ቀናት ወደ ደቡብ የሀገሪቱ ክፍሎች የተስፋፋው እርጥበት በአካባቢው ለሚካሄደው የእርሻ ስራ እንቅስቃሴ የጎላ ጠቀሜታ ከመኖሩም በላይ ለአርብቶ አደሮችና ከፊል አርብቶ አደሮች የግጦሽ ሳርና የመጠጥ ውሃ አቅርቦትን ከማሻሻል አንጻር በጎ ሚና ነበረው (ካርታ 4)፡፡

1.3 እ.ኤ.አ ከሴፕቴምበር 1 እስከ 30/2026 የነበረው የአየር ጠባይ በውሃው ዘርፍ ላይ ያሳደረው ተፅዕኖ

ባሳለፈው ወር በሁሉም የአገራችን ተፋሰሶች ላይ ከመጠነኛ እስከ ከፍተኛ የሚደርስ የገፁ-ምድር ውሃ ፍሰት የተመዘገበ ሲሆን፣ ይህም ለአገሪቱ አጠቃላይ የውሃ ሀብት ክምችት፣ ለተፋሰሶች ውሃ መጎልበትና ለውሃ አቅርቦቱ እጅግ አዎንታዊ አስተዋፅዖ እንደነበራቸው የተተነተኑ የውሃ ሚቲዎሮሎጂ መረጃዎች ያሳያሉ፡፡ በተለይም ባሮ አኩባ፣ አሞ ጊቤ፣ አባይ፣ ተከሌ፣ አዋሽ፣ ስምጥ ሸለቆ፣ ዋቤ ሸበሌ እና ገናሌ ዳዋ ተፋሰሶች ከፍተኛ የሆነ የገፁ-ምድር ውሃ ፍሰት የነበራቸው ሲሆን፣ በአፋር ደናክል እና በኦጋዴን አካባቢዎች ደግሞ ከመጠነኛ እስከ ከፍተኛ የሚደርስ የገፁ-ምድር ውሃ ፍሰት ነበራቸው፡፡ ከዚህ ጋር በተያያዘ እነዚህ የተገኙት የገፁ-ምድር ውሃ ፍሰቶች በየተፋሰሶቹ ለሚገኙ ዋና ዋና ግድቦችና ለውሃ አካላት አዎንታዊ አስተዋጽዖ ነበረው (ካርታ 5)፡፡


በኢትዮጵያ የሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎርሎጂ ትንበያ፤

ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ




ካርታ 4 እ.ኤ.አ ከሴፕቴምበር 1 እስከ 30/2026

ድረስ የነበረው የእርጥበት ሁኔታ



ካርታ 5 እ.ኤ.አ ከሴፕቴምበር 1 እስከ 30/2026

ድረስ የነበረው የእርጥበት ሁኔታ



Ethiopian Meteorology Institute



በኢትዮጵያ የሚቲዎሮሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቲዎሮሎጂ ትንበያ፡

ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

2. መግቢያ


የበጋ ወቅት ከአክቶብር እስከ ጃንዋሪ ያሉትን ወራት የሚያጠቃልል ሲሆን፤ ለደቡብና ደቡብ ምሥራቅ የሀገሪቱ አካባቢዎች ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው ነው። በመሆኑም የበጋ ወቅት ከዓመታዊ የዝናብ መጠኑ እስከ 45% የሚደረሰውን የሚሸፍን ሲሆን ከበልግ ቀጥሎ ለደቡብ ኢጋማሽ አካባቢዎች የተሻለ ዝናብ የሚኖርበት ወቅት ነው። በወቅቱ ከሚኖረው የዝናብ መጠን ከፍተኛውን ድርሻ የሚይዘው በአክቶብር እና በመጀመሪያዎቹ በኖቬምበር አስር ቀናት የሚጥለው ዝናብ ነው። በዚህ ወቅት ከፍተኛ መጠን ያለው የዝናብ መጠን የሚኖረው በደቡብ እና በደቡብ ምስራቅ አካባቢዎች ላይ ነው። በመደበኛ ሁኔታ በአክቶብር የመጀመሪያዉ አሥር ቀናት የክረምት የዝናብ ድንበር (ITCZ) ወደ ደቡብ አቅጣጫ ከሚያደርገው እንቅስቃሴ ጋር ተያይዞ ዝናብ ሰጭ የሚቲዎሮሎጂ ገጽታዎች በደቡብ የሀገሪቱ ኢጋማሽ ላይ እየተጠናከሩ ይሄዳሉ። ስለሆነም የደቡብ እና የደቡብ

2.1 እ.ኤ.አ ከአክቶብር 1 እስከ 31/2026 የሚኖረው የአየር ጠባይ ትንበያ


በመደበኛ ሁኔታ የክረምት ድንበር ወደ ደቡብ አቅጣጫ ከሚያደርገው እንቅስቃሴ ጋር ተያይዞ ዝናብ ሰጭ የሚቲዎሮሎጂ ገጽታዎች በደቡብ የሀገሪቱ ኢጋማሽ ላይ እየተጠናከሩ ይሄዳሉ። ስለሆነም የደቡብ እና የደቡብ ምሥራቅ ኢትዮጵያ በተጠናከረ ሁኔታ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸውን የሚያገኙ ሲሆን፤ በተመሳሳይ ሁኔታም በምዕራብ እና በደቡብ ምዕራብ ዝናቡ የሀገሪቱ ስፍራዎች ላይ ቀጣይነት ይኖረዋል። በተጨማሪም በአብዛኛው የበጋ ወቅት እንደሚስተዋለው የሰሜን ኢጋማሽ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ የበጋው ደረቅ፣ ፀሐያማ እና ነፋሻማ የአየር ጠባይ ጎልቶ ከመታየቱ አንጻር የሌሊቱና የማለዳው ቅዝቃዜ መጨመር ያሳያል።

በመጨረሻ የአክቶብር ወር ዝናብ ሰጭ የሚቲዎሮሎጂ ገጽታዎች በምዕራብና በደቡብ ምዕራብ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ የተሻለ ገጽታ እንደሚኖራቸውና በሂደትም በጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው የሁኑት የደቡብና የደቡብ ምስራቅ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ የተሻለ የእርጥበት ሁኔታ ያገኛሉ (ካርታ 13)። በመሆኑም በምዕራብ፣ ደቡብ ምዕራብ እንዲሁም በጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው በሆኑት የደቡብ አሮሚያ ዞኖች፣ የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ዞኖች፣ የሶማሌ ደቡባብዊ ዞኖች ላይ መደበኛና ከመደበኛ በላይ የሆነ የዝናብ መጠን እንደሚያገኙ የትንበያ መረጃዎች ያሳያሉ (ካርታ 14) ። በተጨማሪም በጸሀይ ሀይል በመታገዝ ከሚጠናከሩ የአየር ሁኔታ ክስተቶች በመነሳት የምዕራብ፣ በደቡብ ምዕራብ በደቡብ እና ደቡብ ምስራቅ አካባቢዎች ላይ ከመካከለኛ እስከ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ይኖራል (ካርታ 6 እና 7) ።

Total Rainfall (mm) for 1-31, October 2026



ካርታ 6 እ.ኤ.አ. እ.ኤ.አ. ከአክቶብር 1 እስከ 31/2026 የሚኖረው የዝናብ መጠን በሚያሳይ



40 50 60 70 80 BN (%) 40 45 50 NN (%) 40 50 60 70 80 AN (%)

ካርታ 7እ.ኤ.አ. ከአክቶብር 1 እስከ 31/2026 የሚኖረው የዝናብ መጠን ከረጅም ጊዜ አማካይ ሲነፃፀር

2.2 እ.ኤ.አ ከኦክቶበር 1 እስከ 31/2026 የሚኖረው የአየር ጠባይ

በግብርናው ሥራ እንቅስቃሴ ላይ ሊያሳድር የሚችለው ተፅዕኖ

በሚቀጥለው የኦክቶበር ወር በምዕራብና በደቡብ ምዕራብ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ ቀጣይነት ያለውና የተሻለ እርጥበት ይኖራቸዋል፡፡ ይህም ሁኔታ ቀደም ብለው ለተዘፋና አልፎ አልፎ ፍሬ በመሙላት ላይ ለሚገኙ፣ በተለያዩ ምክንያት ዘግይተው ለተዘፋና በተለያዩ የእድገት ደረጃ ላይ ለሚገኙ ለመኸር ሰብሎችም ሆነ ለቋሚ ተክሎች የውሃ ፍላጎት መሟላት፣ በተጨማሪም በክረምት ወቅት መጨረሻ በአፈር ውስጥ በተከማቸው እርጥበት በመታገዝ በደጋማው አካባቢ ለሚዘፋ የጥራጥሬ ሰብሎች የሚያስፈልጋቸውን የውሃ አቅርቦት መሟላት የጎላ አስተዋፅኦ ይኖረዋል፡፡ በሂደትም በጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው በሆኑት በደቡብና ደቡብ ምስራቅ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ እየተስፋፋ የሚሄደው እርጥበት ወቅታዊ ዝናብ ማግኘት በሚጀምሩትና ሰብል አምራች በሆኑት በደቡብና ደቡብ ምስራቅ የአገሪቱ አካባቢዎች ላይ የማሳ ዝግጅት ለማድረግና ዘር ለመዝራት ምቹ ሁኔታ እንደሚፈጥር የሚጠበቅ ሲሆን፣ በስፋት በአካባቢው ለሚኖሩት አርብቶ አደሮችና ከፊል አርብቶ አደሮች ለግጦሽ ሣርና ለመጠጥ ውሃ አቅርቦት ጥሩ አስተዋጽኦ እንደሚኖረው ነው፡፡

2.3 እ.ኤ.አ ከኦክቶበር 1 እስከ 31/2026 የሚኖረው የአየር ጠባይ በውሃ

ዘርፍ ላይ ሊያሳድር የሚችለው ተፅዕኖ

በመጨረሻ የኦክቶበር ወር በሀገራችን ተፋሰሶች ላይ የሚኖረው የገፁ-ምድር የውሃ ፍሰት በባሮ አኮቦ፣ በአሞ ጊቤ፣ በስምጥ ሸለቆ፣ ሠበላይኛው የዋቤ ሸበሌ እንዲሁም ገናሌ ዳዋ ተፋሰሶች ላይ ከመካከለኛ እስከ ከፍተኛ የሆነ የገፁ-ምድር የውሃ ፍሰት ይኖራቸዋል፡፡ ይህም የውሃ መጠን መጨመር በእጅጉ የሚያጎለብት ይሆናል፡፡ ይህ አዎንታዊ ሁኔታ በዋናነት የበጋ ወቅት የውሃ ተጠቃሚ ለሆኑት የሀገራችን ተፋሰሶች፣ እና የልማት ዘርፎች የተሻለ የሆነ የገፁ-ምድር የውኃ ሀብት የሚገኝበት የተሻለ ወር ይሆናል፡፡ ይህም ለእንስሳት መጠጥ፣ ለኃይል ማመንጫዎች እና ለተለያዩ አጠቃላይ የውሃ ፍጆታዎች ከፍተኛ አስተዋፅኦ ይኖረዋል፡፡ በተጨማሪም በአብዛኛው የአፋር ደናክል በመካከለኛው እና በታችኛው የአዋሽ ተፋሰስ እንዲሁም ስምጥ ሸለቆ ተፋሰስ ላይ መካከለኛ መጠን ያለው የገፁ-ምድር የውሃ ፍሰት የሚመዘገብ ይሆናል፡፡