

በኢትዮጵያ የሚቴዎሮሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎሮሎጂ ትንበያ፣
ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

በኢትዮጵያ የሚቴዎሮሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎሮሎጂ ትንበያ፣
ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ



ከኦክቶበር 1-10/2026 የነበረው የአየር ሁኔታ እና ከኦክቶበር
11-20/2026 እና ከኦክቶበር 21-31/2026
የሚኖረው የአየር ሁኔታ ትንበያ እና ምክረ ሃሳብ

ኦክቶበር 2026
አዲስ አበባ


በኢትዮጵያ የሚቲዎሮሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቲዎሮሎጂ ትንበያ፣

ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

1. እ.ኤ.አ ከኦክቶበር 1 እስከ 10/2026 የነበረው የአየር ሁኔታ

ባለፉት አስር ቀናት በደቡብ ምዕራብ፣ በደቡብ እና ደቡብ ምስራቅ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ የተሻለ የደመና ሽፋን ነበራቸዋል፡፡ ከዚህ ጋር ተያይዞ በደቡብ ምዕራብ፣ በደቡብ እና ደቡብ ምስራቅ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ በ24 ሰዓት ውስጥ ከመካከለኛ እስከ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ተመዝግቦባቸዋል፡፡ በአጠቃላይ ባለፉት አስር ቀናት በ31 የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ በ24 ሰዓት ውስጥ ከ20 ሚ.ሜ በላይ የሆነ ከመካከለኛ እስከ ከባድ መጠን ያለው የዝናብ መጠን ነበራቸዋል (ምስል 1) ፡፡

በተጨማሪም በደቡብ ምዕራብና ደቡብ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ በ24 ሰዓት ውስጥ 30.1-119 ሚ.ሜ የሚደርስ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ተመዝግቧል፡፡ ከ30 ሚ.ሜ በላይ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ከተመዘገበባቸው የሀገሪቱ አካባቢዎች መንደር11 119፣ ድሬ ሸከናሁሲን 85.5፣ ጊኒር 54፣ ጎዴ 40.4፣ እርምጭ 39.2፣ ቅዳሜ ገበያ 38.6፣ አርባምንጭ 32.2፣ ማጂ 31.2፣ ዲመካ 31፣ ዶሎ አዶ 30.2፣ ዶሎመና 30.1 ይገኙበታል፡፡



ምስል1: ከኦክቶበር 1 እስከ 10/2026 በ24 ሰዓት ውስጥ ከ30 ሚ.ሜ በላይ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ የተመዘገበባቸው ስፍራዎች


በኢትዮጵያ የሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎርሎጂ ትንበያ፡

ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

ባለፉት አስር ቀናት የዘነበዉ የዝናብ መጠን ከሀገሪቱ ቦታ ሽፋን አንፃር ሲገመገም፤ ከኦሮሚያ ክልል ኢሉባቦር፤ ቡኖ በደሌ፤ ቄለም ወለጋ፤ ቦርና፤ ምስራቅ ቦርና፤ ጉጂ እና ምዕራብ ጉጂ፤ ባሌ እና ምስራቅ ባሌ፤ጥቂት የአርሲና ምዕራብ አርሲ ዞኖች፤ ከአማራ ክልል የሰሜንና መካከለኛዉ ጎንደር፤ ባህርዳር ዙሪያ፤ አዊ፤ ከቤንሻንጉል ጉምዝ አሶሳ፤ ማኦ ኮሞ ልዩ ወረዳ፤ ከጋምቤላ ክልል ኢታንግ ልዩ ወረዳ፤ አኝዋክ፤ ኑዌር እና መሻርንግ ዞኖች፤ ከደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል ሸካ፤ ቤንች ሸከ፤ ከፋ፤ ኮንታ፤ ዳዉሮ ዞኖች፤ ከደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ወላይታ፤ ጋሞ፤ ጎፋ፤ ጌድዮ፤ ኮሬ፤ ባስኬቶ፤ አሌ፤ ደራሼ እና ኮንሶ ዞኖች፤ ከሶማሌ ክልል ፋፈን፤ ጃረር፤ ኤረር፤ዶሎ፤ ቆራሄ፤ ነጎብ፤ አፍዴር፤ ሊበን፤ ዳዋ ላይ ከ15-120 ሚ.ሜ የሚደርስ ዝናብ ከ3-10 ቀናት ያህል ዝናብ ነበራቸዉ (ካርታ 1 እና 2)፡፡


ባለፉት አስር ቀናት የዘነበዉ የዝናብ መጠን ከመደበኛዉ ጋር ሲነፃፀር፤ ከኦሮሚያ ክልል ቦርና፤ ምስራቅ ቦርና፤ ጉጂ እና ምዕራብ ጉጂ፤ ባሌ እና ምስራቅ ባሌ፤ የአርሲና ዞኖች፤ ከአማራ ክልል የሰሜንና መካከለኛዉ ጎንደር፤ ከጋምቤላ ክልል ኢታንግ ልዩ ወረዳ፤ አኝዋክ፤ ኑዌር እና መሻርንግ ዞኖች፤ ከደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል ሸካ፤ ቤንች ሸከ፤ ከፋ፤ ኮንታ፤ ዳዉሮ ዞኖች፤ ከደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ጋሞ፤ ጎፋ፤ ጌድዮ፤ ኮሬ፤ ባስኬቶ፤ አሌ፤ ደራሼ እና ኮንሶ ዞኖች፤ ከሶማሌ ክልል ፋፈን፤ ጃረር፤ ዶሎ፤ ቆራሄ፤ ነጎብ፤ አፍዴር፤ ሊበን፤ ዳዋ በአብዛኛ መደበኛ እና ላይ ከመደበኛ በላይ የሆነ የዝናብ መጠን ተመዝግቧል (ካርታ 3)፡፡

Total amount of Rainfall (mm) from October 1-10/2026




ካርታ 1 እ.ኤ.አ ከኦክቶበር 1 እስከ 10/2026 ድረስ የነበረው የዝናብ መጠን በሚ.ሜ

Number of Rainy Days (NRD) from October 1-10/2026



ካርታ 2 እ.ኤ.አ ከኦክቶበር 1 እስከ 10/2026 ድረስ ዝናብ የዘነበባቸዉ ቀናት

Percent of Normal Rainfall (%) from October 1-10/2026



ካርታ 3 እ.ኤ.አ ከኦክቶበር 1 እስከ 10/2026 የነበረዉ የዝናብ መጠን ከመደበኛዉ ጋር

1.2 እ.ኤ.አ ከኦክቶበር 1 እስከ 10/2026 የአየር ሁኔታ በግብርና ሥራ እንቅስቃሴ ላይ ያሳደረው ተፅዕኖ


ባለፉት አስር ቀናት በደቡብ ምዕራብ፣ በደቡብ ፣ በደቡብ ምስራቅ፣ በምዕራብ አጋማሽ እና በሰሜን መዕራብ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ የተሻለ እርጥበት ነበራቸው፡፡ ይህም ሁኔታ የአፈር ውስጥ እርጥበትን ከማሻሻል ጋር ተያይዞ ቀደም ሲል ተዘርተው በማበብ እና ፍሬ በመሙላት ላይ ለሚኖሩ እንደ ማሽላና በቆሎ ላሉት የረጅም ጊዜ ሰብሎችም ሆነ ለሌሎች የመካከለኛ እና የአጭር ጊዜ ሰብሎች፣ ለቋሚ ተክሎች፣ ለፍራፍሬዎችና ለጓሮ አትክልቶች የውሃ ፍላጎታቸውን ከማሟላት አንጻር ከፍተኛ ጠቀሜታ ነበረው፡፡ እንዲሁም በወቅቱ መጨረሻ በአፈር ውስጥ በተከማቸው እርጥበት በመታገዝ ለሚዘሩ የጥራጥሬ ሰብሎች የውሃ ፍላጎት መሟላት ከፍተኛ ጠቀሜታ ነበረው፡፡ በተለይም በጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው በሆኑት በደቡብ አጋማሽ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ የተገኘው እርጥበት ጥምር ግብርና ለሚያከናውኑ አካባቢዎች የማሳዝግጅት ለማከናወንም ሆነ ዘር ለመዝራት ምቹ ሁኔታ የፈጠረ ነበረ፡፡ እንዲሁም በደቡብ እና በደቡብ ምስራቅ ቆላማው አካባቢ ለሚኖሩ አርብቶ አደሮችና ከፊል አርብቶ አደሮች በቂ የግጦሽ ሣርና የመጠጥ ውሀ አቅርቦት እንዲኖር ከማስቻል አንጻር አዎንታዊ ሚና ነበረው (ካርታ 4)፡፡

1.3 እ.ኤ.አ ከኦክቶበር 1 እስከ 10/2026 የአየር ሁኔታ በውሃው ዘርፍ ላይ ያሳደረው ተፅዕኖ

ባሳለፍናቸው የኦክቶበር የመጀመርያው አስር ቀናት በአብዛኛው ዋቤ ሸበሌ፣ አጋዴን ገናሌ ዳዋ፣ መካከለኛና ታችኛው አሞ ጊቤ፣ ስምጥ ሸለቆ፣ መካከለኛ ተከቤ፣ እንዲሁም በጥቂት መካከለኛና ታችኛው አባይ ከመጠነኛ እስከ ከፍተኛ የገፀ ምድር የውሃ ፍሰት ነበራቸው፡፡ በተጨማሪም በታችኛው አሞ ጊቤ፣ ስምጥ ሸለቆና ገናሌዳዋ ተፋሰሶች ደግሞ በጣም ከፍተኛ የሆነ የገፀ ምድር ውኃ ነበራቸው፡፡ በመሆኑም ለገፀ ምድር ውሃ ሀብት ገብዓት ጥሩ አስተዋፅኦ እንደነበረው የተተነተኑ የሀይድሮ ሚቲዎሮሎጂ መረጃዎች ያመላክታሉ፡፡ ይህ ሁኔታ በተለይም ዋነኛ ወቅታቸው ለሆኑት ለአብዛኛው ዋቤ ሸበሌ፣ ገናሌ ዳዋ፣ አጋዴን ለመካከለኛና ታችኛው አሞ ጊቤ እና ስምጥ ሸለቆ ጠቀሜታው እጅግ የጎላ ነበር (ካርታ 5)፡፡


በኢትዮጵያ የሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎርሎጂ ትንበያ፣

ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ



ካርታ 4 እ.ኤ.አ ከኦክቶበር 1 እስከ 10/2026

ድረስ የነበረው የእርጥበት ሁኔታ



ካርታ 5 እ.ኤ.አ ከኦክቶበር 1 እስከ 10/2026

ድረስ የነበረው የእርጥበት ሁኔታ



Ethiopian Meteorology Institute



በኢትዮጵያ የሚቲዎሮሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቲዎሮሎጂ ትንበያ፡

ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

2. መግቢያ


የቦጋ ወቅት ከአክቶብር እስከ ጃንዋሪ ያሉትን ወራት የሚያካትት ሲሆን፤ ለደቡብና ደቡብ ምሥራቅ የሀገሪቱ አካባቢዎች ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው ነው። የቦጋ ወቅት ከዓመታዊ የዝናብ መጠኑ እስከ 45% የሚደረሰውን የሚሸፍን ሲሆን ከበልግ ቀጥሎ የተሻለ ዝናብ የሚኖርበት ወቅት ነው። በወቅቱ ከሚኖረው የዝናብ መጠን ከፍተኛውን ድርሻ የሚይዘው በአክቶብር እና በመጀመሪያዎቹ በኖቬምበር አስር ቀናት የሚጥለው ዝናብ ነው። በዚህ ወቅት ከፍተኛ መጠን ያለው የዝናብ መጠን የሚኖረው በደቡብ እና በደቡብ ምስራቅ አካባቢዎች ላይ ነው። በመደበኛ ሁኔታ በአክቶብር የሁለተኛው አሥር ቀናት የክረምት ድንበር (ITCZ) ወደ ደቡብ አቅጣጫ ከሚያደርገው እንቅስቃሴ ጋር ተያይዞ ዝናብ ሰጭ የሚቲዎሮሎጂ ገጽታዎች በደቡብ የሀገሪቱ አጋማሽ ላይ እየተጠናከሩ ይሄዳሉ። ስለሆነም የደቡብ እና የደቡብ ምሥራቅ ኢትዮጵያ በተጠናከረ ሁኔታ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸውን ያገኛሉ።

2.1 እ.ኤ.አ ከአክቶብር 11 እስከ 20/2026 የሚኖረው የአየር ሁኔታ ትንበያ

በመጨረሻ የአክቶብር ሁለተኛው አሥር ቀናት አሁን ከሚታዩትና በቀጣይነትም ከተተነበዩት የትንበያ መረጃዎች እንደሚያሳዩት ዝናብ ሰጭ የአየር ሁኔታ ክስተቶች በደቡብ፣ ደቡብ ምስራቅ፣ ደቡብ ምዕራብና በምዕራብ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ የተሻለ ገጽታ ይኖራቸዋል። በመሆኑም ቦጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው በሆኑት የጉጂ፣ ምስራቅ ጉጂ፣ ቦረና፣ ምስራቅ ቦረና ዞኖች፣ የሲዳማ ክልል ዞኖች፣ የሶማሌ ክልል ደቡባዊ ዞኖች፣ የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ዞኖች ላይ ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን ያለው ዝናብ እንደሚኖራቸው አሃዛዊ የትንበያ መረጃዎች ይጠቁማሉ (ካርታ 6 እና 7)።


በሌላ በኩል ቀደም ብሎ የክረምት ወቅት ዝናብ እያገኙ የነበሩት የምዕራብ እና የደቡብ ምዕራብ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ ቀጣይነት ይኖረዋል። በተጨማሪም በፀኑህ ሀይል ታግዞ ከሚጠናከሩ የደመና ክምችቶች ላይ በመነሳት በደቡብ ምዕራብ፣ ደቡብ እና ደቡብ ምስራቅ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ አልፎ አልፎ በሚኖሩት ቀናት በ24 ሰዓት ውስጥ ከመካከለኛ እስከ ከባድ መጠን (ከ11 እስከ 30 ሚ.ሜ) መጠን ያለው ዝናብ ይኖረቸዋል (ካርታ 6 እና 7) ።

Rainfall (mm) forecast for 11-21 Oct 2026



ካርታ 6 እ.ኤ.አ ከአክቶብር 11-20/2026፣

የሚኖረው የዝናብ መጠን በሚ.ሜ
Exceptional Rainfall for 11-21 Oct 2026



ካርታ 7 እ.ኤ.አ. ከአክቶብር 11-20, 2026

የሚኖረው ከፍተኛ የዝናብ መጠን

ሠንጠረዥ 1፡ በሚቀጥሉት አስር ቀናት ዝናብ የሚያገኙ አካባቢዎችና በ24 ሰዓት ውስጥ የሚኖረው የዝናብ መጠን

በኢትዮጵያ የሚቲዎሮሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቲዎሮሎጂ ትንበያ፡

ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ


ክልል	ዞን	በ 24 ሰዓት ውስጥ የሚኖረው የዝናቡ መጠን
አሮሚያ	ቄለም ወለጋ፣ ምስራቅ ወለጋ፣ ምዕራብ ወለጋ፣ ሆሮ ጉድሩ ወለጋ፣ ኢሉባቦር፣ ቡኖ በደሌ፣ ጅማ ዞኖች	ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን (ከ1-29 ሚ.ሜ)
	ምዕራብ አርሲ፣ አርሲ፣ ባሌ፣ ምዕራብ ጉጂ፣ ጉጂ፣ ምስራቅ ባሌ፣ ባሌ፣ ምስራቅ እና ምዕራብ ሐረርጌ፣ ቦረና፣ ምስራቅ ቦረና ዞኖች አብዛኞቹ የሸዋ ዞኖች	ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን (ከ1-29 ሚ.ሜ)
አማራ	የምዕራብ፣ መካከለኛ፣ ደቡብ እና ሰሜን ጎንደር፣ የአዊ፣ ምዕራብ ጎጃም እና ባህርዳር ዙሪያ የሰሜን፣ የምዕራብ እና የምስራቅ ጎጃም ዞኖች	ቀላል መጠን (ከ1-11 ሚ.ሜ)
ጋምቤላ	ኢታንግ ልዩ ወረዳ፣ አኝዋክ፣ የኑዌር እና መሻገንግ ዞኖች	ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን (ከ1-29 ሚ.ሜ)
ቤንሻንጉል ጉምዝ	ካማሺ፣ መተከል እና ማኦ ኮሞ ዞኖች	ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን (ከ1-29 ሚ.ሜ)
ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ	ከፋ፣ ኮንታ፣ ዳውሮ፣ ቤንች ሸኮ፣ ሸካ እና ምዕራብ አሞ ዞኖች	ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን (ከ1-29 ሚ.ሜ)
ደቡብ ኢትዮጵያ	ወላይታ፣ ጋሞ፣ ጎፋ፣ ጌድዮ፣ ኮሬ፣ ባስኬቶ፣ አሌ፣ ደራሼ እና ኮንሶ ዞኖች	ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን (ከ1-29 ሚ.ሜ)
ሶማሌ	ፋፈን፣ ኤረር፣ ጃረር፣ ነጎብ፣ ዶሎ፣ ቆራሂ፣ ሸበሌ፣ አፍዴር፣ ሊበን እና ዳዋ ዞኖች	ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን (ከ1-29 ሚ.ሜ)
ሲዳማ ክልል	ሁሉም የክልሉ ዞኖች	ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን (ከ1-29 ሚ.ሜ)
ማዕከላዊ ኢትዮጵያ	ጉራጌ፣ ምስራቅ ጉራጌ ደቡባዊ ስፍራዎች፣ ስልጤ፣ ሀዲያ፣ ከምባታ፣ ሀላባ፣ የም፣ ጠምባሮ ልዩ ወረዳ፣ ቀቤና ልዩ ወረዳ፣ማረቆ ልዩ ወረዳ	ቀላል መጠን (ከ1-11 ሚ.ሜ)
	አዲስ አበባ፣ ድሬዳዋ እና ሐረሪ	ቀላል መጠን (ከ1-11 ሚ.ሜ)
ትግራይ	የምዕራብ እና የሰሜን ምዕራብ ዞኖች	ቀላል መጠን (ከ1-11 ሚ.ሜ)
አፋር	በጥቂት የክልሉ ዞኖች	ቀላል መጠን (ከ1-11 ሚ.ሜ)

በኢትዮጵያ የሚቲዎሮሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቲዎሮሎጂ ትንበያ፤

ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

2.2 እ.ኤ.አ ከኦክቶበር 21 እስከ 31/2025 የሚኖረው የአየር ሁኔታ አዝማሚያ

በመጨረሻ የኦክቶበር ሶስተኛው አሥራ አንድ ቀናት አሁን ከሚታዩትና በቀጣይነትም የተተነበዩት የትንበያ መረጃዎች እንደሚያሳዩት ዝናብ ሰጭ የአየር ሁኔታ ክስተቶች በደቡብ፣ ደቡብ ምስራቅ፣ ምስራቅ፣ ደቡብ ምዕራብና ምዕራብ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ የተሻለ ገጽታ ይኖራቸዋል። በመሆኑም በጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው በሆኑት የጉጂ፣ ምዕራብ ጉጂ፣ ቦረና እና ምስራቅ ቦረና ዞኖች፣ የሲዳማ ክልል ዞኖች፣ የሶማሌ ክልል ደቡባዊ ዞኖች እና የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ዞኖች ላይ ከሚጠናከሩት የሚቲዎሮሎጂ ገጽታዎች ላይ በመነሳት ከቀላል እስከ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ይኖራቸዋል። በተጨማሪም ቀደም ብሎ የክረምት ወቅትን ዝናብ እያገኙ በነበሩት በምዕራብ፣ በደቡብ ምዕራብ እንዲሁም በምስራቅ ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን ያለው ዝናብ እንደሚኖራቸው አሃዛዊ የትንበያ መረጃዎች ይጠቁማሉ (ካርታ 8)



ካርታ 8 እ.ኤ.አ ከኦክቶበር 21-31/2026, የሚኖረው የዝናብ መጠን በሚ.ሜ

2.3 እ.ኤ.አ ከኦክቶበር 11 እስከ 2/2025 የሚኖረው የአየር ሁኔታ በግብርናው

ሥራ እንቅስቃሴ ላይ ሊያሳድር የሚችለው ተፅዕኖ

በሚቀጥሉት የኦክቶበር ሁለተኛው አስር ቀናት በደቡብ፣ ደቡብ ምስራቅ፣ ደቡብ ምዕራብና በምዕራብ የሀገራችን አካባቢዎች በብዙ ቦታዎቻቸው ላይ የተሻለ የአፈር ውስጥ እርጥበት እንደሚኖር ይጠበቃል። እንዲሁም በጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው በሆኑት የጉጂ፣ ምዕራቅ ጉጂ፣ ቦረና፣ ምስራቅ ቦረና፣ የሲዳማ ክልል ዞኖች፣ የሶማሌ ክልል ደቡባዊ ዞኖች፣ ደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ዞኖች ላይ ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን ያለው የአፈር ውስጥ እርጥበት ያገኛሉ። በመሆኑም የሚኖሩ መልካም አጋጣሚዎችን በአግባቡ ለመጠቀምና አሉታዊ ተጽዕኖዎችን ለመቀነስ የሚያስችል ቦታ ተኮር የግብርና ሚቲዎሮሎጂ ምክረ ሀሳብ ከወዲሁ ተግባራዊ እንዲያደርጉ ከታች የቀረቡትን ዝርዝር ተግባራት ማከናወን ያስፈልጋል (ሠንጠረዥ 2)።

በኢትዮጵያ የሜቴዎሮሎጂ ኢንስቲትዩት የሜቴዎሮሎጂ ትንበያ፤

ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

2.4 እ.አ.አ ከኦክቶበር 11 እስከ 20/2025 የሚኖረው የአየር ሁኔታ በውሀ ዘርፍ

ላይ ሊያሳድር የሚችለው ተፅዕኖ

በሚቀጥሉት ቀናት የቢጋ ተጠቃሚ የሆኑ ተፋሰሶች ላይ ከመካከለኛ እስከ ከፍተኛ መጠን የሚደርስ የገፁ-ምድር ውሃ ፍሰት ይኖራቸዋል። በመሆኑም የሚመለከታቸው የዘርፉ አካላት የሚኖሩ መልካም አጋጣሚዎችን በአግባቡ ለመጠቀምና ተያያዥ ስጋቶችን ለመቀነስ የሚከተሉትን ተፋሰስ-ተኮር የውሃ-ሜቴዎሮሎጂ ምክረ-ሀሳቦች ማከናወን ያስፈልጋል (ሠንጠረዥ 3)፡፡



በኢትዮጵያ የሚታወቁት አንስቲትዩት የሚታወቁት ትንበያ፤

ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ



ሠንጠረዥ 2፡ በሚቀጥሉት አስር ቀናት የሚኖረው የእርጥበት ሁኔታ በግብርናው እንቅስቃሴ ላይ

የክረምት እርጥበት ተጠቃሚና የመኻር አምራች ዞኖች			
ከቀላል እስከ ከመካከለኛ መጠን ያለው እርጥበት የሚያገኙ ዞኖች	አዎንታዊ ተጽዕኖ	አሉታዊ ተጽዕኖ	የተሰጠ ምክረ ሃሳብ
ቄለም ወለጋ፣ ምዕራብ ወለጋ፣ ሆሮ ጉድሩ ወለጋ፣ ምስራቅ ወለጋ፣ ኢሉባቦር፣ ቡኖ በደሌ፣ ጅማ፣ ምዕራብ አርሲ፣ አርሲ፣ ባሌ፣ ምዕራብ ጉጂ፣ ጉጂ፣ ምስራቅ እና ምዕራብ ሐረርጌ፣ የምዕራብ፣ መካከለኛ፣ ደቡብ እና ሰሜን ጎንደር፣ አዊ፣ ምዕራብ ጎጃም ፣ ባህርዳር ዙሪያ ፣ ሰሜን፣ ምዕራብ እና የምስራቅ ጎጃም ፣ ኢታንግ ልዩ ወረዳ፣ አኝዋክ ፣ ኑዌር፣ መኻንግ ፣ ካማሺ፣ መተከል ፣ ማኦ ኮሞ ፣ ከፋ፣ ኮንታ፣ ዳውሮ፣ ቤንች ሸኮ፣ ሸካ ፣ ምዕራብ ኦሞ ፣ጉራጌ፣ ምስራቅ ጉራጌ ፣ ስልጤ፣ ሀዲያ፣ ከምባታ፣ ሀላባ፣ የም፣ ጠምባሮ ልዩ ወረዳ፣ ቀቤና ልዩ ወረዳ፣ማረቆ ልዩ ወረዳ፣ አዲስ አበባ፣ ድሬዳዋ ፣ ሐረሪ፣ የምዕራብ እና የሰሜን ምዕራብ ትግራይ ፣ ወላይታ፣ ጋሞ፣ ጎፋ፣ ጌድዮ፣ ኮሬ፣ ባስኬቶ፣ አሌ፣ ሁሉም ሲዳማ የክልሉ ዞኖች	➢ የአፈር ውስጥ እርጥበት መኖር እንደ ሽንብራና ጓያ የመሳሰሉ የጥራጥሬ ሰብሎችን ለመዝራት ➢ ለረጅምና መካከለኛ ጊዜ ሰብሎች ፍሬ ለማፍራት ➢ ዘግይተው ተዘርተው በተለያየ የዕድገት ደረጃ ላይ ላሉ ሰብሎች እድገት ➢ ለእንስሳት መኖርና የመጠጥ ውሃ አቅርቦት መሻሻል ➢ የተፈጥሮና ሰው ሰራሽ የውሃ ማጠራቀሚያዎችን ለማጎልበት ➢ ለቋሚ ተክሎች እና ለግጦሽ ሳር ዕድገት ➢ ለአረንጓዴ እፅዋት ልምላሜ	➢ በአንዳንድ ተዳፋታማ በሆኑ አካባቢዎች የውኃ በሰብሎች ላይ መተኛት ➢ የአረም መከሰት ➢ እንደ ዋግ የመሳሰሉ የሰብል በሽታና ተባይ መከሰት	➢ የሰብል በሽታንና አረምን አስቀድሞ መከላከል፤ ➢ እርጥበት አጠር አካባቢዎች የዝናብ ውሃን ማሰባሰብና ማጠራቀም ➢ አርሶ አደሮች የማሳ ጉብኝት በየጊዜው ማድረግ ➢ የድጋሜ አረምን ማረም፣ ፀረ-አረምና ፀረ-ተባይ ኬሚካሎችን ከግብርና ባለሙያ ጋር በመመካከር መተግበር ➢ እንደ ሽንብራና ጓያ የመሳሰሉ የጥራጥሬ ሰብሎችን በጊዜ መዝራት



በጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው የሆኑ ዞኖች

ቀላል መጠን ያለው እርጥበት የሚያገኙ ዞኖች	አዎንታዊ ተጽዕኖ	አሉታዊ ተጽዕኖ	የተሰጠ ምክረ ሃሳብ
ቁለም ወለጋ፣ ምዕራብ ወለጋ፣ ሆሮ ጉድሩ ወለጋ፣ ምስራቅ ወለጋ፣ ኢሉባቦር፣ ቡኖ በደሌ፣ ጅማ፣ ምዕራብ አርሲ፣ አርሲ፣ ባሌ፣ ምዕራብ ጉጂ፣ ጉጂ፣ ምስራቅ እና ምዕራብ ሐረርጌ፣ የምዕራብ፣ መካከለኛ፣ ደቡብ እና ሰሜን ጎንደር፣ አዊ፣ ምዕራብ ጎጃም ፣ ባህርዳር ዙሪያ ፣ ሰሜን፣ ምዕራብ እና የምስራቅ ጎጃም ፣ ኢታንግ ልዩ ወረዳ፣ አኝዋክ ፣ ኑዌር፣ መሻሮንግ ፣ ካማሺ፣ መተከል ፣ ማኦ ኮሞ ፣ ከፋ፣ ኮንታ፣ ዳውሮ፣ ቤንች ሸኮ፣ ሸካ ፣ ምዕራብ ኦሞ ፣ጉራጌ፣ ምስራቅ ጉራጌ ፣ ስልጤ፣ ሀዲያ፣ ከምባታ፣ ሀላባ፣ የም፣ ጠምባሮ ልዩ ወረዳ፣ ቀቤና ልዩ ወረዳ፣ማረቆ ልዩ ወረዳ፣ አዲስ አበባ፣ ድሬዳዋ ፣ ሐረሪ፣ የምዕራብ እና የሰሜን ምዕራብ ትግራይ ፣ ወላይታ፣ ጋሞ፣ ጎፋ፣ ጌድዮ፣ ኮሬ፣ ባስኬቶ፣ አሌ፣ ሁሉም ሲዳማ የክልሉ ዞኖች	➢ የአፈር ውስጥ እርጥበት መኖር እንደ ሽንብራና ጓያ የመሳሰሉ የጥራጥሬ ሰብሎችን ለመዝራት ➢ ለረጅምና መካከለኛ ጊዜ ሰብሎች ፍሬ ለማፍራት ➢ ዘግይተው ተዘርተው በተለያየ የዕድገት ደረጃ ላይ ላሉ ሰብሎች እድገት ➢ ለእንስሳት መኖርና የመጠጥ ውሃ አቅርቦት መሻሻል ➢ የተፈጥሮና ሰው ሰራሽ የውሃ ማጠራቀሚያዎችን ለማጎልበት ➢ ለቋሚ ተክሎች እና ለግጦሽ ሳር ዕድገት ➢ ለአረንጓዴ እዕዋት ልምላሜ	➢ የአረም መከሰት እንደ ዋግ የመሳሰሉ የሰብል በሽታና ተባይ መከሰት	➢ በአንዳንድ አካባቢዎች ቀድመው የደረሱ ሰብሎችን በጊዜ መሰብሰብ ➢ የሰብል በሽታንና አረምን አስቀድሞ መከላከል፤ ➢ እርጥበት አጠር አካባቢዎች የዝናብ ውሃን ማሰባሰብና ማጠራቀም ➢ አርሶ አደሮች የማሳ ጉብኝት በየጊዜው ማድረግ ➢ የድጋሚ አረምን ማረም፣ ፀረ-አረምና ፀረ-ተባይ ኬሚካሎችን ከግብርና ባለሙያ ጋር በመመካከር መተግበር ➢ እንደ ሽንብራና ጓያ የመሳሰሉ የጥራጥሬ ሰብሎችን በጊዜ መዝራት

በኢትዮጵያ የሚቲዎሮሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቲዎሮሎጂ ትንበያ፡

ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ



ሠንጠረዥ 3 በሚቀጥሉት አስር ቀናት የሚኖረው የእርጥበት ሁኔታ በወሀወ ዘር ላይ ሊኖር የሚችለው ተጽዕኖ

ከመካከለኛ እስከ ከፍተኛ የገፀ ምድር ውሃ ፍሰት	አዎንታዊ ተጽዕኖ	አሉታዊ ተጽዕኖ	የውኃ ሚቲዎሮሎጂ ምክረ ሃሳብ
በአብዛኛው ባሮ አካባቢ፣ አጋዴን፣ በላይኛውና መካከለኛ አዋ ጊዜ፣ ስምጥ ሸለቆ፣ በታችኛው አባይ	- የገፀ ምድር የውሃ ፍሰት መሻሻል - የመስኖም ሆነ የሃይል ማመንጫ ግድቦች ውኃ በመጠን መሻሻል	የውሃ ማፋሰሻ ቱቦዎች በቆሻሻ መዘጋት	- የዝናብ ውኃ ማሰባሰብና ማጠራቀም - የሚገኘውን የዝናብ ውሀ በአግባቡ መጠቀም - ትንበያዎችንና ምክረ ሀሳቦችን በየጊዜው መከታተል
ከቀላል እስከ መካከለኛ የገፀ ምድር ውሃ ፍሰት	አዎንታዊ ተጽዕኖ	አሉታዊ ተጽዕኖ	የውኃ ሚቲዎሮሎጂ ምክረ ሃሳብ
በላይኛውና መካከለኛ ዋቤ ሸበሌ፣ ታችኛው ተከቤና በጥቂት በላይኛው አዋሽ	- የጎርፍ ሆነ የደለል ስጋት መቀነስ - መጠነኛ የውሃ ፍሰት ሻሻል	- ከፍተኛ ትነት - እርጥበት አጠር በሆኑ አካባቢዎች መጠነኛ የውሃ እጥረት	- ወራጅ የዝናብ ውሃን ማሰባሰብና ማጠራቀም - ከቤት ጣራ ላይ ውሃ ማሰባሰብና ማጠራቀም - የአየር ሁኔታ መረጃዎችን በቅርበት መከታተል
ደረቅ የገፀ ምድር ውሃ ፍሰት	አዎንታዊ ተጽዕኖ	አሉታዊ ተጽዕኖ	የውሃ ሚቲዎሮሎጂ ምክረ ሃሳብ
በአብዛኛው አፋር፣ አዋሽ፣ ደናክል፣ መረብ ጋሽ፣ አጋዴን፣ አይሻ፣ አዋሽ፣	የጎርፍ ሆነ የደለል ስጋት አለመኖር፣	ከፍተኛ ትነት	- የውኃ እጥረት በሚገጥማቸው አካባቢዎች የውኃ ተደራሽነትን ማረጋገጥ - የሚገኘውን ውኃ በቁጠባና ውጤታማ በሆነ ሁኔታ ማስተዳደር - የገጸ ምድር የውኃ ሀብትን በአግባቡ መጠቀም