

በኢትዮጵያ የሚቴዎሮሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎሮሎጂ ትንበያ፣
ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

በኢትዮጵያ የሚቴዎሮሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎሮሎጂ ትንበያ፣
ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ



ከኦክቶበር 11-20/2026 የነበረው የአየር ሁኔታ እና ከኦክቶበር
21-31 እና ከኖቬምበር 1-10/2026

የሚኖረው የአየር ሁኔታ ትንበያ እና ምክረ ሃሳብ

ኦክቶበር 2026

አዲስ አበባ


በኢትዮጵያ የሚቲዎሮሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቲዎሮሎጂ ትንበያ፤

ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

1. እ.ኤ.አ ከኦክቶበር 11 እስከ 20/2026 የነበረው የአየር ሁኔታ

ባለፉት አስር ቀናት በጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው በሆኑት በደቡብ እና ደቡብ ምስራቅ የሀገሪቱ አካባቢዎች እንዲሁም በደቡብ ምዕራብ፣ በመዕራብና በሰሜን ምስራቅ ላይ የተሻለ የደመና ሽፋን ነበራቸው። ከዚህ ጋር ተያይዞ በደቡብ፣ ደቡብ ምስራቅ እና በደቡብ ምዕራብ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ በ24 ሰዓት ውስጥ ከመካከለኛ እስከ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ተመዝግቦባቸዋል። በአጠቃላይ ባለፉት አስር ቀናት በ37 የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ በ24 ሰዓት ውስጥ ከ30 ሚ.ሜ በላይ የሆነ ከባድ መጠን ያለው የዝናብ መጠን ነበራቸው (ምስል 1)። ከነበረው ከባድ ዝናብ ጋር በተያያዘ በመልካ ዲዳ፣ በቀላፎ፣ በጎዴ እና በፋፈን አካባቢዎች ላይ ቅጽበታዊ ጎርፍ ተከስቷል።

በተጨማሪም በደቡብ ምዕራብና ደቡብ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ በ24 ሰዓት ውስጥ 40.0-73.2 ሚ.ሜ የሚደርስ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ተመዝግቧል። ከ40 ሚ.ሜ በላይ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ከተመዘገበባቸው የሀገሪቱ አካባቢዎች አርባምንጭ 73.2፣ ጎዴ 68፣ መንደር11 63.5፣ አዴት 60፣ መርሳ 57.4፣ አቦሞሪንጋ 47.2፣ ዶሎመና 45.5፣ አታንጎ 45፣ ባምቢስ 43.5፣ ማጅቱ 42.8፣ ጊምቢ 41.5፣ ጋምቤላ 41.2፣ አባጃራ 41 እና በሽላቦ 40 ይገኙበታል።




ምስል1: ከኦክቶበር 11 እስከ 20/2026 በ24 ሰዓት ውስጥ ከ40 ሚ.ሜ በላይ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ የተመዘገበባቸው ስፍራዎች

በኢትዮጵያ የሚቲዎሮሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቲዎሮሎጂ ትንበያ፡


ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

ባለፉት አስር ቀናት የዘነበዉ የዝናብ መጠን ከቦታ ሽፋን አንፃር ሲገመገም፤ በጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸዉ የሆኑት የቦረና፣ ምስራቅ ቦረና፣ ምዕራብ ጉጂ እና ጉጂ ዞኖች፣ ከሶማሌ ክልል የዳዋ፣ ሊባን፣ አፍዴር፣ ሸቦሌ፣ ቆራሂ፣ ዶሎ፣ ነጎብ፣ እና ጃረር ዞኖች፣ የጋሞ፣ ባስኬቶ፣ አሪ፣ ኮንሶ፣ ቡርጂ፣ አሌ፣ ጋርዱላ፣ ኮሬ እና ደቡብ አሞ ዞኖች፣ ሁሉም የሲዳማ ክልል ዞኖች፣ እንዲሁም የክረምት ወቅት ዝናብ ተጠቃሚ ከሆኑ ዞኖች የቁለም ወለጋ፣ ምዕራብ ወለጋ፣ ምስራቅ ወለጋ፣ ሆሮ ጉድሩ ወለጋ፣ ኢሉባቦር፣ ቡኖ በደሌ፣ ጅማ ዞኖች፣ የካማሺ፣ መተከል፣ አሶሳ፣ ማኦ ኮሞ ዞኖች፣ የአኝዋክ፣ መሻርንግ፣ የኑዌር እና የኢታንግ ልዩ ወረዳ፣ የባህርዳር ዙሪያ፣ የሰሜን፣ ምዕራብ ጎጃም እና የአዊ ዞኖች፣ የከፋ፣ ኮንታ፣ ዳውሮ፣ ቤንች ሸኮ፣ ሸካ እና ምዕራብ አሞ ዞኖች፣ የወላይታ፣ ጎፋ እና ጌድዮ ዞኖች ላይ ከ15-130 ሚ.ሜ የሚደርስ ዝናብ ከ3-9 ቀናት ያህል ዝናብ ነበራቸዉ (ካርታ 1 እና 2)። በተጨማሪም የሰሜን፣ መካከለኛዉ እና ደቡብ ጎንደር፣ ምስራቅ ጎጃም፣ የምዕራብ ሐረርጌ ዞኖች፣ አርሲ እና ምዕራብ አርሲ፣ ባሌ እና ምስራቅ ባሌ ዞኖች፣ የምዕራብ፣ የሰሜን ምዕራብ እና የደቡብ ትግራይ ዞኖች፣ ቅልበቲ፣ ፋንቲ፣ ማሂ፣ ሃሪ፣ ጋቢ ዞኖች ከ5-30 ሚ.ሜ የሚደርስ ወቅቱን ያልጠበቀ አነስተኛ መጠን ዝናብ ከ1-3 ቀናት ያህል ዝናብ ነበራቸዉ (ካርታ 1 እና 2)።


ባለፉት አስር ቀናት የዘነበዉ የዝናብ መጠን ከቦታ ሽፋን አንፃር ሲገመገም፤ በጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸዉ የሆኑት የቦረና፣ ምስራቅ ቦረና፣ ምዕራብ ጉጂ እና ጉጂ አኖች፣ ከሶማሌ ክልል የዳዋ፣ ሊባን፣ አፍዴር፣ ሸቦሌ፣ ቆራሂ፣ ዶሎ፣ ነጎብ፣ እና ጃረር ዞኖች፣ የጋሞ፣ ባስኬቶ፣ አሪ፣ ኮንሶ፣ ቡርጂ፣ አሌ፣ ጋርዱላ፣ ኮሬ እና ደቡብ አሞ ዞኖች፣ ሁሉም የሲዳማ ክልል ዞኖች፣ እንዲሁም የክረምት ወቅት ዝናብ ተጠቃሚ ከሆኑ ዞኖች የቁለም ወለጋ፣ ምዕራብ ወለጋ፣ ምስራቅ ወለጋ፣ ሆሮ ጉድሩ ወለጋ፣ ዞኖች፣ የካማሺ፣ መተከል፣ አሶሳ፣ ማኦ ኮሞ ዞኖች፣ የአኝዋክ፣ መሻርንግ፣ የኑዌር እና የኢታንግ ልዩ ወረዳ፣ የባህርዳር ዙሪያ፣ የሰሜን፣ ምዕራብ ጎጃም እና የአዊ ዞኖች፣ የከፋ፣ ኮንታ፣ ዳውሮ፣ ቤንች ሸኮ፣ ሸካ እና ምዕራብ አሞ ዞኖች፣ የወላይታ፣ ጎፋ እና ጌድዮ ዞኖች ላይ መደበኛ እና ከመደበኛ በላይ የሆነ የዝናብ መጠን ተመዝግቧል (ካርታ 3)።



ካርታ 1 እ.ኤ.አ ከኦክቶበር 11 እስከ 20/2026 ድረስ የነበረው የዝናብ መጠን በሚ.ሜ



ካርታ 2 እ.ኤ.አ ከኦክቶበር 11 እስከ 20/2026 ድረስ ዝናብ የዘነበባቸዉ ቀናት



ካርታ 3 እ.ኤ.አ ከኦክቶበር 11 እስከ 20/2026 የነበረዉ የዝናብ መጠን ከመደበኛዉ ጋር ሲነፃፀር

1.2 እ.ኤ.አ ከኦክቶበር 11 እስከ 20/2026 የአየር ሁኔታ በግብርና ሥራ እንቅስቃሴ ላይ ያሳደረው ተፅዕኖ


ባለፉት አስር ቀናት በደቡብ ምዕራብ፣ በደቡብ፣ በደቡብ ምስራቅ፣ በምዕራብ አጋማሽ፣ በሰሜን ምስራቅ እና በሰሜን መዕራብ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ የተሻለ የአፈር ውስጥ እርጥበት ነበራቸው፡፡ ይህም ሁኔታ የአፈር ውስጥ እርጥበትን ከማሻሻል ጋር ተያይዞ ፍሬ በመመላት ላይ ለሚኙት የረጅም ጊዜ ሰብሎችም ሆነ ለሌሎች የመካከለኛ እና የአጭር ጊዜ ሰብሎች፣ ለቋሚ ተክሎች፣ ለፍራፍሬዎችና ለጓሮ አትክልቶች የውሃ ፍላጎታቸውን ከማሟላት አንጻር ከፍተኛ ጠቀሜታ ነበረው፡፡ እንዲሁም በወቅቱ መጨረሻ በአፈር ውስጥ በተከማቸው እርጥበት በመታገዝ ለተዘሩ እንደ ጓያ እና ሽንብራ ላሉ ሰብሎች የውሃ ፍላጎ መሟላት ከፍተኛ ጠቀሜታ ነበረው፡፡ በተለይም በጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው በሆኑት በደቡብ አጋማሽ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ የተገኘው እርጥበት ጥምር ግብርና ለሚያከናውኑ አካባቢዎች ዘር ለመዝራት ምቹ ሁኔታ የፈጠረ ነበረ፡፡ እንዲሁም በደቡብ እና በደቡብ ምስራቅ ቆላማው አካባቢ ለሚኖሩ አርብቶ አደሮችና ከፊል አርብቶ አደሮች በቂ የግጦሽ ሣርና የመጠጥ ውኃ አቅርቦት እንዲኖር ከማስቻል አንጻር አዎንታዊ ሚና ነበረው (ካርታ 4)፡፡

1.3 እ.ኤ.አ ከኦክቶበር 11 እስከ 20/2026 የአየር ሁኔታ በውሃው ዘርፍ ላይ ያሳደረው ተፅዕኖ


ባለፉት ቀናት በአብዛኛው ዋቤ ሸበሌ፣ ኦጋዴን፣ ገናሌ ዳዋ፣ ባሮአኮቦ፣ በላይኛውና መካከለኛው ኦሞ ጊቤ፣ ስምጥ ሸለቆ፣ ተከዜ፣ እንዲሁም አባይ ከመጠነኛ እስከ ከፍተኛ የገፀ ምድር የውሃ ፍሰት የነበራቸው፡፡ በተጨማሪም በታችኛው ኦጋዴን፣ ኦሞ ጊቤ፣ ስምጥ ሸለቆ፣ በመካከለኛና ታችኛው ገናሌዳዋ፣ ዋቤ ሸበሌ፣ ባሮአኮቦ እና አባይ ተፋሰሶች ደግሞ በጣም ከፍተኛ የሆነ የገፀ ምድር ውኃ ነበረው፡፡ በመሆኑም ለገፀ ምድር ውሃ ሀብት ግብዓት ጥሩ አስተዋፅኦ እንደነበረው የተተነተኑ የሀይድሮ ሚቲዎሮሎጂ መረጃዎች ያመላክታሉ፡፡ ይህ ሁኔታ በተለይም ዋነኛ ወቅታቸው ለሆኑት ለአብዛኛው ዋቤ ሸበሌ፣ ገናሌ ዳዋ፣ ኦጋዴን ለመካከለኛና ታችኛው ኦሞ ጊቤ፣ ስምጥ ሸለቆ ጠቀሜታው እጅግ የጎላ ነው (ካርታ 5)፡፡

በኢትዮጵያ የሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎርሎጂ ትንበያ፣


ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ



ካርታ 4 እ.ኤ.አ ከኦክቶበር 11 እስከ 20/2026
ድረስ የነበረው የእርጥበት ሁኔታ



ካርታ 5 እ.ኤ.አ ከኦክቶበር 11 እስከ 20/2026
ድረስ የነበረው የእርጥበት ሁኔታ




በኢትዮጵያ የሚቲዎሮሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቲዎሮሎጂ ትንበያ፤

ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

2. እ.ኤ.አ ከኦክቶበር 21 እስከ 31/2026 የሚኖረው የአየር ሁኔታ ትንበያ

በመጨረሻ የኦክቶበር ሶስተኛው አሥራ አንድ ቀናት አሁን ከሚታዩትና በቀጣይነትም ከተተነበዩት የትንበያ መረጃዎች እንደሚያሳዩት ዝናብ ሰጭ የአየር ሁኔታ ክስተቶች በደቡብ፣ ደቡብ ምዕራቅ፣ ደቡብ ምዕራብ፣ በምዕራብና በምስራቅ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ ከሳምንቱ አጋማሽ ጀምሮ የተሻለ ገጽታ ይኖራቸዋል፡፡ በመሆኑም በጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው በሆኑት የጉጂ፣ ምስራቅ ጉጂ፣ ቦረና፣ ምስራቅ ቦረና ዞኖች፣ የሲዳማ ክልል ዞኖች፣ የሶማሌ ክልል ደቡባዊ ዞኖች፣ የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ዞኖች ላይ ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን ያለው ዝናብ እንደሚኖራቸው አሃዛዊ የትንበያ መረጃዎች ይጠቁማሉ (ካርታ 6)፡፡

በተጨማሪም ቀደም ብሎ የክረምት ወቅት ዝናብ እያገኙ የነበሩት የምዕራብ እና ደቡብ ምዕራብ፣ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ ቀጣይነት ይኖረዋል፡፡ በተጨማሪም በፀሀይ ሀይል ታግዘው ከሚጠናከሩት የደመና ክምችቶች ላይ በመነሳት ደቡብ ምዕራብ እና ደቡብ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ አልፎ አልፎ በሚኖሩት ቀናት በ24 ሰዓት ውስጥ ከ11 እስከ 30 ሚ.ሜ የሚደርስ ከመካከለኛ እስከ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ይኖረዋል (ካርታ 1)፡፡ በሌላ በኩል አልፎ አልፎ በሚኖሩት ቀናት በሰሜን ምዕራብ እና በሰሜን የሀገሪቱ አካባቢዎች ወቅቱን ያልጠበቀ ቀላል መጥን ያለው ዝናም እንደሚያገኙ አሃዛዊ የትንበያ መረጃዎች ይጠቁማሉ (ካርታ 6)፡፡



ካርታ 6 እ.ኤ.አ ከኦክቶበር 21-31/2026,
የሚኖረው የዝናብ መጠን በሚ.ሜ

ሠንጠረዥ 1፡ በሚቀጥሉት አስራ አንድ ቀናት ዝናብ የሚያገኙ አካባቢዎችና በ24 ሰዓት ውስጥ የሚኖረው የዝናብ መጠን

በኢትዮጵያ የሚቲዎሮሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቲዎሮሎጂ ትንበያ፡

ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

በጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው የሆኑ ዞኖች

ክልል	ዞን	በ 24 ሰዓት ውስጥ የሚኖረው የዝናብ መጠን
አሮሚያ	የቦረና፣ ምስራቅ ቦረና፣ ምዕራብ ጉጂ እና ጉጂ	ከመካከለኛ እስከ ከባድ መጠን (ከ11 እስከ 30 ሚ.ሜ)
ሶማሌ	የዳዋ፣ ሊበን፣ አፍዴር፣ ሸበሌ፣ ቆራሂ፣ ዶሎ እና ነጎብ፣ ጃረር፣ ዞኖች	ከመካከለኛ እስከ ከባድ መጠን (ከ11 እስከ 30 ሚ.ሜ)
ደቡብ ኢትዮጵያ	ጋሞ፣ ባስኬቶ፣ አሪ፣ ኮንሶ፣ ቡርጂ፣ አሌ፣ ጋርዱላ፣ ኮሬ እና ደቡብ አሞ ዞኖች	ከመካከለኛ እስከ ከባድ መጠን (ከ11 እስከ 30 ሚ.ሜ)
ሲዳማ ክልል	ሁሉም የክልሉ ዞኖች	መካከለኛ መጠን (ከ11 እስከ 29 ሚ.ሜ)

የክረምት ወቅት ዝናብ ተጠቃሚ ዞኖች

አሮሚያ	የቁለም ወለጋ፣ ምዕራብ ወለጋ፣ ምስራቅ ወለጋ፣ ሆሮ ጉድሩ ወለጋ፣ ኢሉባቦር፣ ቡኖ በደሌ፣ ጅማ ዞኖች	ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን (ከ11-29 ሚ.ሜ)
ቤንሻንጉል ጉምዝ	የካማሺ፣ መተከል፣ አሶሳ፣ ማኦ ኮሞ ዞኖች	ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን (ከ11-29 ሚ.ሜ)
ጋምቤላ	የአኝዋክ፣ መሻጉንግ፣ የኑዌር እና የኢታንግ ልዩ ወረዳ	ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን (ከ11 እስከ 29 ሚ.ሜ)
አማራ	የባህርዳር ዙሪያ፣ የሰሜን፣ ምዕራብ ጎጃም እና የአዊ ዞኖች	ቀላል መጠን ያለው ዝናብ (ከ 1-10ሚ.ሜ)
ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ	የከፋ፣ ኮንታ፣ ዳውሮ፣ ቤንች ሸኮ፣ ሸካ እና ምዕራብ አሞ ዞኖች	መካከለኛ መጠን (ከ11 እስከ 29 ሚ.ሜ)
ደቡብ ኢትዮጵያ	የወላይታ፣ ጎፋ፣ ጌድዮ ዞኖች	መካከለኛ መጠን (ከ11 እስከ 29 ሚ.ሜ)

**በኢትዮጵያ የሚቲዎሮሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቲዎሮሎጂ ትንበያ፣
ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ**

ወቅቱን ያልጠበቀ ቀላል መጠን ዝናብ የሚያገኙ አከባቢዎች

አማራ	የሰሜን፣ የመካከለኛው እና ደቡብ ጎንደር፣ ምስራቅ ጎጃም፣ የዋግ ህምራ፣ የሰሜን ሸዋ ዞኖች፣ የሰሜን እና ደቡብ ወሎ ዞኖች	ቀላል መጠን (ከ1-10 ሚ.ሜ)
አሮሚያ	የምዕራብና ምስራቅ ሐረርጌ ዞኖች፣ አርሲ እና ምዕራብ አርሲ፣ የሰሜን እና የምዕራብ የሸዋ ዞኖች፣ ባሌ እና ምስራቅ ባሌ ዞኖች	ቀላል መጠን (ከ1-10 ሚ.ሜ)
ትግራይ	የምዕራብ፣ የሰሜን ምዕራብ፣ የደቡብ ምስራቅ እና የደቡብ ትግራይ ዞኖች	ቀላል መጠን (ከ1-10 ሚ.ሜ)
ማዕከላዊ ኢትዮጵያ	ጉራጌ፣ ምስራቅ ጉራጌ፣ ስልጤ፣ ሀዲያ፣ ከምባታ፣ ሀላባ፣ የም፣ ጠምባሮ ልዩ ወረዳ፣ ቀቤና ልዩ ወረዳ፣ ማረቆ ልዩ ወረዳ	ቀላል መጠን (ከ1-10 ሚ.ሜ)
ሶማሌ	የሲቲ፣ ፋፈን እና ኤረር ዞኖች	ቀላል መጠን (ከ1-10 ሚ.ሜ)
አፋር	ቀልበቲ፣ ፋንቲ፣ ማሂ፣ ሃሪ፣ ጋቢ ዞኖች	አነስተኛ መጠን
ድሬዳዋ እና ሐረሪ		ቀላል መጠን (ከ1-10 ሚ.ሜ)



Ethiopian Meteorology Institute




በኢትዮጵያ የሚቲዎሮሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቲዎሮሎጂ ትንበያ፣

ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

2.1 እ.ኤ.አ ከኖቬምበር 1 እስከ 10/2026 የሚኖረው የአየር ሁኔታ አዝማሚያ

በመደበኛ ሁኔታ በኖቬምበር የመጀመሪያዎቹ አሥር ቀናት በደቡብ ምዕራብ፣ በደቡብና በደቡብ ምሥራቅ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ የዝናብ መጠንና ስርጭት ቀጣይነት ይኖረዋል። በሌላ በኩል በአብዛኛው የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ የበጋው ደረቅ፣ ፀሐያማና ነፋሻማ የአየር ሁኔታ ይስተዋላል።

በመጨረሻ የኖቬምበር የመጀመሪያዎቹ አሥር ቀናት አሁን ከሚታዩትና በቀጣይነትም የተተነበዩት የትንበያ መረጃዎች እንደሚያሳዩት ዝናብ ሰጭ የአየር ሁኔታ ክስተቶች በጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው በሆኑት የደቡብ እና ደቡብ ምስራቅ እንዲሁም በምዕራብና በደቡብ ምዕራብ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ ቀጣይነት ይኖራቸዋል። በመሆኑም በጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው በሆኑት የጉጂ፣ ምዕራብ ጉጂ፣ ቦረና እና ምስራቅ ቦረና ዞኖች፣ የሲዳማ ክልል ዞኖች፣ የሶማሌ ክልል ደቡባዊና ደቡብ ምስራቅ ዞኖች እና የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ዞኖች ላይ ከሚጠናከሩት የሚቲዎሮሎጂ ገጽታዎች ላይ በመነሳት ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን ያለው ዝናብ ይኖራቸዋል። በተጨማሪም ቀደም ብሎ የክረምት ወቅትን ዝናብ እያገኙ በነበሩት በደቡብ ምዕራብ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ ቀላል መጠን ያለው ዝናብ እንደሚኖራቸው አሃዛዊ የትንበያ መረጃዎች ይጠቁማሉ። በሌላ በኩል በመካከለኛው፣ ምዕራብ፣ ሰሜን ምዕራብ እና የሰሜን የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ ከሚጠናከሩት የአየር ሁኔታ ክስተቶች ላይ በመነሳት አልፎ አልፎ በሚኖሩት ቀናት ወቅቱን ያልጠበቀ አነስተኛ መጠን ያለው ዝናብ እንደሚኖር የትንበያ መረጃዎች ያሳያሉ (ካርታ 7)።



ካርታ 7 እ.ኤ.አ ከኖቬምበር 1-10/2026, የሚኖረው የዝናብ መጠን በሚ.ሜ

2.2 እ.ኤ.አ ከኦክቶበር 21 እስከ 31/2026 የሚኖረው የአየር ሁኔታ በግብርናው ሥራ እንቅስቃሴ ላይ ሊያሳድር የሚችለው ተፅዕኖ

በሚቀጥሉት ቀናት በደቡብ፣ ደቡብ ምስራቅ፣ ደቡብ ምዕራብ፣ በምዕራብና በምስራቅ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ ከሳምንቱ አጋማሽ ጀምሮ የተሻለ ገጽታ ይኖራቸዋል። በተለይም ደቡብ ምዕራብ፣ በምዕራብና በምስራቅ የሀገራችን አካባቢዎች በብዙ ቦታዎቻቸው ላይ ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን ያለው የአፈር ውስጥ እርጥበት እንደሚኖር ይጠበቃል። እንደሁም በጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው በሆኑት የጉጂ፣ ምስራቅ ጉጂ፣ ቦረና፣ ምስራቅ ቦረና ዞኖች፣ የሲዳማ ክልል ዞኖች፣ የሶማሌ ክልል ደቡባዊ ዞኖች፣ የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ዞኖች ላይ ከመካከለኛ እስከ ከባድ መጠን ያለው የአፈር ውስጥ እርጥበት ያገኛሉ። በመሆኑም የሚኖሩ መልካም አጋጣሚዎችን በአግባቡ ለመጠቀምና አሉታዊ ተጽዕኖዎችን ለመቀነስ የሚያስችል ቦታ ተኮር የግብርና ሚቲዎሮሎጂ ምክረ ሀሳብ ከወዲሁ ተግባራዊ እንዲያደርጉ ከታች የቀረቡትን ዝርዝር ተግባራት ማከናወን ያስፈልጋል (ሠንጠረዥ 2)።

2.3 እ.ኤ.አ ከኦክቶበር 21 እስከ 31/2026 የሚኖረው የአየር ሁኔታ በውሀ ዘርፍ ላይ ሊያሳድር የሚችለው ተፅዕኖ

በሚቀጥሉት የኦክቶበር አስራ አንድ ቀናት በባሮ አካባቢ፣ በላይኛውና በመካከለኛው ኦሞ ጊቤ እንዲሁም በላይኛው ገናሌ ዳዋ ተፋሰሶች ላይ መካከለኛ የገፀ ምድር ውሃ ፍሰት የሚጠበቅ ሲሆን፣ በስምጥ ሸለቆ፣ በታችኛው ኦሞ ጊቤ፣ በመካከለኛውና በታችኛው ገናሌ ዳዋ፣ በዋቤ ሸበሌ እና በኦጋዴን ተፋሰሶች ደግሞ ከቀላል እስከ መካከለኛ የገፀ ምድር ውሃ ፍሰት ይኖራል። በመሆኑም ሊኖር የሚችለውን መልካም ዕድሎችን ለመጠቀምና ሊያጋጥሙ የሚችሉ ተግዳሮቶችን ለመቀነስ የሚከተሉትን ተፋሰስ ተኮር የውሃ ሚቲዎሮሎጂ ምክረ ሃሳቦች መተግበር ያስፈልጋል (ሠንጠረዥ 3) ።

በኢትዮጵያ የሚታወቁት ኢንስቲትዩት የሚታወቁት ትንበያ፤

ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ



ሠንጠረዥ 2፡ በሚቀጥሉት አስራ አንድ ቀናት የሚኖረው የእርጥበት ሁኔታ በግብርናው እንቅስቃሴ ላይ

የክረምት እርጥበት ተጠቃሚና የመኝር አምራች ዞኖች			
ከቀላል እስከ ከመካከለኛ መጠን ያለው እርጥበት የሚያገኙ ዞኖች	አዎንታዊ ተጽዕኖ	አሉታዊ ተጽዕኖ	የተሰጠ ምክረ ሃሳብ
ከኦሮሚያ የቄለም ወለጋ፣ ምዕራብ ወለጋ፣ ምስራቅ ወለጋ፣ ሆሮ ጉድሩ ወለጋ፣ ኢሉባቦር፣ ቡኖ በደሌ፣ ጅማ ዞኖች፣ ከቤንሻንጉል ጉምዝ የካማሺ፣ መተከል፣ አሶሳ፣ ማኦ ኮሞ ዞኖች ከጋምቤላ የአኝዋክ፣ መኻረንግ፣ የኑዌር እና የኢታንግ ልዩ ወረዳ ከአማራ ክልል የባህርዳር ዙሪያ፣ የሰሜን፣ ምዕራብ ጎጃም እና የአዊ ዞኖች ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ የከፋ፣ ኮንታ፣ ዳውሮ፣ ቤንሻ ሸኮ፣ ሸካ እና ምዕራብ ኦሞ ዞኖች ደቡብ ኢትዮጵያ የወላይታ፣ ጎፋ፣ ጌድዮ ዞኖች	<ul style="list-style-type: none"> ➤ የአፈር ውስጥ እርጥበት መሻሻል ➤ ለረጅምና መካከለኛ ጊዜ ሰብሎች እድገት እና ፍሬ ለማፍራት ➤ ዘግይተው ተዘርተው በተለያየ የዕድገት ደረጃ ላይ ላሉ ሰብሎች እድገት ➤ ለእንስሳት መኖና የመጠጥ ውሃ አቅርቦት መሻሻል ➤ የተፈጥሮና ሰው ሰራሽ የውሃ ማጠራቀሚያዎችን ለማጎልበት ➤ ለቋሚ ተክሎች እና ለግጦሽ ሳር ዕድገት ➤ ለአረንጓዴ እፅዋት ልምላሜ 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ የአረም መስፋፋት ➤ የሰብል በሽታና ተባይ መከሰት 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ የሰብል በሽታንና አረምን አስቀድሞ መከላከል፤ ➤ እርጥበት አጠር አካባቢዎች የዝናብ ውሃን ማሰባሰብና ማጠራቀም ➤ አርሶ አደሮች የማሳ ጉብኝት በየጊዜው ማድረግ ➤ የድጋሜ አረምን ማረም፣ ፀረ-አረምና ፀረ-ተባይ ኬሚካሎችን ከግብርና ባለሙያ ጋር በመመካከር መተግበርቤላ

በጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው የሆኑ ዞኖች

ቀላል መጠን ያለው እርጥበት የሚያገኙ ዞኖች	አዎንታዊ ተጽዕኖ	አሉታዊ ተጽዕኖ	የተሰጠ ምክረ ሃሳብ
<p>ከአሮሚያ የቦረና፣ ምስራቅ ቦረና፣ ምዕራብ ጉጂ እና ጉጂ፣ ዞኖች፣ ከደቡብ ኢትዮጵያ ጋሞ፣ ባስኬቶ፣ አሪ፣ ኮንሶ፣ ቡርጂ፣ አሌ፣ ጋርዱላ፣ ኮሬ እና ደቡብ ኦሞ ዞኖች፣</p> <p>ከሶማሌ የዳዋ፣ ሊባን፣ አፍዴር፣ ሸበሌ፣ ቆራሂ፣ ዶሎ እና ነጎብ፣ ጃረር፣ ዞኖች ዞኖች ሲዳማ ክልል ሁሉም የክልሉ ዞኖች፣</p>	<p>➤ የበጋ ተጠቃሚ ደጋማ ስፍራዎች የማሳ ዝግጅት ለማድረግና ዘር ለመዝራት</p> <p>➤ የአረንጓዴ እፅዋት ልምላሜ፣ ለመጠጥ ውሃና ለግጦሽ ሣር አቅርቦት መሻሻል</p> <p>➤ የዝናብ ውሃን ለማሰባሰብና ለማጠራቀም</p>	<p>➤ የትነት መጠን መጨመር፤</p> <p>➤ የፀረ ሰብል ተባይ መከሰት ፤</p> <p>➤ በተወሰኑ ቦታዎች ላይ የአፈር ውስጥ እርጥበት ዝቅተኛ መሆን</p>	<p>➤ የሚገኘውን እርጥበት በአግባቡ መጠቀም</p> <p>➤ የዝናብ ውኃን በማሰባሰብ በደረቅ ሰሞናት ተግባር ላይ ማዋል</p> <p>➤ የአፈር ውስጥ የትነት መጠንን ለመቀነስ የሚያስችሉ ተግባራትን ማከናወን፤</p> <p>➤ ለእንስሳት የግጦሽ ሣርን በአግባቡ መጠቀምና መጠበቅ፤</p>

Ethiopian Meteorology Institute



በኢትዮጵያ የሚቲዎሮሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቲዎሮሎጂ ትንበያ፡

ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ



ሠንጠረዥ 3 በሚቀጥሉት አስራ አንድ ቀናት የሚኖረው የእርጥበት ሁኔታ በወሀው ዘር ላይ ሊኖር የሚችለው ተጽዕኖ

መካከለኛ የገፀ ምድር ውሃ ፍሰት	አዎንታዊ ተጽዕኖ	አሉታዊ ተጽዕኖ	የውሃ ሚቲዎሮሎጂ ምክረ ሃሳብ
<ul style="list-style-type: none"> ባሮ አኮሪ ላይኛውና መካከለኛው አሞ ጊቤ ላይኛው ገናሌ ዳዋ 	<ul style="list-style-type: none"> የወንዞች ፍሰት መጨመርና ግድቦች የውሃ መጠን መሻሻል የመስኖና የሃይል ማመንጫ ግድቦች የውሃ ክምችት መጨመር የገፀ ምድርም ሆነ የከርሰ ምድር ውሃ ሀብት መጨመር የመጠጥ ውሃ አቅርቦት ሽፋን መሻሻል 	<ul style="list-style-type: none"> ከፍተኛ ትነት መኖር 	<ul style="list-style-type: none"> የዝናብ ውሃ ማሰባሰብና ማጠራቀም
ከቀላል እስከ መካከለኛ የገፀ ምድር ውሃ ፍሰት	አዎንታዊ ተጽዕኖ	አሉታዊ ተጽዕኖ	የውሃ ሚቲዎሮሎጂ ምክረ ሃሳብ
<ul style="list-style-type: none"> ስምጥ ሸለቆ ታችኛው አሞ ጊቤ መካከለኛውና ታችኛው ገናሌ ዳዋ ዋቤ ሸበሌ አጋዴን 	<ul style="list-style-type: none"> የመጠጥ ውሃ አቅርቦት መሻሻል የወንዞችና የትናንሽ ማጠራቀሚያዎች መጠነኛ መሙላት የገፀ ምድርም ሆነ የከርሰ ምድር የውሃ ሀብት መጨመር 	<ul style="list-style-type: none"> ከፍተኛ ትነት መኖር 	<ul style="list-style-type: none"> ከጣራና ከመሬት ወለል የሚገኘውን የዝናብ ውሃ በተገቢ ሁኔታ ማሰባሰብ የውሃ ሀብትን በአግባቡ መጠቀም

በኢትዮጵያ የሚቴዎሮሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎሮሎጂ ትንበያ፣
ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ



ደረቅ የገፀ ምድር ውሃ ፍሰት	አዎንታዊ ተጽዕኖ	አሉታዊ ተጽዕኖ	የውሃ ሚቴዎሮሎጂ ምክረ ሃሳብ
<ul style="list-style-type: none"> አባይ (በአብዛኛው) ተከሄ ላይኛውና መካከለኛው አዋሽ አፋር ዳናክል፣ አይሻ መረብ ጋሽ 	<ul style="list-style-type: none"> የጎርፍም ሆነ የደለል ስጋት አለመኖር 	<ul style="list-style-type: none"> ዝቅተኛ የውሃ ፍሰት እርጥበት አጠር በሆኑ አካባቢዎች የውሃ እጥረት 	<ul style="list-style-type: none"> የሚገኘውን የውሃ ሀብት በአግባቡ መጠቀም የሚገኘውን መጠነኛ የዝናብ ውሃ ከጣራና ከመሬት ወለል ማሰባሰብ

